

ტრისტან ბუაძე

ადრეერთი სტატისტიკის,
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური
სტატისტიკის ელემენტები

მეორე შეესებული და შესწორებული გამოცემა

თბილისი 2010

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია აღწერითი სტატისტიკის, ალბათობის თეორიისა და დასკვნითი სტატისტიკის მნიშვნელოვანი საკითხები. თეორიული მასალის გადმოცემასთან ერთად მოყვანილია შესაბამისი პრაქტიკული ამოცანები, მათი ამოხსნები, მეთოდური მითითებები და სათანადო საგარჯიშოები.

წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით და ავტორთა მიერ მრავალი წლის განმავლობაში უმაღლეს სასწავლებლების შესაბამის სპეციალობებით წაკითხული ლექციების საფუძველზე. იგი დახმარებას გაუწევს ინფორმატიკისა და სოციალური მეცნიერებების გრიფით გაერთიანებული სპეციალობების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს.

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოთი შეიძლება ისარგებლონ აგრეთვე უმაღლესი პროფესიული განათლების, საშუალო სკოლისა და უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკის პედაგოგებმა და აბიტურიენტებმა. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს პრაქტიკული სოციოლოგიური კვლევებით დაინტერესებულ პირებს.

რეცენზენტები:

პროფესორი

ი. მიქაძე

პროფესორი

გ. სოხაძე

ISBN 978-9941-0-2551-8

წინასიტყვაობა მეორე გამოცემისათვის

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია აღწერითი სტატისტიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მნიშვნელოვანი თეორიული საკითხები, შესაბამისი პრაქტიკული ამოცანები და მათი ამოხსნისათვის საჭირო მეთოდური მითითებები. მოცემულია ძირითადი სტატისტიკური მეთოდების კონცეპტუალური განვითარებისა და თანამედროვე თეორიულ და პრაქტიკულ მეცნიერულ კვლევებში მათი გამოყენების შესაძლებლობების აღწერა.

სახელმძღვანელო დაწერილია და განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების, ინფორმატიკისა და სოციალური მეცნიერებების გრიფით გაერთიანებული სპეციალობების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.* შედგენილია ამჟამად მოქმედი პროგრამის მიხედვით ავტორის მიერ მრავალი წლის განმავლობაში უმაღლესი სასწავლებლების შესაბამისი სპეციალობების სტუდენტებისათვის წაკითხული ლექციების საფუძველზე.

წარმოდგენილი სახელმძღვანელოთი შეიძლება ისარგებლონ აგრეთვე უმაღლესი სასწავლებლებისა და საშუალო სკოლის მათემატიკის პედაგოგებმა და აბიტურიენტებმა.

სახელმძღვანელოს წინამდებარე გამოცემა სტრუქტურულად წარმოდგენილი მასალის თანმიმდევრულად მოწოდების ლოგიკური პრინციპითაა აგებული, ამასთან შევეცადე მკითხველი არ გადამეტვირთა რთული მათემატიკური ფორმულებით, მაგალითად, საწყის თავებში წარმოდგენილი სტატისტიკები უმარტივეს მათემატიკურ აპარატს საჭიროებენ და მათი შესწავლა არ გაუჭირდება ნებისმიერ დაინტერესებულ მკითხველს, მათ შორის უფროსკლასელებს მოსწავლეებსაც კი.

* საქართველოს განათლების სამინისტროს 2005 წლის №633 ბრძანების საფუძველზე, განისაზღვრა ბაკალავრიატის სპეციალობების ჩამონათვალი, რომელშიც სოციალური მეცნიერებების გრიფით გაერთიანებულია შემდეგი სპეციალობები: „ეკონომიკა, გეოგრაფია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებანი, საერთაშორისო ურთიერთობები, საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, საბიბლიოთეკო, საარქივო და საინფორმაციო საქმე და სხვა“ ([http:// www. mes. gov. ge](http://www.mes.gov.ge)).

სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე პრაქტიკული სოციოლოგიური კვლევებით დაინტერესებულ პირებს.

პირველ თავში გადმოცემულია შემთხვევით მოვლენათა მათემატიკური მოდელირების შესავალი და დასაბუთებულია ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის შესწავლის აუცილებლობა. *მეორე თავი* ეძღვნება აღწერითი სტატისტიკის საკითხების შესწავლას. გადმოცემულია მონაცემთა მოპოვება-წარმოდგენის მეთოდოლოგიის საკითხები და მონაცემთა ანალიზის ზოგიერთი მეთოდი. *მესამე* და *მეოთხე თავში* შეისწავლება შესაბამისად ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ძირითადი საკითხების თეორიული ასპექტები, ხოლო *მეხუთე* და *მექვსე თავში* მოცემულია შესაბამისი სავარჯიშოები და ამოცანები სათანადო მეთოდური მითითებებითა და ტიპური ამოცანების ამოხსნით.

პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრისას საჭირო ძირითადი ალბათურ-სტატისტიკური ფუნქციების მნიშვნელობათა ცხრილები მოცემულია დანართში (იხ. ცხრილი I-VII).

მეორე თავის §2-ში მოცემულია სასწავლო ექსპერიმენტული ანკეტის ნიმუში, რომლითაც ალაღბედზე შერჩეულ სტუდენტთა ჯგუფში, სტუდენტთა მონაწილეობითვე ჩატარდა სასწავლო ექსპერიმენტული სტატისტიკური კვლევა კონკრეტულ სოციოლოგიურ თემაზე, რაც ვფიქრობ, საგნის შესწავლისთვის საინტერესო იქნება. *დანართი IV* და *V-ში* მოცემულია 2000 წელს საქართველოს განათლების სისტემაში შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ რეალურად ჩატარებული სტატისტიკური კვლევის კითხვარები სრული სახით, რაც ვფიქრობ, დიდ დახმარებას გაუწევს არა მარტო სტუდენტებს, არამედ სოციოლოგიაში პრაქტიკული სტატისტიკური კვლევებით დაინტერესებულ პირებს, როგორც თეორიული ცოდნის შეძენაში, ისე პრაქტიკაში ამ ცოდნის რეალურად გამოყენების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.

ზოგიერთი თავის ბოლოს მოცემულია კითხვები თვითშემოწმებისათვის, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტს არა მარტო გაიმეოროს განვლილი მასალა, არამედ შეამოწმოს მის მიერ შეძენილი ცოდნის დონე.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი ზოგიერთი მასალა არსებული თანამედროვე პუბლიკაციებიდანაა აღებული, შესაბამისი წყაროს იმდენად ზუსტი მითითებით, რომ დაინტერესებულ სტუდენტს თავისუფლად შეუძლია დამოუკიდებლად მათი მოძებნა.

ამ სახელმძღვანელოს წინ უძღოდა ავტორთა კოლექტივთან ერთად დაწერილი მისი პირველი გამოცემა: ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, გ. ფიფია – ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები (რედაქტორი ტ. ბუაძე), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009. სახელმძღვანელოს წინამდებარე მეორე გამოცემაში გამოვიყენე მრავალი კონცეპტუალური მოსაზრება და სტრუქტურული მიდგომა ზემოთ ხსენებული პირველი გამოცემიდან. დიდ მადლობას მოვასხენებ პროფესორებს: გ. ყირმელაშვილს, ი. ბეჟუაშვილს, გ. ფიფიას ამ მოსაზრებათა ჩამოყალიბებისა და პირველ გამოცემაში შეტანილი წვლილისათვის და იმისათვის, რომ მათ წინამდებარე სახელმძღვანელოში ამ მასალის გამოყენების ნება დამრთეს.

დიდ მადლობას მოვასხენებ პროფესორებს: მ. ნადარეიშვილს, ა. კვალიაშვილს, გ. ჯავახიშვილს, ზ. კანდელაკს მათთან ერთობლივი შრომით შექმნილ სახელმძღვანელოებში გადმოცემული ზოგიერთი მეთოდური სიასხლის გამოყენების ნებართვისათვის.

დიდი პატივისცემით ვუხედი მადლობას პროფესორ გ. სოსხაძეს მნიშვნელოვანი მოსაზრებების გამოთქმისა და სამომავლოდ მრავალი კეთილი რჩევისთვის. ასევე დიდი მადლიერების გრძნობით ვიგონებ პროფ. ი. მიქაძის ღვაწლს.

დიდ მადლობას მოვასხენებ ქ-ნ მაკა ბედიანაშვილს სახელმძღვანელოს კომპიუტერული უზრუნველყოფისა და საქმიანი რჩევებისათვის.

მეორე გამოცემა პირველის არა მარტო შესწორებული და შევსებული ვარიანტია, არამედ მისი არსებითად გადასინჯვისა და გადამუშავების შედეგადაა მიღებული.


ავტორი ყველა საქმიან შენიშვნას დიდი სიამოვნებით მიიღებს, რისთვისაც წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით.

ტრისტან ბუაძე

თავი I. შემთხვევით მოვლენათა მათემატიკური მოდელირების შესავალი

§1. მათემატიკური მოდელირების ეტაპები*

მათემატიკა შეისწავლის გარემომცველი სამყაროს რეალურ მოვლენათა მათემატიკურ მოდელებს და ადგენს იმ რაოდენობრივი ხასიათის კანონზომიერებებს, რომელთაც ეს მოვლენები ემორჩილებიან. მათემატიკის ადგილი რეალური სამყაროს კანონზომიერებათა დადგენისას შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგი სქემის სახით (ნახ.1)



(ნახ.1)

* სახელმძღვანელოს პირველად გაცნობისას ამ პარაგრაფის ღრმად შესწავლა აუცილებელი არ არის.

მათემატიკის კავშირი გარემომცველი სამყაროს მოვლენებთან ხორციელდება საფეხურებად:

1) თავდაპირველად ხდება მრავალმხრივი ფაქტორებიდან მეორეხარისხის ფაქტორების ჩამოშორება.

2) არსებითი ფაქტორების განზოგადებით, საწყის ცნებებზე და აქსიომებზე დაყრდნობით აიგება მათემატიკური მოდელი.

3) აგებული მოდელის ფარგლებში აქსიომებიდან გამომდინარე ყალიბდება ახალი დებულებები – თეორემები.

4) ხდება მოდელში მიღებული ახალი მათემატიკური ფაქტების ინტერპრეტაცია თავდაპირველი რეალური მოვლენების ცნებებში.

5) მოწმდება აგებული მათემატიკური მოდელის ვარგისიანობა – ხდება მათემატიკურ მოდელში წარმოდგენილი გათვლების პრაქტიკული შემოწმება.

პრაქტიკული დასკვნები საიმედოა, თუ აგებული მოდელი აღწერს შესასწავლი მოვლენის არსებით მხარეებს.

კარგად, წარმატებით აგებული და მომუშავე მათემატიკური მოდელის მაგალითად გამოდგება ნიუტონის აქსიომებზე აგებული მექანიკა.

§2. შემთხვევითობა ჩვენს ცხოვრებაში ცვალებადობა და კანონზომიერება. ცვლადის ცნება

*„გაზროვნებ, მაშასადამე ვარსებობ“ –
„გონის ფენომენოლოგია“*

გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი (Hegel 1770-1831)

ჩვენ, ადამიანებს, ყოველდღიურ საქმიანობაში ხშირად საქმე გვაქვს ისეთ ფაქტებთან და მოვლენებთან, რომელთა მიმდინარეობისა და შედეგების წინასწარ ზუსტად, ცალსახად განსაზღვრა შეუძლებელია, რაც ართულებს ჩვენს პრაქტიკულ მოღვაწეობას. ამ მოვლენებს **შემთხვევით** მოვლენებს უწოდებენ.

მეორეს მხრივ, ადამიანები მოაზროვნეები და გონიერები ვართ. გვინდა არ გვინდა, ჩვენ „ვსწავლობთ“ („ვაკვირდებით“) ამ მოვლენებს, ფაქტებს, ადამიანთა, ცხოველთა ქცევებს და ა.შ. ამით ჩვენდაუნებურად ვახდენთ ამა თუ იმ შემთხვევით მოვლენაზე, ან შესასწავლ ობიექტთა რაიმე მახასიათებელზე (თვისებაზე) **„სტატისტიკურ დაკ-**

ვირველებს“. შედეგად, „სტატისტიკური მონაცემების“ სახით მოვიპოვებთ გარკვეულ ინფორმაციას ამ მახასიათებლების შესახებ. ვაანალიზებთ მოპოვებულ მონაცემებს, ანუ ინფორმაციას, ვადგენთ გარკვეულ კანონზომიერებებს (ან ვერ ვადგენთ მათ), ვაკეთებთ დასკვნებს, ვირჩევთ სტრატეგიებს (გეგმებს) ჩვენი შემდგომი მოქმედებისათვის და პრაქტიკული მოღვაწეობით ვანხორციელებთ არჩეულ სტრატეგიას.

ჩვენი გონიერი, პრაქტიკული მოღვაწეობის ზოგადი სქემა შემოკლებული სახით ასეთია:

სქემა 1



ეპიზოდი I.* წარმოვიდგინოთ და მიმოვიხილოთ ერთი დღის შესაძლო ეპიზოდი რომელიმე ჩვენთაგანის ცხოვრებიდან (ყურადღება მიაქციეთ ფრჩხილებში ჩაწერილ მინიშნებებს მოვლენათა კატეგორიებად დაყოფის შესახებ):

ამ სემესტრში ლექციები უნივერსიტეტში ყოველდღე 9 საათზე გეწყებათ (სისტემატიურობა, კანონზომიერება). უნივერსიტეტიდან საკმაოდ შორს ცხოვრობთ (ფაქტი). უნივერსიტეტისაკენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გიწევთ მგზავრობა, ამიტომ ჩვეულებისამებრ (სისტემატიურად) დილით 7 საათზე დგებით (კანონზომიერება). დღეს დილით კი 20 წუთის დაგვიანებით გელვობათ (შემთხვევითი მოვლენა, დაირღვა სისტემატიურობა) *ემოციებით* დატვირთულს. (*ემოცია* ადამიანების მახასიათებელი თვისებაა)... წინა ღამით დიდხანს მოგიწიათ “Facebook“-ში სტუდენტ რესპოდენტებთან ურთიერთობა (შემთხვევითი მოვლენა, ცვალებადობა); თემაც საინტერესო იყო: „*სიყვარული*“, „*შფოთი*“, „*მოვალეობა*“ და „*ბედნიერება*“. *შესაძლებელია უფლის, სამშობლოს, დედის, შვილის, საქმის, მოყვასის და ა.შ. სიყვარულის, ანდა პიროვნული ბედნიერებისა და მოვალეობის გრძნობის, შფოთის გაზომვა? როგორ გავზომოთ ეს მახასიათებლები ადამიანებში?* – ამ და მრავალ მსგავს საკითხზე მოგიწიათ პაექრობა. რო-

* ეპიზოდის იდეა იხ. წიგნში [18]

გორც იქნა დაიძინეთ, მაგრამ „დღე-ღამის“ რეჟიმი დაგერღვათ (ცვალებაა, შემთხვევითი მოვლენა).

დილით, კარგად გამოფხიზლებული არც კი ხართ, რომ დგებით, მიდისხართ ფანჯარასთან, გაზაფხულის თბილი, სასიამოვნო დილა თენდება. დადებითი *ემოციით* იტვირთებით და კარგი *განწყობა* გეუფლებათ, მაგრამ *გაშინებთ* ის, რომ ლექციაზე არ დაიგვიანოთ. გონებაში სწრაფად „აკეთებთ გათვლას“ და *აცნობიერებთ*, რომ, თუ დილის ხანმოკლე შხაპითა და სწრაფი საუზმით შემოიფარგლებით, ლექციაზე არ დააგვიანებთ (*ანალიზი* და *პროგნოზი**). აჩქარებით იცვამთ და სწრაფად ჯდებით მაგიდასთან სასაუზმოდ, მაგრამ სიჩქარეში ვეღარ ზომავთ და ფინჯნიდან ცხელი ჩაი გელვრებათ ტანსაცმელზე (შემთხვევითი მოვლენა). თავიდან გიწევთ წასასვლელად მომზადება. აჩქარებული ნაბიჯით ეშვებით კიბეზე. მოულოდნელად მეზობელი შემოგეყარათ (შემთხვევითი მოვლენა), თქვენთან საუბარი სურს. „ლექციებიდან დროულად დავბრუნდებით“, – მიაძახეთ და სწრაფად მიემართებით ქუჩისაკენ, ტაქსის საპოვნელად, რადგან *აცნობიერებთ*, რომ სხვაგვარად ლექციაზე დააგვიანებთ. თქვენდა ბედად, ტაქსიც მალე გამოჩნდა (შემთხვევითი მოვლენა), ჯდებით მანქანაში და ფიქრებს აძლევთ თავს: „დავაგვიანებ? ან, თუ დავაგვიანებ, რამდენ წუთს დავაგვიანებ?“ – ფიქრობთ თქვენ. საკუთარ თავთან პირობას დებთ, რომ მომავალში ასე გვიან აღარ დაიძინებთ (*არსებული ინფორმაციის ანალიზის შედეგად მიღებული დასკვნა და გადაწყვეტილების მიღება*). ქუჩაში მანქანების მოძრაობის ინტენსივობა ჩვეულებრივზე ნაკლებ დატვირთულია (შემთხვევითი მოვლენა), გიმართლებთ და ლექციაზე დროულად მიდისხართ. *რწმენაც* გემატებათ: „დღეს ყველაფერი კარგად იქ

* იხ. ქ.ს.ე., ტ. 8, გვ 194. *პროგნოზი* – გარკვეულ მონაცემებზე დამყარებით რაიმე მოვლენის, პროცესის განვითარებაში მოსალოდნელ ცვლილებათა წინასწარ განჭვრეტა, წინასწარმეტყველება.

დაავადების პროგნოზი – საექიმო მსჯელობა დაავადების სავარაუდო მიმდინარეობისა და დასასრულის შესახებ. იგი ეყრდნობა ეტიოლოგიის, პათოგენეზის სტატისტიკური მონაცემების ცოდნასა და ავადმყოფობის ინდივიდუალური მონაცემების ანალიზს.

პროგნოზირება – მოვლენის განვითარების მეცნიერულად დასაბუთებული კონკრეტული პერსპექტივის დადგენა. რაიმე მოვლენის პროგნოზირება შესაძლებელია მასზე დაკვირვებით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.

ნება“, – ფიქრობთ თქვენ (*პროგნოზი, რომელიც არ ეყრდნობა მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზს*).

ეს ხანმოკლე ცხოვრებისეული ეპიზოდი შეიძლება თქვენ გადაგხდათ თავს, ან არ გადახდათ. მთავარი აქ ისაა, რომ ის წარმოადგენს ამ პარაგრაფის დასაწყისში გადმოცემული მასალის ილუსტრირებას. ამ ეპიზოდის დანიშნულებაა დაგვანახოს, რომ შემთხვევითობა ჩვენს ცხოვრებაში არსებით როლს თამაშობს. მასში ფრაგმენტული მაგალითების სახით წარმოჩენილია შემთხვევითი ფაქტები და მოვლენები, მათთვის დამახასიათებელი ცვალებადობები და კანონზომიერებები, შემთხვევითობის პროგნოზირების შესაძლებლობის იდეები. გარკვეული ობიექტების რაოდენობრივი ან თვისებრივი მახასიათებლების ცვალებადობის განხილვას ცვლადის ცნებამდე მივყავართ. ეპიზოდში დასმულია ამ მახასიათებლების, ანუ ცვლადების „გაზომვის“ შესაძლებლობის საკითხი და სხვ.

განხილული ეპიზოდის მიხედვით ამჩნევთ გარკვეულ კანონზომიერებებს და სისტემატიურობას თქვენს ცხოვრებაში: მიმდინარე სემესტრში ლექციების დაწყების დრო, დროის ჩვეული ოდენობა, რომელსაც თქვენ უთმობთ დამით ძილს, გაღვიძებისა და ადგომის ჩვეული დრო, შხაპის მიღებისა და საუზმობის ჩვეული დრო, დაძინების ჩვეული დრო, კომპიუტერთან გატარებული ჩვეული დრო, გაზაფხულისათვის ჩვეული თბილი ამინდი, უნივერსიტეტამდე მისვლისათვის საჭირო ჩვეული დრო, ავტომანქანების მოძრაობის ჩვეული ინტენსივობა, გარკვეულწილად მოძრაობის ინტენსივობა და უნივერსიტეტამდე მისვლისათვის საჭირო ჩვეული დრო, კონკრეტული მეზობლის ჩვეული ტიპური ქცევა და ა.შ.

• ამავე დროს თქვენ ამჩნევთ, რომ ცვალებადობასაც განიცდით. ზოგიერთ დამეს ძილის დრო სხვებთან შედარებით უფრო გრძელი ან უფრო მოკლე გეჩვენებათ. დღიდან-დღემდე იცვლება ის დრო, რომელსაც თქვენ უთმობთ ძილის შხაპის მიღებას და საუზმეს, უნივერსიტეტისკენ მგზავრობისას მანქანების მოძრაობა მეტ-ნაკლებად უფრო გადატვირთულია (*ინტენსიურია*) და უნივერსიტეტამდე მისვლას ზოგჯერ უფრო მეტ დროს ანდომებთ, ვიდრე ჩვეულებრივ *საშუალო დროა*. ამჩნევთ, რომ *ადამიანთა განწყობა, ქცევა* ცვალებადია.

მაშასადამე, ჩვენი ცხოვრება აღსავსეა კანონზომიერებებითა და ცვალებადობით, ამასთან ცვალებადობა შემთხვევით ცვალებადობას ყოველთვის არ გულისხმობს. მაგალითად, ჩვენი ასაკი ცვალებადია, იგი ყოველწამიერად კანონზომიერად და არა შემთხვევით იცვლება – უწყვეტად, ყოველწამიერად იზრდება და ა.შ. (ამ შემთხვევაში შემთხვევითობა ღმერთმა გაშორეთ). თუ ცვალებადობა შემთხვევითი ხასიათისაა, მაშინ საქმე გვაქვს შემთხვევით მოვლენებთან (შემდგომში მათ *შემთხვევით ხდომილობებსაც* ვუწოდებთ).

- მოვლენათა ეს ცვალებადობა გარემოში ცვლადების არსებობას გულისხმობს. ფსიქოლოგები და *ბიჰევიორისტიკა** (*behaviour – ქცევა*) მეცნიერებების წარმომადგენლები ცვლადს განსაზღვრავენ ასე:

- *ცვლადი variable – არის გარემოს ნებისმიერი მდგომარეობა ან მოვლენა, ნებისმიერი სტიმული, პიროვნული მახასიათებელი ან ქცევა, რომელმაც შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა მნიშვნელობა სხვადასხვა დროს ან სხვადასხვა ადამიანებთან.*

- *ცვლადის ამ განსაზღვრებიდან გამომდინარე, შესასწავლი ობიექტის კონკრეტული მახასიათებელი (თვისება) განიხილება როგორც ცვლადი.* წარმოდგენილ ეპიზოდში ცვლადია: იმ დროის ხანგრძლივობა, რამდენ ხანსაც გეძინათ, საუზმისა და შხაპის მიღების დროის ხანგრძლივობა, უნივერსიტეტში მისვლისათვის დახარჯული დროის ხანგრძლივობა, ქუჩაში მოძრაობის ინტენსივობა, მოძრაობის სიჩქარე, მეზობლის გუნება-განწყობილება, „Facebook“-ში მუშაობის დროის ხანგრძლივობა, რესპოდენტებთან ურთიერთობის ინტენსივობის დონე, თქვენი ფსიქოლოგიური გუნება-განწყობილება, ემოციები, მეცადინეობისა თუ შესრულებული სამუშაოს ნაყოფიერება და სხვა.

- ახლა უკვე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ *სტატისტიკის წინასწარი არაფორმალური და არასრული განსაზღვრება.*

- *სტატისტიკა არის მეცნიერება, რომელიც პოულობს რაღაც მუდმივს და ამ მუდმივის მიმართ ცვალებადობას ზომავს.*

* ბიჰევიორიზმი – იხ. წინამდებარე სახელმძღვანელოს დანართი (VI), ან ქ.ს.ე. ტ. 2. გვ. 424, სტატ. ავტ. ა. შეროზია.

ეპიზოდი II. თბილისის თქვენი საცხოვრებელი სახლიდან რაჭის სოფ. ხონჭიორში მდებარე სააგარაკე სახლამდე 255 კმ-ია. დღეს 8 საათზე გინდათ გაემგზავროთ თქვენი „მერსედესით“. ფიქრობთ და აცნობიერებთ, რომ თუ იმოდრავებთ $V = 85$ კმ/სთ სიჩქარით, $S=255$ კმ-ის გაგლას მოანდომებთ $t = \frac{S}{V} = \frac{255}{85} = 3$ საათს. ესაა მექანიკიდან ცნობილი **ფიზიკური დეტერმინისტული კანონზომიერება**, რომელიც ეყრდნობა იმ ფაქტს, რომ, თუ საწყისი მონაცემებით ზუსტად, ცალსახად განისაზღვრება შედეგი, მაშინ აგებული მოდელი დეტერმინირებულია.

მობილურით რეკავთ და ახლობლებს ატყობინებთ, რომ 11 საათზე ჩახვალთ მათთან (ესაა **შემთხვევითი ცვალებადობის** გაუთვალისწინებლად გაკეთებული **დასკვნა, პროგნოზი**, თუმცა რეალურ სიტუაციას უფრო კარგად აღწერს **შემთხვევითობასთან დაკავშირებული მათემატიკური მოდელები**).

დათქმულ დროს, 8 საათზე, უკვე მანქანაში ჯდებით და მიემგზავრებით. ჩადიხართ შეპირებული 11 საათის ნაცვლად 12 საათზე.

დავალება: მოკლე ჩანაწერის სახით წარმოადგინეთ თქვენი მგზავრობისა და დაგვიანების ერთ-ერთი სავარაუდო ვარიანტი. შეძლებისდაგვარად ამოწერეთ ცალ-ცალკე შემთხვევითი მოვლენები, ცვლადები, სავარაუდო პროგნოზები.

მითითება. ერთი ვარიანტი შეიძლება ასეთი იყოს: თბილისის ერთ-ერთი ქუჩის გავლისას საცობში ხვდებით (შემთხვევითი მოვლენა). ცვლადია მითითებული ქუჩის გავლის დროითი ხანგრძლივობა, საცობში დგომის დროითი ხანგრძლივობა, გზატკეცილზე დიდი საბარგო ავტომანქანების მოძრაობის ინტენსივობა (ავტომანქანების მოძრაობის მახასიათებელი), რომელიც გაზრდილია, რის გამოც „გორის“, „სურამისა“ და ნაქერალას“ გადასასვლელებზე საგრძნობლად გიჭირთ გადასწრებები, ამით ეცემა თქვენი მოძრაობის **საშუალო სიჩქარე** (ცვლადი). გზატკეცილის სარემონტო უბნებშიც დიდხანს გიწევთ მანქანების რიგში დგომა, დგომის დრო ცვლადია. ამასთან, „ნაქერალას“ გადასასვლელზე ნისლია, გაწვიმდა კიდეც (შემ-

თხვევითი მოვლენა), სოფელში დათქმული 11 საათის ნაცვლად ჩადიხართ 12 საათზე.

ეპიზოდი III. დილით, სამსახურში წასვლამდე თქვენს სახლთან მდებარე სუპერმარკეტში შედიხართ პურის საყიდლად. თქვენთვის სასურველი გემოვნების ქართული „დოლის“ პური უხვად აწყვია თაროებზე, რადგან დღეს იგი გაცილებით მეტი მიუღიათ, ვიდრე წინა დღეებში ღებულობდნენ. „სამსახურიდან დღეს ადრე ვბრუნდები, პურს მაშინაც ვიყიდი, რადგან ძალზე ბევრია, თანაც შაქარიც მინდა“, – ფიქრობთ თქვენ („სტატისტიკური მონაცემების“ გაუთვალისწინებლად გაკეთებული პროგნოზი) და მიემგზავრებით სამსახურში. უკან დაბრუნებულს თქვენთვის სასურველი სახის პური აღარ გხვდებათ, 1 კგ. შაქრის ფასიც 10 თეთრით გაზრდილა (შემთხვევითი მოვლენა).

დავალება: უპასუხეთ კითხვებს: რა მოსაზრება შეექმლო დაედო საფუძვლად სუპერმარკეტის გაყიდვების მენეჯერს იმისათვის, რომ პურის მოცემული სახეობა წინა დღეებთან შედარებით მეტი მიიღო? რა სტრატეგია უნდა აირჩიოს სუპერმარკეტის მენეჯერმა მომავალ დღეებში და რატომ?

❖ უამრავი მსგავსი ეპიზოდის განხილვა შეიძლება, რომლებშიც შემთხვევითობა არსებით როლს შეასრულებდა ჩვენს ცხოვრებაში. თეორიულად შემთხვევითობის უშუალო შესწავლას ვერ ვახერხებთ. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია შევისწავლოთ შემთხვევითობასთან დაკავშირებული მათემატიკური მოდელები, როგო რიცაა, მაგალითად, სტატისტიკური დაკვირვებებით მიღებული სტატისტიკური მოდელები და მოვახდინოთ შემთხვევითობის „პროგნოზირება“ ზემოთ მითითებული სქემა 1-ის რიგითობით, რაც სტატისტიკის შესწავლის საგანს შეადგენს. ამ საკითხებს შემდგომში უფრო დეტალურად განვიხილავთ.

ზოგადი მიმოხილვა:

1) ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, გამოდის, რომ, გარკვეული აზრით, ჩვენ ყველანი დამწყები „სტატისტიკოსები“ ვართ;

2) **ობიექტის მახასიათებელი, შესაბამისად ცვლადი შეიძლება იყოს რაოდენობრივი, ან თვისობრივ-ხარისხობ-**

რივი. ინტუიციის მოშველიებით შეიძლება ვთქვათ, რომ რაოდენობრივი ცვლადები (მახასიათებლები) შეიძლება გაიზომოს „ტრადიციული“, კლასიკური გაგებით. თუმცა მათ და თვისობრივ მახასიათებლებს ასევე „ზომავენ“ სპეციალური, მეცნიერულად დამუშავებული მეთოდებით, ანუ შეუსაბამებენ გარკვეულ რიცხვებს.

რაოდენობრივი ცვლადია, მაგალითად: დროის ხანგრძლივობა, სიჩქარე, მანძილი, სიმაღლე, საკრედიტო თანხის ოდენობა, შემოსავალი ერთ სულ მოსახლეზე, მოგება, ეროვნული შემოსავალი, რენტაბელობა, შრომის ნაყოფიერება, ელექტროენერჯის დანახარჯი, ღირებულება, მოცდის დრო, მოთხოვნათა ინტენსივობა, მოძრაობის ინტენსივობა, ლეტალურ შემთხვევათა რაოდენობა, ინფექციის გავრცელების ინტენსივობა და ა.შ.

თვისობრივი ცვლადია, მაგალითად: პროფესია, ოჯახური მდგომარეობა – დაქორწინებული, დაუქორწინებელი, ფსიქოლოგიური განწყობა, შფოთი, ემოცია, ზნეობა, გამბედაობა, ინტელექტი, რელიგიური მრწამსი, იდეოლოგიური შეხედულება, პარტიულობა, სქესი, დაავადებულობა, სოციალური მდგომარეობა, პროფესია, ხარისხი, სტანდარტულობა, სამართლებრივი მდგომარეობა, ეროვნება, ეთნიკური ჯგუფის კუთვნილება და ა.შ.

3) ცვლადების აღსანიშნავად შეიძლება გამოვიყენოთ სიმბოლოები: **X, Y, Z** და ა.შ.

§3. ბაზომვა. ცვლადის ბაზომვის სპალეზი. რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლადები

*„განმეორება ცოდნის დედაა“- ი. გოგებაშვილი
«Повторение – мать учения» – უშინსკი*

ცვლადი (variable) [18;2] არის გარემოს ნებისმიერი მდგომარეობა ან მოვლენა, ნებისმიერი სტიმული, კვლევის ობიექტის შესასწავლი მახასიათებელი, პიროვნული მახასიათებელი ან ქცევა, რომელმაც შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა მნიშვნელობა სხვადასხვა დროს ან სხვადასხვა ადამიანთან.

დავუბრუნდეთ §2-ის ეპიზოდ I-ში ჩვენს წინაშე წა მოჭრილ ერთი შეხედვით არცთუ ისე რთულ კითხვებს. მათზე პასუხის გაცემა თავისთავად ითხოვს ცვლადების გაზომვას. კიდევ უფრო ჩავუღრმავდეთ ამ საკითხს.

შემთხვევითი მოვლენის მეცნიერული კვლევისას დასმულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად საჭიროა დაკვირვების ობიექტის შესასწავლი მახასიათებლის, ანუ **ცვლადის გაზომვა**. „გაზომვა“ განვსაზღვროთ ზოგადად:

გაზომვა (measurement) არის გარკვეული წესების მიხედვით ცვლადებისთვის რიცხვითი მნიშვნელობის მინიჭების პროცესი.

განიხილავენ გაზომვის შედეგების მიკუთვნების ოთხ სკალას: **სახელდების სკალა, რიგის სკალა, ინტერვალების სკალა, შეფარდების სკალა.**

როგორც წესი, ცვლადის „გაზომვის“ შედეგი მიეკუთვნება ერთ-ერთს ამ ოთხი სკალიდან.

გავეცნოთ თითოეულ მათგანს ცალ-ცალკე.

3.1. სახელდების სკალა (Nominal measurement)

თუ ხდება გაზომილი ცვლადის მნიშვნელობების გაერთიანება სხვადასხვა კატეგორიებში და თითოეული კატეგორიისათვის პირობითი რიცხვითი ნომრის ან ასოითი სახელის მინიჭება, მაშინ მიღებულ სკალას **სახელდების სკალა** ეწოდება.

თითოეული კატეგორიისათვის პირობითი რიცხვითი ნომრის მინიჭებით ამ კატეგორიას და მასში გაერთიანებულ ყოველ ინდივიდს დაერქმევა ერთიდაიგივე სახელი. ასეთივე წარმატებით კატეგორიების აღსანიშნავად რიცხვითი სახელის ნაცვლად შეიძლება ასოების გამოყენება. როგორც ვხედავთ, სახელდების სკალაზე ხდება კატეგორიებისა და მასში შემავალი ინდივიდების იდენტიფიკაცია „სახელის დარქმევით“, ანუ სახელდებით. აქედან მომდინარეობს ამ სკალისათვის **სახელდების სკალის** დარქმევა.

მაგალითად, ისეთი ცვლადი, როგორცაა ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების ეთნიკური წარმომავლობა, შეიძლება გავაერთიანოთ კატეგორიებში სახელდების სკალაზე. ამ ცვლადის მიხედვით, საქართველოში მცხოვრები

საქართველოს მოქალაქეები შეიძლება სათანადო ნომრის მინიჭებით გავაერთიანოთ შესაბამისად, კატეგორიებში: ქართველი – მივანიჭოთ სახელად ნომერი 1, ან მივანიჭოთ ასოითი სახელი A (1=ქართველი ან A=ქართველი), აზერბაიჯანული წარმოშობის საქართველოს მოქალაქე (მივანიჭოთ სახელი 2 ან B), ოსური წარმოშობის საქართველოს მოქალაქე (მივანიჭოთ სახელი 3 ან C), აფხაზური წარმოშობის საქართველოს მოქალაქე (მივანიჭოთ სახელი 4 ან D), სომხური წარმოშობის საქართველოს მოქალაქე (მივანიჭოთ სახელი 5 ან E) და ა.შ.

კატეგორიისათვის მინიჭებული რიცხვითი ნომერი არაა მისთვის რიცხვითი მნიშვნელობის მატარებელი და რეალური საზომი. კატეგორიებისათვის მინიჭებული რიცხვები ასრულებენ მხოლოდ იდენტიფიკაციის ფუნქციას. ბიჰევიორისტული მეცნიერებების წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ კატეგორიების დალაგება სახელდების სკალაზე არ იძლევა რაოდენობრივ ინფორმაციას გაზომილი ცვლადის შესახებ.

სახელდების სკალის კიდევ ერთი მაგალითია სტუდენტთა ცოდნის შეფასების არსებული სისტემის შემდეგი მოდიფიცირებული ვარიანტი:

შეფასება	ნომერი (სახელის მინიჭება)	სახეობა
ფრიადი	A	დადებითი
ძალიან კარგი	B	დადებითი
კარგი	C	დადებითი
დამაკმაყოფილებელი	D	დადებითი
საკმარისი	E	დადებითი
ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ეძლევა გამოცდის გადაბარების უფლება	Fx	უარყოფითი
ჩაიჭრა. სტუდენტმა კრედიტის მოსაპოვებლად საგანი თავიდან უნდა გაიაროს	F	უარყოფითი

3.2. რიგის სკალა (ordinal measurement). რანჟირება

რიგის სკალა არის ისეთი სკალა, რომელზედაც ცვლადი სიდიდე მნიშვნელობების მიხედვითაა დალაგებული.

მაგალითად, სტუდენტთა *შფოთვა* მათემატიკის გამოცდაზე გასვლის წინ შეიძლება გაიზომოს რიგის სკალაზე შემდეგი წესით: სკალაზე ინდივიდები შეიძლება დალაგდნენ უფრო მშფოთვარედან ნაკლებად მშფოთვარემდე. ინდივიდს, რომელიც ყველაზე მეტ შფოთს ამჟღავნებს, ენიჭება ნომერი – რანგი 1, მასზე ნაკლებად მშფოთვარეს – რანგი 2, შემდეგს – რანგი 3 და ა.შ. ინდივიდები რიგის სკალაზე დალაგდებიან უფრო მშფოთვარედან ნაკლებად მშფოთვარემდე.

შესაძლებელია რიგის სკალაზე ინდივიდების სხვა მიმდევრობით დალაგებაც – ნაკლებად მშფოთვარედან უფრო მშფოთვარემდე.

1) ამ მაგალითში *ცვლადად* განიხილება *სტიმული* – *შფოთი* (შფოთვა, შეშფოთება);

2) *რიგის სკალაზე სიდიდის მნიშვნელობების მიხედვით დაგდება ან სტიმული, ან ინდივიდები.* ხშირად რიცხვითი მნიშვნელობა 1, ანუ რანგი 1, ენიჭება სტიმულს ან ინდივიდს (რადაცას ან ვიდაცას), რომელსაც გასაზომი მახასიათებელი (ცვლადის მნიშვნელობა) ყველაზე დიდი ოდენობით აქვს. შემდეგი რიცხვითი მნიშვნელობა 2, ანუ რანგი 2, ენიჭება იმ სტიმულს ან ინდივიდს, რომელსაც მოცემული მახასიათებელი დიდი ოდენობით აქვს, მაგრამ წინაზე ნაკლები. რიცხვითი მნიშვნელობა 3, ანუ რანგი 3 მიენიჭება შემდეგს და ა.შ.

რიგის სკალაზე ცვლადის (მახასიათებლის) მნიშვნელობების რანგებად დალაგებას *რანჟირება* ეწოდება.

ამრიგად, რიგის სკალა ახდენს ცვლადის მნიშვნელობების რანჟირებას, მაგრამ იგი ვერ იძლევა გაზომილი ცვლადის მნიშვნელობების რანგებს შორის განსხვავებულობის განსაზღვრას, ანუ რამდენად განსხვავდება გაზომილი ცვლადი რანგებს შორის. გაზომილი ცვლადის მიხედვით, შესაძლებელია მცირე განსხვავება იყოს რანგ 1-ს და რანგ 2-ს შორის, მაგრამ შეიძლება ეს განსხვავება გაცილებით დიდი იყოს რანგ 2-ს და რანგ 3-ს შორის.

მაგალითად: სიმაღლეზე ხტომაში საპრიზო სამეულში მოხვედრილმა სპორტსმენებმა აჩვენეს შედეგები 2მ 21სმ, 2მ 19სმ და 2მ 5სმ. შესაბამისად, მხტომელთა რანგები იქნება 1, 2 და 3. სიმაღლეზე ნახტომი პირველ და მეორე სპორტსმენს შორის განსხვავდება 2სმ-ით, თუმცა მეორე და მესამე სპორტსმენს შორის განსხვავება 14სმ-ია.

ერთხელ კიდევ შევნიშნოთ, რომ **რიგის სკალა** იძლევა ინფორმაციას ცვლადის მიხედვით ინდივიდების თუ საგნების რიგითობის შესახებ, მაგრამ არ აჩვენებს გაზომილი ცვლადის სიდიდეს. დაზუსტებით ვერ ვიტყვით, რომ რანგი 1 შეესაბამება გაზომილი ცვლადის მეტ ოდენობას, ანდა უმცირესი რანგის მქონე ინდივიდს. ვერ ვიტყვით, რომ რანგი 1-ის მქონე საგანს ყველაზე ნაკლებად ახასიათებს გაზომილი მახასიათებელი.

მაგალითად, შეიძლება ვაჩვენოთ ბავშვებს მრავალსერიანი მულტიპლიკაციური ფილმი, ვთქვათ, „ტომი და ჯერი“, „აბა დამაცადე“ ან სხვ. და შეიძლება ვთხოვოთ მათ დაასახელონ ყველაზე უფრო სასაცილო სერია, შესაბამის ინდივიდს ან საგანს (ბავშვს ან სერიას) ენიჭება რანგი 1, შემდეგ მომდევნო, ყველაზე სასაცილოს, მაგრამ წინასთან შედარებით უფრო ნაკლებად სასაცილოს მიენიჭება რანგი 2 და ა.შ. მოკლედ, რანგის სკალაზე ხდება მულტიპლიკაციური ფილმის სერიების, ან შესაბამისი ინდივიდების დალაგება უფრო სასაცილოდან ნაკლებ სასაცილომდე.

შეიძლება მოვახდინოთ რანგის სკალაზე მულტიპლიკაციური ფილმის სერიების, ან შესაბამისი ინდივიდების დალაგება უფრო მოსაწონიდან ნაკლებად მოსაწონი რანგების მიხედვით.

რომელიმე ინდივიდმა, რომელიც მონაწილეობდა ექსპერიმენტში, შეიძლება ყველა სერია აღიქვა სასაცილოდ (ან მოსაწონად), მაგრამ მან მაინც ერთ რომელიმე სერიას მიანიჭა რანგი 1. მინიჭებული რანგი 1 იმავე ინფორმაციის მატარებელია, რა ინფორმაციასაც ფლობს რანგი 1, რომელიც მიანიჭა იმ ინდივიდმა, რომელსაც არცერთი სერია არ მოეჩვენა სასაცილოდ (ან მოსაწონად).

მიუხედავად ამისა, მაინც ითვლება, რომ რიგის სკალა პირველი წარმატებული ნაბიჯია ცვლადის უფრო ზუსტი გაზომვის განვითარებისაკენ.

3.3 ინტერვალების სკალა (Interval measurement)


გაზომვის სკალას, რომელზედაც ცვლადის მნიშვნელობები დალაგებულია რიგის სკალის მსგავსად და მინიჭებულ რიცხვებს შორის განსხვავება ასახავს ცვლადის მნიშვნელობებს შორის ერთი და იმავე სიდიდის სხვაობას, ინტერვალების სკალა ეწოდება.

❖ ინტერვალების სკალისათვის მასზე ნული პირობითადაა ათვლის საწყის წერტილად არჩეული. შეიძლება საწყის წერტილად მივიჩნიოთ ნებისმიერი სხვა მნიშვნელობა და მისგან დავიწყოთ ათვლა.

ადამიანებს აქვთ პიროვნული მახასიათებლები, დამოკიდებულებები, გააჩნიათ ოჯახური ბედნიერება, სიყვარული, საგნების შიში, მიზნის მიღწევის მოტივაცია ან ლიდერობა და სხვა. ამ მახასიათებლების, ანუ ცვლადების შესაფასებლად ბიჰევიორისტული მეცნიერებების წარმომადგენლები ხშირად იყენებენ ინტერვალების სკალებს.

ბუნებრივია, დაგებადათ კითხვა, მაინც რას წარმოადგენს კონკრეტულად ეს სკალა? როგორც წესი, ამ სკალაზე წინა პლანზეა წამოწეული დებულება კვლევის მიმართულების შესახებ და პასუხების სკალა ორი უკიდურესი პოლუსით (ვთქვათ, მარცხენა, მარჯვენა ალტერნატიული პასუხებით) და მათ შორის მოთავსებული რამდენიმე წერტილით (პასუხით), რომელსაც თავისი შეხედულების მიხედვით ირჩევს ინდივიდი (რესპოდენტი).

მაგალითად, დამოკიდებულების სკალაზე ინდივიდს შეიძლება მოეთხოვებოდეს უპასუხოს კითხვას (დებულებას): „თამბაქოს წვეის ამკრძალავი კანონი ამცირებს ფილტვის კიბოთი გარდაცვალებულთა რიცხვს?“ რესპოდენტი პასუხს აღნიშნავს ასეთ სკალაზე:



მას შემდეგ, რაც რესპოდენტი გასცემს პასუხს, თითოეულ კატეგორიას ენიჭება რიცხვითი მნიშვნელობა.


❖ შეფასების სკალების ორ უკიდურეს პოლუსს შორის შეიძლება გაზომილი ცვლადის ნებისმიერი რაოდენობის კატეგორია მოთავსდეს. თუ მოთავსდა 5 კატეგორია, მაშინ ამ სკალას 5 ქულიანი სკალა ეწოდება, თუ მოთავსდა 7 კატეგორია, მაშინ სკალა 7 ქულიანია, ასევე მიიღება 9 ქულიანი სკალა და ა.შ.

განვიხილოთ მძღოლების ქცევაზე ცუდი ამინდის (ნისლი, წვიმა, თოვლი) გავლენის რწმენის 9 ქულიანი სკალა. საკვლევი დებულება ასეთია: „**კარგი აზრია ცუდ ამინდში სახლში დარჩენა.**“

1	2	3	4	5	6	7	8	9
სრულად არ ვეთანხმები				არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები				სრულად ვეთანხმები

რესპოდენტი (პიროვნება) ირჩევს რიცხვს 1-დან (სრულად არ ვეთანხმები) 9-მდე (სრულად ვეთანხმები), რითაც იგი მიუთითებს, თუ რამდენად ეთანხმება იგი საკვლევ დებულებას.

❖ შეფასების სკალა შეიძლება სხვა ფორმით იყოს მოცემული, შეიძლება მოითხოვებოდეს პიროვნების, ან მახასიათებლის შემდეგი ბიპოლარული ზედსართავი სახელებით შეფასება:




შესაფასებელი გასაზომი ცვლადის შესაბამისად, შეიძლება განიხილებოდეს ზედსართავი სახელები არა-გულწრფელი – გულწრფელი; მშვიდი – არამშვიდი – მბორგავი; მიმზიდველი – არამიმზიდველი; ცივი – ცხელი; კეთილი – არაკეთილი და ა.შ.

❖ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მას შემდეგ, რაც პიროვნება საკვლევი დებულების მიხედვით გასცემს კითხვებზე პასუხებს, სკალის თითოეულ კატეგორიას ენიჭება რიცხვითი მნიშვნელობა. ხშირად სკალის რომელიმე პოლუსზე მოთავსებული ზედსართავი სახელი ხდება პრიორიტეტული. ამ შემთხვევაში პრიორიტეტულ ზედსართავ სახელთა ნახევარს ათავსებენ სკალის მარცხენა

ნაწილში, ხოლო მეორე ნახევარს – მარჯვენა ნაწილში. ამით თავიდან ვიცილებთ სკალის მარჯვენა მხარეს მოთავსებულ დებულებათა გადასინჯვას.

❖ ხშირად ცდის პირის (რესპოდენტის) შეფასება ხდება ჯამური შეფასების სკალებით. ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თუ მოცემულია საკვლევი დებულების მიხედვით შედგენილი რამოდენიმე სკალა. ქვემოთ განიხილება **ოთხი დებულებისაგან შედგენილი სკალის მაგალითი**.

სატელევიზიო ჟიური აფასებს სიმღერის სატელევიზიო კონკურსში მონაწილე ბავშვებს: თამარს (მცხეთა), მარიამს (თბილისი), ქეთის (ქუთაისი), სალომეს (ამბროლაური), ნინოს (თბილისი). შეფასება ხდება ქცევის ოთხი მახასიათებლის მიხედვით. ეს მახასიათებლებია: ა) ხმის ტემბრი, ბ) ხმის დიაპაზონი, გ) მუსიკალურობა, დ) არტისტულობა. გაზომვა მიმდინარეობს შესაბამისად, ერთნაირ 9 ქულიან ოთხ სკალაზე:



თითო სკალაზე მითითებული მახასიათებლის კვლევისას ჟიურის წევრი ირჩევს ერთ მისთვის მისაღებ რიცხვს 1-დან მარჯვენა პოლუსამდე, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად ეთანხმება მოცემულ დებულებას.

კონკურსანტის (მომღერლის) საბოლოო ქულის მისაღებად ცალკეულ სკალაზე მიღებული ქულები ჯამდება. შედეგად მიღებულ ქულათა შესაძლებელი დიაპაზონი ზემოთ მინიშნებული 4-დებულებიანი სკალებისათვის იქნება $1+1+1+1=4$ -დან (თუ ყველგან 1-ქულიანი შეფასებაა) $9+9+9+9=36$ -მდე (თუ ყველა სკალაზე მაქსიმალური ქულით იქნება შეფასება).

❖ სკალებზე ქულების მითითებული დალაგება 1, 2 და ა.შ., პირობითია. შეიძლება დალაგება იწყებოდეს სხვა რიცხვიდან, ვთქვათ, 10-დან, ყოველი მომღვენო ნომრის 10 ერთეულით გაზრდით. მაშინ მიღებული ჯამური შეფასების დიაპაზონი იქნება 40-დან ($10+10+10+10=40$) – 360 ქულამდე ($90+90+90+90=360$). გარკვეული მოსაზრებით, ალბათ აჯობებდა, რომ დებულებათა რაოდენობა, სკალაზე კატეგორიების მონიშვნათა რაოდენობა და კატეგორიების ინტერვალები თანაბარი (ტოლი) ყოფილიყო.

❖ ამ კონკურსში ვთქვათ, კონკურსანტებმა ქულების შეჯამების შემდეგ გაიყვეს ადგილები შემდეგი რიგის მიხედვით: 1. სალომე (ამბროლაური) – 31, 2. ნინო (თბილისი) – 30, 3. ქეთი (ქუთაისი) – 29, 4. თამარი (მცხეთა) – 28, 5. მარიამი (თბილისი) – 27. როგორც განხილულიდან ჩანს, ცალკეულ სკალაზე დებულებაში აღწერილი კონკრეტული მახასიათებელი უფრო მეტად უნდა „ჰქონდეს“ დანაყოფ ქულა 5-ს, ვიდრე ქულა 4-ს, ასევე ქულა 4-ს უფრო მეტად, ვიდრე ქულა 3-ს, მაგრამ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ მახასიათებელში განსხვავება 5 და 4 ქულებს შორის იგივეა, რაც 4 და 3 ქულებს შორის. თუმცა უნდა ვიფიქროთ, რომ რამოდენიმე ცალკეულ სკალაზე რესპოდენტისაგან (კონკურსანტისაგან) მიღებული შეფასებების შეჯამებით მიღებული საბოლოო ქულა უფრო მეტ ინფორმაციას იძლევა, ვიდრე მხოლოდ რიგის შესახებ ინფორმაციას. ამიტომ სტატისტიკური ანალიზისათვის უპირატესობას ანიჭებენ ინტერვალების სკალებს.

❖ ინტერვალების სკალის ტიპური მაგალითებია ცელსიუსისა (C) და ფარენგეიტის (F) ტემპერატურის სკალები. ქვემოთ მოცემულია ორივე სკალაზე თანაბარი ტემპერატურების ურთიერთშესაბამისი განაწილების ცხრილის ფრაგმენტი:

თანაბარი ტემპერატურები	
⁰ C (ცელსიუსით)	⁰ F (ფარენგეიტით)
0	32
20	68
40	104
60	140
80	172

როგორც წესი, არცერთ ამ სკალას არ გააჩნია აბსოლუტური ნული. ეს აიხსნება იმით, რომ ტემპერატურა შეიძლება დაეცეს ნულ გრადუსზე ქვემოთაც. ცელსიუსის 20⁰C-ით სხვაობა ყოველთვის ტოლია ფარენგეიტის 36⁰F-ით სხვაობისა. 20⁰C-სა და 40⁰C-ს შორის სხვაობა იგივეა, რაც 60⁰C-სა და 40⁰C-ს შორის სხვაობაა. მაგრამ არასწორი იქნება დასკვნა, თუ ვიტყვით, რომ ტემპერატურა 40⁰C-ზე *ორჯერ* უფრო მაღალია, ვიდრე 20⁰C-ზე. ეს ფაქტი რომ ასე იყოს, მაშინ იგივე შეფასება უნდა იყოს ფარენგეიტის სკალის შესაბამის 104⁰F-სა და 68⁰F-ს შორის. ეს ასე არაა: $\frac{40^{\circ}C}{20^{\circ}C} = 2$, მაგრამ $\frac{104^{\circ}F}{68^{\circ}F} = 1,5$; ($1,5 \neq 2$)

3.4 შეფარდების სკალა (Ratio measurement)

სკალას, რომელზეც გაზომილი ცვლადის სიდიდეა დალაგებული და მინიჭებულ რიცხვებს შორის განსხვავება ასახავს ცვლადის მნიშვნელობებს შორის იმავე სიდიდის განსხვავებას, ეწოდება *ცვლადის გაზომვის შეფარდების სკალა*.

შეფარდების სკალაზე მონიშნულია აბსოლუტური ნულის წერტილი, რომელიც შეესაბამება გასაზომი ცვლადის სრულ არარსებობას. ამ სკალაზე არსებობს საზომი ერთეული. თვით სკალის ერთეულები თანაბარი ინტერვალებით არიან ერთმანეთისაგან დაშორებული. ამიტომ ცვლადის ზემოთ განხილული გაზომვის სხვა ცვლადებისაგან განსხვავებით, შეფარდების სკალაზე შესაძლებელია ვთქვათ გასაზომი ერთი და იგივე ცვლადით რამდენჯერ მეტად ხასიათდება რომელიმე კონკრეტული საკვლევი ობიექტი, მაგალითად: თუ იზომება დრო, რომელ-

საც გიორგი და ლაშა ანდომებს 200 მეტრი მანძილის გარბენას, მაშინ 20 წამს და 30 წამს შორის სხვაობა $30\text{წმ}-20\text{წმ}=10\text{წამია}$. ეს იგივეა, რაც 40 წამსა და 50 წამს შორის სხვაობაა $50\text{წმ} - 40\text{წმ} = 10\text{წმ-ს}$. ამასთან, ის, ვინც 50 წამს ანდომებს 200მ მანძილის გარბენას, ორჯერ მეტ დროს ხარჯავს იმასთან შედარებით, ვინც 25 წმ-ს ანდომებს მანძილის გარბენას.

შეფარდების სკალა გამოიყენება, თუ იზომება დრო, რომელიც დაიხარჯა რაიმე სამუშაოს შესასრულებლად, წონა, ფართობი, მანძილი, სიმაღლე და ა.შ. ამ სიდიდეებს (ცვლადებს) გააჩნიათ აბსოლუტური ნული და ამავე დროს სკალის ერთეულები თანაბარი მანძილებით არიან დაშორებული. ამ გამონათქვამის შემოწმება თქვენთვის მოგვიწოდია, რაც იმედია, არ გაგიჭირდებათ პრაქტიკულად და არც თეორიულად.

ბიჰვეიორისტულ მეცნიერებებშიც შეფარდების სკალას იყენებენ, როდესაც იზომება ადამიანის, ცხოველის რაიმე გამლიზიანებელზე რეაქციის დრო, ანდა რაიმე ფსიქოლოგიური დავალების, ტექსტის, ანდა თავსატეხის შესრულებაზე დახარჯული დრო.

ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში ხშირად სწორედ ცვლადების გაზომვის შეფარდების სკალას ვიყენებთ, თუნდაც გარკვეული სიდიდეების გაზომვისას ჩვეულებრივი კლასიკური გაგებით.

დავალება: თქვენთვის ცნობილია სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა:

ქულები	შეფასება	ნოშანი (სახელის მინიჭება)	სახეობა
91-100	ფრიადი	A	დადებითი
81-90	ძალიან კარგი	B	დადებითი
71-80	კარგი	C	დადებითი
61-70	დამაკმაყოფილებელი	D	დადებითი
51-60	საკმარისი	E	დადებითი
41-50	ვერ ჩააბარა, სტუდენტს ებღევა გამოცდის გადაბარების უფლება	Fx	უარყოფითი
0-40	ჩაიჭრა. სტუდენტმა კრედიტის მოსაპოვებლად საგანი თავიდან უნდა გაიაროს	F	უარყოფითი

გამოიყენეთ ამ ცხრილის სვეტები და ცალ-ცალკე შეადგინეთ ცვლადთა გაზომვის სხვადასხვა სკალა, თან მიუთითეთ სკალის დასახელება.

3.5 თვისობრივი, რაოდენობრივი მონაცემები და ცვლადები ბიჰევიორისტულ მეცნიერებებში. ცვლადების კლასიფიკაცია

ამ საკითხების შესწავლისას ჩვენი ყურადღების ცენტრში ისევ იქნება ცვლადების გაზომვის სკალები.

❖ ბიჰევიორისტული მეცნიერების წარმომადგენლები *მონაცემებს* (Data – მრ., Datum – მს.) განსაზღვრავენ, როგორც ქულებს, ქცევის, სტიმულის ან მახასიათებლების (ცვლადების *გაზომვის შედეგებს*, რომლებიც მიიღებიან ადამიანებზე ან ცხოველებზე დაკვირვების შედეგად.

❖ როგორც ადრე შევნიშნეთ, სახელდების სკალაზე ინდივიდების, ადამიანების, ცხოველებისა თუ საგნების სხვადასხვა კატეგორიებში გასაერთიანებლად გამოიყენება ძირითადად რიცხვები (ქულები), შესაძლებელია ასოების გამოყენებაც. მაგრამ ეს რიცხვები და ასოები ვერ იძლევიან რაოდენობრივ ინფორმაციას იმ ცვლადის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მოხდა სკალაზე შესასწავლი ობიექტების ან მახასიათებლების კატეგორიებში გაერთიანება. კატეგორიებად გაერთიანებული ობიექტები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან რაღაც *თვისების* (ფერი, რწმენა, მრწამსი, სტიმული, ოჯახური მდგომარეობა, ხარისხი და ა.შ.) მიხედვით. აქედან გამომდინარე, *სახელდების სკალა იძლევა თვისობრივ მონაცემებს: შესაბამისი ცვლადი, ანუ მახასიათებელი თვისობრივი ცვლადია.*

❖ რიგის ინტერვალებისა და შეფარდების სკალებზე ცვლადის გაზომვის შედეგად ცვლადისთვის მინიჭებული რიცხვები გამოხატავენ ამ ცვლადის სიდიდეს, რაოდენობას. *რიგის, ინტერვალებისა და შეფარდების სკალები იძლევიან რაოდენობრივ მონაცემებს.*

ინტერვალებისა და შეფარდების სკალები გასაზომი ცვლადის ძირითადი თვისებებისა თუ მახასიათებლების რაოდენობის უფრო ზუსტად განსაზღვრის საშუალებას იძლევიან, ვიდრე რიგის სკალა.

ინტერვალებისა და შეფარდების სკალები სტატისტიკაში შეკრება-გამოკლებისა და გამრავლება-გაყოფის მათემატიკური ოპერაციების მრავალფეროვანი გამოყენების შესაძლებლობას იძლევიან. ამიტომ ამ სკალებზე მიღებულ მონაცემებს უპირატესობა ენიჭებათ.

შენიშვნა: თვისობრივ და რაოდენობრივ ცვლადებს, მახასიათებლებსა და მონაცემებს მომავალში ზოგადად ისევ დავუბრუნდებით.

❖ ცვლადები შეიძლება იყოს **დისკრეტული** და **უწყვეტი**. დისკრეტულ ცვლადს ხშირად წყვეტილ ცვლადსაც უწოდებენ.

დისკრეტული ცვლადი (Discrete variable) არის ისეთი ცვლადი (მახასიათებელი), რომელმაც შეიძლება მიიღოს მნიშვნელობები სასრული ან თვლადი სიმრავლიდან.

მაგალითად: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა რაოდენობა, თბილისში რეგისტრირებული ავტომანქანების რაოდენობა, ოჯახის ელექტრომრიცხველზე თვის განმავლობაში აღრიცხული დახარჯული ელექტროენერგიის რაოდენობა, მზის გალაქტიკაში ციურ სხეულთა რაოდენობა – დისკრეტული ცვლადებია.

უწყვეტი ცვლადი (Continuous variable) არის ცვლადი (მახასიათებელი), რომელმაც შეიძლება მიიღოს მნიშვნელობები ცვლადის ნებისმიერ ორ დონეს შორის. უწყვეტ ცვლადს აქვს მნიშვნელობათა შემოუსაზღვრელი სიმრავლე. უწყვეტი ცვლადის მაგალითია სხეულის ტემპერატურა. ის შეიძლება იყოს $36,4^{\circ}\text{C}$ ან $36,7^{\circ}\text{C}$. ტემპერატურა არ შემოისაზღვრება ორი რომელიმე მნიშვნელობით, ვთქვათ, 36°C და 37°C -ით, რადგან იგი შეიძლება იყოს **ნებისმიერი** რიცხვი ამ ორ დონეს შორის, ასევე ადამიანის წონა. ფსიქოლოგიური ცვლადები ხშირად განიხილებიან როგორც უწყვეტი ცვლადები. ასეთებია შფოთვა, ინტელექტი. ისინი გაიზომებიან სკალებით, რომლებზედაც ცდის პირებს დისკრეტული ქულები ენიჭებათ.

ხშირად ბიჰევიორისტული მეცნიერების წარმომადგენლები იკვლევენ ცალკეული ინდივიდებისა და ინდივიდთა ჯგუფების ქცევის მიზეზებს ექსპერიმენტის მეშვეობით. ექსპერიმენტის ჩატარებისათვის გამოყოფენ ცვლადს, რომელსაც **დამოუკიდებელი ცვლადი** (Independent

variable) ეწოდება და საფიქრებელია, რომ იგი გავლენას ახდენს ინდივიდების ქცევაზე, ანდა ექსპერიმენტის სხვა ცვლადზე. ცვლადს, რომელზედაც გავლენას ახდენს დამოუკიდებელი ცვლადი, ეწოდება **დამოკიდებული ცვლადი** (Dependent variable). მაგალითად, საკვებში ფერმენტების გარკვეული რაოდენობის დამატება ზრდის ძროხის რძეში ცხიმოვანობას. აღნიშნული დამოკიდებულებების ხარისხის შესწავლა ხდება გარკვეული სტატისტიკური მეთოდებით, რომელთაც მომავალში შევისწავლით.

3.6 ბაზომვის რეალური საზღვრების დადგენა. დამრგვალება

- გავიხსენოთ დამრგვალების წესები.

თვლის ათობით სისტემაში რიცხვები ჩაიწერებიან ციფრებით: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 სათანადო თანრიგებში, ამასთან, რიცხვით ჩანაწერში მარჯვნიდან მარცხნივ თანრიგები იცვლებიან დაბალი თანრიგიდან მაღალი თანრიგისაკენ, ანუ რიცხვით ჩანაწერში მარცხნივ მდგომი რიცხვი 10-ჯერ უფრო მაღალი თანრიგისაა, ვიდრე მისი მეზობელი ციფრი მარჯვენა თანრიგში.

- თუ დასამრგვალებელი თანრიგის მეზობელ დაბალ თანრიგში მდგომი ციფრი 5-ზე მეტია, მაშინ დასამრგვალებელ თანრიგში ჩაიწერება ერთით მეტი ციფრი, ხოლო მასზე დაბალ თანრიგში მდგომი ციფრები შეიცვლება 0-ებით:

$10789 \approx 10800$, დამრგვალდა ათასეულამდე სიზუსტით.

$54,739 \approx 54,74$, დამრგვალდა მძიმის შემდეგ ორ თანრიგამდე (ანუ მძიმის შემდეგ ერთ მეასედამდე სიზუსტით)

- თუ დასამრგვალებელი თანრიგის მეზობელ დაბალ თანრიგში მდგომი ციფრი ნაკლებია 5-ზე, მაშინ დასამრგვალებელ თანრიგში დარჩება იგივე ციფრი, ხოლო მასზე დაბალ თანრიგში მდგომი ციფრები შეიცვლებიან 0-ებით.

$10749 \approx 10700$,

$54,731 \approx 54,73$

- თუ დასამრგვალებელი თანრიგის მეზობელ დაბალ მარჯვენა თანრიგში მდგომი ციფრია 5, მაშინ დასამრგვალებელ თანრიგში მდგომი ციფრი გაიზრდება 1-ით, თუ იგი კენტი ციფრია, ხოლო დარჩება იგივე, თუ იგი ლუწი ციფრია. ამასთან, მასზე დაბალ თანრიგებში ჩაიწერება ციფრი 0.

$$10751 \approx 10800, \quad 54,735 \approx 54,74$$

$$10859 \approx 10800, \quad 54,785 \approx 54,78$$

რატომ გავიხსენეთ დამრგვალების ეს წესები და რატომ გვჭირდება მიახლოებითი რიცხვები?

ამ საკითხის შესწავლა ძალზე მნიშვნელოვანია შემდგომში გარკვეული სტატისტიკური გამოთვლების წარმოებისას მნიშვნელობათა დამრგვალებისათვის, სიხშირეთა განაწილებების აგებისა და გაზომვის რეალური საზღვრების დადგენისას. ამ ეტაპზე განვიხილავთ მხოლოდ გაზომვის რეალური საზღვრების დადგენის საკითხებს.

3.7. გაზომვის რეალური საზღვრები

გაზომვის რეალური საზღვრების დადგენას დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით, უწყვეტი ცვლადების გაზომვების შედეგების სტატისტიკური შესწავლისას.

როგორც უკვე აღინიშნა, ტემპერატურა, რაიმე სამუშაოს შესრულებისათვის დახარჯული დრო, თითოეული ჩვენთაგანის წონა, მრავალი ფსიქოლოგიური ცვლადი, როგორცაა შფოთვა, ინტელექტი და ა.შ. **უწყვეტ ცვლადებად** მოიაზრება. **უწყვეტი ცვლადის გაზომვისას უპირველეს ყოვლისა, უნდა შეირჩეს გაზომვის სკალა და გაზომვის სიზუსტე.** როგორც პარაგრაფის დასაწყისში აღინიშნა, გაზომვისას უწყვეტი ცვლადის არსებულ სიდიდეებს გაზომვის სკალაზე ენიჭება კონკრეტული რიცხვითი მნიშვნელობები, მაგრამ ეს რიცხვები ვერ ასახავენ ცვლადის სიდიდის რეალურ მნიშვნელობებს, ისინი არიან ცვლადის რეალურ სიდიდესთან მხოლოდ მიახლოებული მნიშვნელობები. ამდენად, დიდი მნიშვნელობა აქვს ცვლადის გაზომვის რეალური საზღვრების დაზუსტებას. ცვლადის გაზომვის სიზუსტე მოთავსებულია

მინიჭებული რიცხვების რეალურ საზღვრებში. რას ნიშნავს ეს?

განვიხილოთ დროითი ცვლადის მაგალითი: ვთქვათ, გვინტერესებს რამდენ ხანს შეუძლია ადამიანს სუნთქვის შეკავება. ცდის პირს, ადამიანს, ეძლევა შესაბამისი დავალება. დროის გაზომვა ხდება *წამზომით*, რომელიც ზომავს უახლოესი მთელი წამის სიზუსტით (გაზომვის სკალა და სიზუსტე შერჩეულია). თუ დაკვირვების შედეგად წამზომზე დაფიქსირდა დრო 47 წმ, მაშინვე დაისმება კითხვა: რამდენად აფასებს ეს რიცხვი ცვლადის რეალურ სიდიდეს? ანდა რამდენად ზუსტია გაზომვის ეს შედეგი? გაზომვა ხდება უახლოესი 1 წმ-ის სიზუსტით, ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გაზომვის რეალური შედეგი ამ დაკვირვების მიხედვით შეიძლება ყოფილიყო 47,1 წამიც და 46,8 წამიც. რადგან დამრგვალების შედეგად 47,1 წმ \approx 47 წმ, ასევე 46,8 წმ \approx 47 წმ, უახლოეს წამამდე სიზუსტით, მაგრამ დაფიქსირებული სიდიდით (47 წმ) და მითითებული სიზუსტით – წამზომის სკალის მიხედვით ვერ იქნებოდა 46 წმ ან 48 წმ. ამ გაზომვის (47 წმ) სიზუსტე განისაზღვრება რიცხვის რეალური საზღვრებით. გაზომვის (რიცხვის) რეალური ქვედა საზღვარი არის რიცხვისა და მის წინა რიცხვის შუაწერტილი გაზომვის სიზუსტის გათვალისწინებით. 47 წმ-ის წინა რიცხვია 46, ამიტომ შუაწერტილი იქნება 46,5 წმ. გაზომვის (რიცხვის) რეალური ზედა საზღვარი არის ამ რიცხვის (47 წმ-ის) და მისი მომდევნო რიცხვის (48 წმ-ის) შუაწერტილი, ანუ 47,5 წმ. რიცხვის წინა და მომდევნო რიცხვები, შესაბამისად კი რეალური ქვედა საზღვრები და რეალური ზედა საზღვრები არიან საზომი ერთულის მიხედვით სკალაზე „მომდევნო გაზომვადი მნიშვნელობები“. ამიტომ ვთქვათ 46,5 წმ-სათვის რეალური ქვედა საზღვარი იქნება შუალედი 46 წამსა (სკალაზე წინა მომდევნო გაზომვად მნიშვნელობასა) და 47 წმ-ს შორის. ასევე 47,5 წამისათვის რეალური ზედა საზღვარი იქნება შუალედი 47 წმ-სა და (სკალაზე მომდევნო გაზომვად მნიშვნელობას შორის).

გაზომვის სიზუსტის შეცვლა გამოიწვევს გაზომვის რეალური საზღვრების შეცვლას იგივე გაზომვით დაფიქსირებული 47,00 წამისათვის. დავუშვათ, გაზომვა *ელექტრონული წამზომით* ხდებოდა, რომელსაც გაზომვა


შეუძლია $0,01 = \frac{1}{100}$ წმ-ის სიზუსტით. რეალური ქვედა საზღვარი იქნება 46,995წმ (ამ სკალაზე გაზომვის მომდევნო (წინა) რიცხვია 46,99), რეალური ზედა საზღვარი იქნება 47,015წმ (გაზომვის ამ სკალაზე მომდევნო გაზომვადი მნიშვნელობაა 47,01).

ამ წესით დაფიქსირებული 57,21 წამისათვის რეალური ქვედა და ზედა საზღვარი იქნება შესაბამისად რიცხვები: 57,205წმ (შუაწერტილი 57,20წმ-სა და 57,21წმ-ს შორის, სკალის ერთული 0,01წმ-ია).

ამრიგად, ნებისმიერ სკალაზე უწყვეტი ცვლადის ყოველ რიცხვით მნიშვნელობას აქვს გაზომვის რეალური ქვედა და ზედა საზღვრები. მაგალითად, თუ 9 ქულიან სკალაზე იზომება რაიმე სტიმული და გაზომვის შედეგები კატეგორიულად გამოიყოფა მთელი რიცხვებით, გაზომვის შედეგად დაფიქსირდა რიცხვი 3, მაშინ ადვილი მისახვედრია, რომ ზემოაღნიშნული წესით რეალური ქვედა და რეალური ზედა საზღვარი შესაბამისად ტოლია 2,5 და 3,5-ის.

* სტატისტიკური დაკვირვების (ექსპერიმენტის) სწორად დაგეგმვის, გამოთვლების გამარტივებისა და კომპეტენტურობის მიზნით, რიცხვითი მნიშვნელობებისა და საბოლოო პასუხების დამრგვალების სიზუსტის დადგენას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მკვლევარის მიერ რიცხვის დამრგვალებასთან დაკავშირებით მოსაზრებების დაფიქსირება კვლევის პროცესში წინასწარ გარკვევით ხდება და ემორჩილება გარკვეულ წესებს.

განვიხილოთ მაგალითი: ვთქვათ, ინტერვალების 9 ქულიანი სკალის საკვლევი დებულებაა: „თქვენ ღიზიანდებით, როდესაც გვერდით მყოფი ადამიანები მობილური ტელეფონით საუბრობენ.“



სკალის დებულება შესაძლებელია ერთ-ერთი იყოს ჩვენ მიერ ადამიანის ქცევაზე გამდიზიანებლის ზემოქმედების შესწავლის პროცესში. ვთქვათ, ექსპერიმენტში მონაწილეობდა სამი ცდის პირი. თითოეულ მათგანს და-

ევალა სკალაზე პირადი შეხედულების მიხედვით მოენიშნა ცვლადის მნიშვნელობის აღმნიშვნელი ერთი მთელი რიცხვი, რომლითაც რესპოდენტი შეაფასებდა საკვლევი დებულებით განსაზღვრული ცვლადის (გაღიზიანების) სიდიდეს.

რესპოდენტებმა შესაბამისად სკალაზე მონიშნეს ცვლადის მთელი რიცხვითი მნიშვნელობები: 4, 5 და 5. თითოეული მათგანისათვის შეიძლება შეფასდეს გაზომვის რეალური ქვედა და რეალური ზედა საზღვარი: 4-ისათვის იგი შეადგენს შესაბამისად 3,5 და 4,5-ს, ხოლო 5-ისათვის 4,5 და 5,5-ს. ბუნებრივია, ცვლადის სიდიდის გაზომვის უკეთ შეფასებისათვის უნდა ვიპოვოთ მიღებული სამი განაზომის 4, 5 და 5-ის არითმეტიკული საშუალო ცნობილი წესით, რომელსაც უფრო საფუძვლიანად სახელმძღვანელოს შემდეგ პარაგრაფებში განვიხილავთ:

$$\frac{4+5+5}{3} = \frac{14}{3} = 4,666\dots$$

მიღებული პასუხი უსასრულო

პერიოდული ათწილადია. საბოლოო პასუხის მისაღებად საჭიროა ამ რიცხვის დამრგვალება არსებული მისი მთელი ნაწილიდან, რომელიც ცვლადის გაზომვის ერთეული მთელი რიცხვითი მნიშვნელობაა. ცნობილი წესების დაცვით დამრგვალება შეიძლება მოხდეს ა) მძიმის შემდეგ ერთ მეათედამდე სიზუსტით, მაშინ მიიღება შედეგი 4,7; ანდა ბ) მძიმის შემდეგ ერთ მეასედამდე სიზუსტით. მიიღება 4,67. საბოლოო პასუხში, ან მიმდინარე რიცხვითი მნიშვნელობის დამრგვალებისას სიზუსტეზე შეთანხმება მკვლევარის მიერ წინასწარ ხდება.

გამოთვლების წარმოებისას გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წესი: სტატისტიკური გამოთვლების წარმოებისას, კერძოდ, თუ საბოლოო პასუხის მიღებამდე დარჩენილია რამოდენიმე ეტაპი და შესასრულებელია შუალედური მნიშვნელობის დამრგვალების პროცესი, მაშინ საბოლოო პასუხში შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით, შუალედური მნიშვნელობის დამრგვალება უნდა მოხდეს ორ ან მეტ დაბალ თანრიგამდე, ვიდრე ეს პროცესი გათვალისწინებულია საბოლოო პასუხში. ე.ი. რიცხვი 4,6666... შუალედურად შეიძლება დამრგვალდეს მძიმედან ერთ მეათითასედ თანრიგამდე, მაშინ მიიღება 4,6667. ეს მაშინ მოხდება, თუ პასუხში

გათვალისწინებულია დამრგვალება მძიმედან ერთ მეასედ თანრიგამდე.

§4. დაკვირვება (ცდა, ექსპერიმენტი). ხდომილობა. რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები


შემთხვევითი დაკვირვება, შემთხვევითი ცდა, შემთხვევითი ექსპერიმენტი სინონიმებია. შემდგომში ვიტყვით: **დაკვირვება (ცდა, ექსპერიმენტი)** წარმოადგენს გარკვეული პირობების კომპლექსის შესრულებას, გულისხმობს დაკვირვებულ სუბიექტს, დაკვირვების ობიექტს, დაკვირვების პირობებსა და დაკვირვების პოტენციურ ან რეალურ შედეგს. დაკვირვება შეიძლება ჩატარდეს რეალურად – უშუალოდ პრაქტიკულად, ან აზრობრივად – თეორიულად.

თუ დაკვირვების პირობების კომპლექსი ვერ იძლევა საშუალებას წინასწარ ცალსახად ზუსტად განისაზღვროს დაკვირვების შედეგი, მაშინ დაკვირვებას **შემთხვევითი დაკვირვება (შემთხვევითი ცდა, შემთხვევითი ექსპერიმენტი)** ეწოდება.

დაკვირვების პოტენციურ შედეგს **ხდომილობას** ვუწოდებთ. ხდომილობა გონებრივად გააზრებული დაკვირვების პირობათა კომპლექსის პოტენციური შედეგია. ხდომილობებს აღვნიშნავთ სიმბოლოებით $\Omega, \emptyset, \omega, A, B, C, \omega_1, \omega_2, A_1, A_2, A_3, \dots$

ხდომილობა აღბათობათა თეორიის ერთ-ერთი ძირითადი ცნებაა და ხდომილობის ცნების ქვეშ გაიგება ყველაფერი ის, რის შესახებაც აზრი აქვს ითქვას, რომ დაკვირვების შედეგად იგი ხდება ან არ ხდება (მოხდება ან არ მოხდება).

რეალურად ჩატარებული დაკვირვების კონკრეტულ შედეგს მონაცემს ვუწოდებთ. მონაცემი დაკვირვების პირობათა კომპლექსის (ღპბ) პრაქტიკული რეალიზაციის შედეგია. გავეცნოთ შემდეგ სქემას (ნახ. 2):



ნახ.2

განვიხილოთ უმარტივესი მაგალითები.

მაგალითი 1.1. (გთხოვთ, ამ მაგალითის პირობა მთელი სერიოზულობით პრაქტიკულად განახორციელოთ). აიღეთ ხელში ნებისმიერი დირექტორების მონეტა, დააგდეთ გლუვ ბრტყელ ზედაპირზე (მაგიდაზე, იატაკზე) და დაკვირვების შედეგი ჩანიშნეთ ცხრილ 1-ის იმ სვეტის მეორე სტრიქონში, რომლის პირველ სტრიქონში მინიშნებულია დაკვირვების რიგითი №1

ცხრილი 1

დაკვირვების რიგითი №	1									...	
დაკვირვების შედეგი. მონაცემი										...	

მითითება: თუ მონეტა დავარდა ბორჯღალით (გერბით) ზემოთ, ჩაინიშნეთ „ბორჯღალი“, მოკლედ - ბ, ან დაწერეთ 1-იანი, ვამბობთ - „მონეტაზე მოვიდა ბორჯღალი“. ხოლო თუ მონეტა დაეცა საფასურით ზემოთ, ჩაინიშნეთ „საფასური“, მოკლედ - ს, ან ჩაწერეთ 0. ვამბობთ - „მონეტაზე მოვიდა საფასური“. თითოეულ შემთხვევაში თქვენ მოიპოვეთ **თვისობრივი** მონაცემი. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც „ბორჯღალის“ მოსვლას აღნიშნავთ 1-ით, „საფასურისას“ კი - 0-ით, მაინც თვისობრივ მონაცემთან გაქვთ საქმე, რადგან თქვენ მხოლოდ სიმბოლურად დააფიქსირეთ 1-ით თვისობრივი მონაცემი - „ბორჯღალის“ მოსვლა, ან 0-ით - თვისობრივი მონაცემი - „საფასურის“ მოსვლა. გაიმეორეთ ცდა (დაკვირვება, ექსპერიმენტი) მეორედ, მესამედ და ა.შ., რამდენჯერაც გსურთ. ცხრილის პირველ სტრიქონში ჩაწერეთ დაკვირვების რიგითი ნომერი, მეორეში კი - ამ დაკვირვების შესაბამისად მოპოვებული მონაცემი. მიღებულ მონაცემებს „**ნედლ**“ მონაცემებს ვუწოდებთ. ამრიგად, თქვენ შეავსეთ და მიიღეთ ნედლი თვისობრივი მონაცემების ცხრილი.

შევნიშნოთ, რომ, როგორც ვიცით, მონეტას ორი მხარე აქვს. ერთ მხარეზე მონიშნულია მონეტის მესაკუთრე (მომჭრელი, გამომშვები) ქვეყნის სიმბოლიკა - „ბორჯღალი“ ქართულ მონეტაზე, სხვა შემთხვევებში კი „ღერბი“ (იგივე „გერბი“), მეორეზე კი მინიშნებულია მონეტის ღირებულება - „საფასური“. ამასთან, მონეტა იმდენად თხელია, რომ გამორიცხებულია წიბოზე გაჩერდეს, ან იგოროს დაუსრულებლად.

ხარისხობრივ (თვისობრივ) მონაცემი მიიღება შესასწავლი ობიექტის ხარისხობრივ-თვისობრივ მახასიათებლებზე დაკვირვებით. იგი ობიექტს ან აქვს ან არ აქვს. ობიექტის თვისობრივი მახასიათებელი არ ემორჩილება გაზომვას. ასეთი მახასიათებლებია: ადამიანთა ინდივიდებისათვის - პროფესია, ოჯახური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, რელიგიური მრწამსი, იდეოლოგიური შეხედულება, ფსიქოლოგიური განწყობა, სხვა შემთხვევებში - პროდუქციის ხარისხი, ფერი, გემო და ა.შ.

თვისობრივი, ხარისხობრივი მახასიათებელი შეიძლება იყოს **ალტერნატიული** - ორმნიშვნელობიანი, ან **მრავალმნიშვნელობიანი**.

ალტერნატიული მახასიათებლებია: ქალი და კაცი, ძლიერი და სუსტი (არაძლიერი), დაოჯახებული და დაუოჯახებელი, სპორტსმენი და არასპორტსმენი, დაავადებული და არადაავადებული, უმაღლესდამთავრებული და უმაღლესდაუმთავრებელი, ხარისხიანი და უხარისხო და ა.შ.

მრავალმნიშვნელობიანი მახასიათებლებია: გარკვეული აზრით ხარისხი - I ხარისხი, II ხარისხი, III ხარისხი, სისხლის ჯგუფი - I, II, III, IV, რეზუს უარყოფითი. ინფექციური დაავადებები: წითელა, ყივანახველა, შავი ჭირი, ქოლერა, ეროვნება - ქართველი, გერმანელი, ბერძენი, ესპანელი, რუსი, თურქი და ა.შ.

რაოდენობრივი მონაცემი მიიღება შესასწავლი ობიექტის რაოდენობრივ მახასიათებელზე (ნიშან-თვისებაზე) დაკვირვების შედეგად. **თვისობრივი მახასიათებლისაგან განსხვავებით** ობიექტის რაოდენობრივი მახასიათებელი შეიძლება გაიზომოს ტრადიციული გაგებით. ასეთია მაგალითად: სიჩქარე, მანძილი, სიმაღლე, შრომის ნაყოფიერება, სიმკვრივე, მასა, საკრედიტო თანხის რაოდენობა, მოგება, ხელფასი, სიტბოს რაოდენობა, მუშაობა, სიმძლავრე, ინტენსივობა და ა.შ.

რაოდენობრივი მახასიათებელი (ცვლადი) დისკრეტულია, თუ იგი უკავშირდება დათვლის პროცესს (ახალშობილთა რაოდენობა და სხვა), ხოლო **უწყვეტია**, თუ იგი უკავშირდება გაზომვის პროცესს (ტემპერატურა, ცლომილება გაზომვებში და სხვა).

მაგალითი 1.2. რაოდენობრივი მონაცემების მიღების საილუსტრაციოდ, განხილულ მაგალით 1.1-ის პირობაში მონეტა შეცვალეთ ნარდის სათამაშო კამათელით, ანუ კუბით, რომლის თითოეულ წახნაგზე ამოტვიფრულია შესაბამისად 1, 2, 3, 4, 5, 6 – რიცხვები და დაკვირვების რიგითი ნომრის მიხედვით მიღებული რიცხვითი მონაცემები (ან 1, ან 2, ..., ან 6) შეიტანეთ ცხრილ 1-ის მეორე სტრიქონში. მაგალითი 1.1-ის ანალოგიურად, დაკვირვების რიგითი ნომრები ჩაწერეთ პირველ სტრიქონში. მიიღებთ რაოდენობრივი ნედლი მონაცემების ცხრილს.

დავალება: ორივე განხილულ შემთხვევაში, კერძოდ, მონეტის აგდებისას და კამათელის გაგორებისას მიმოიხილეთ დაკვირვების პირობების კომპლექსი.

მითითება: პირველ მაგალითში დაკვირვების პირობათა კომპლექსის მიხედვით მაგიდაზე, ან იატაკზე რეალურად ერთჯერ ვაგდებთ ერთ მონეტას, მონეტა წარმოადგენს ლითონის ფულს, რომლის ერთ მხარეზე მისი ღირებულებაა მინიშნებული (საფასური), მეორეზე კი მფლობელი ქვეყნის ღერბია (ბორჯღაღლი). ამასთან იგულისხმება მონეტა იმდენად თხელია, რომ შეუძლებელია დადგეს წიბოზე ან დაუსრულებლად იგოროს.

მეორე შემთხვევაში დაკვირვების პირობების კომპლექსის დახასიათება მკითხველისთვის მიგვიჩვენია.

ახლა კი განვიხილოთ დაკვირვების აზრობრივად, თეორიულად ჩატარების საილუსტრაციო შემდეგი მაგალითი:

მაგალითი 13. რომ დავაგდოთ გლუვ ბრტყელ ზედაპირზე მონეტა, რა მოვლენებთან გვექნება საქმე?

სახელმძღვანელოებში ტექსტობრივად ამ ამოცანას წერენ ასე: ვაგდებთ მონეტას გლუვ ბრტყელ ზედაპირზე, რა მოვლენებთან გვექნება საქმე (ე.ი. აქ იგულისხმება კონტექსტი: რომ დავაგდოთ..., თუ დავაგდებთ...)?

პირობათა კომპლექსის შესაბამისად, შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ მოსალოდნელი, პოტენციური შედეგები, რომლებსაც **ხდომილობებს** ვუწოდებთ. ასეთებია: {მონეტაზე მოვა ბორჯღაღლი}={ბ}, {მონეტაზე მოვა საფასური}={ს}. შეიძლება განვიხილოთ სხვა ხდომილობებიც: {მონეტაზე არც ბორჯღაღლი მოვა, არც საფასური}={მონეტაზე არ მოვა ბორჯღაღლი და არც საფასური მოვა} - ეს ხდომილობა **შეუძლებელი ხდომილობაა**, რადგან იგი არ მოხდება არასოდეს, რამდენჯერაც უნდა ავაგდოთ მონეტა აზრობრივად თუ პრაქტიკულად. შეუძლებელ ხდომილობას აღვნიშნავთ \emptyset - სიმბოლოთი.

{მონეტაზე მოვა ან ბორჯღაღლი, ან საფასური}={ბ; ს} - ეს ხდომილობა **აუცილებელი ხდომილობაა**, რადგან იგი დაკვირვების შედეგად ყოველთვის აუცილებლად მოხდება თეორიული მოსაზრებებიდან გამომდინარე და პრაქტიკულადაც. აუცილებელ ხდომილობას აღვნიშნავთ Ω სიმბოლოთი.

ხდომილობას, რომელიც დაკვირვების შედეგად შეიძლება მოხდეს ან არ მოხდეს, შემთხვევითი ხდომილობა

ეწოდება. შემთხვევითი ხდომილობები აღინიშნება $\omega, A, B, C, \omega_1 \dots$ სიმბოლოებით.

**§5. დინამიკური და სტატისტიკური
კანონზომიერებები.
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური
სტატისტიკის საბანი**

რეალური სამყაროს რაოდენობრივი კანონზომიერებები, რომელთაც შეისწავლის მათემატიკა, ძირითადად ორი სახისაა: დინამიკური (დეტერმინირებული) და სტატისტიკური (სტოქასტიკური, ალბათური). შესაბამისად, მოვლენებიც ორი სახისაა დინამიკური (დეტერმინირებული) და შემთხვევითი (სტოქასტიკური).

დინამიკური კანონზომიერებები საშუალებას იძლევიან წინასწარ დეტერმინისტულად, ზუსტად ცალსახად განვსაზღვროთ შესასწავლ მოვლენაზე დაკვირვების შედეგი. ასეთი მოვლენები დინამიკური მოვლენებია. ეს მოვლენები უფრო იდეალიზებული მოვლენებია. სამყაროს ადექვატური შეცნობის შესაძლებლობას ძირითადად სტატისტიკური კანონზომიერებები იძლევიან.

მოვლენა შემთხვევითია, თუ წინასწარ ზუსტად, ცალსახად შეუძლებელია გამოვიცნოთ მასზე დაკვირვების საბოლოო შედეგი. თუმცა *მასობრივი ერთგვაროვანი შემთხვევითი მოვლენები ემორჩილებიან სტატისტიკურ კანონზომიერებებს. ეს კანონზომიერებები ძირითადად რაოდენობრივი სახისაა და შემთხვევითი მოვლენების ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური მდგრადობის თვისებით ჩამოყალიბდებიან.*

სტატისტიკური კანონზომიერებები ერთგვაროვანი მასობრივი შემთხვევითი მოვლენების პროგნოზირების (მათზე წინასწარი ვარაუდების გამოთქმის) საშუალებას იძლევა, რაც შემთხვევითობასთან დაკავშირებით გაურკვეველობის პირობებში გადაწყვეტილებების მიღებაში და მოქმედების ოპტიმალური სტრატეგიების არჩევაში გვეხმარება.

დინამიკური მოვლენების საილუსტრაციოდ განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი:

მაგალითი 1.4. ვთქვათ მატერიალურ წერტილზე მოქმედებს სიმძიმის ძალა. რომელიღაც მომენტში ცნობილია წერტილის მდებარეობა და სიჩქარე, მაშინ მისი შემდგომი მოძრაობა ცალსახად აღიწერება შესაბამისი დიფერენციალური განტოლებით (გაიხსენეთ აღნიშნული საკითხი ფიზიკიდან).

აღნიშნული დინამიკური მათემატიკური (მექანიკური) მოდელი დამაკმაყოფილებლად ყოველთვის ვერ ასახავს რეალურ ფიზიკურ მოვლენას, რადგან რეალურად სხვადასხვა კონკრეტულ პირობებში მატერიალური წერტილის მოძრაობაზე შეიძლება მოქმედებდეს დამატებით კიდევ სხვა შემთხვევითი ფაქტორები.

განვიხილოთ სტოქასტური მოვლენების საილუსტრაციო მაგალითი:

მაგალითი 1.5. განვიხილოთ გასროლილი ტყვიის მოძრაობა. არ შეიძლება ცალსახად, ზუსტად წინასწარ განისაზღვროს მისი ტრაექტორია. სხვადასხვა გასროლათა სერიებში ტყვიის საწყისი სიჩქარე შეიძლება სხვადასხვა იყოს, რადგან იგი დამოკიდებული იქნება მრავალ მიზეზზე (მრავალ შემთხვევით ფაქტორზე): დენტის ხარისხზე და რაოდენობაზე, გასროლის კუთხეზე, იარაღის სახეობაზე, ქარის მიმართულებასა და სიჩქარეზე და ა.შ., რაც გამოიწვევს შედეგთა სხვადასხვაობას. კერძოდ ტყვიის ტრაექტორიების განსხვავებულობას.

განვიხილოთ ფარდობით სიხშირეთა საილუსტრაციო შემდეგი მაგალითები:

მაგალითი 1.6. გიორგიმ მონეტა 10-ჯერ დააგდო სიბრტყეზე, ყოველი დაგდების შემდეგ რიგის მიხედვით ჩაინიშნა დაკვირვების შედეგი და მიღებული მონაცემები წარმოადგინა ცხრილის სახით:

ცხრილი 2.

დაკვირვების რიგითი №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
დაკვირვების შედეგი. მონაცემი	ბ	ს	ბ	ბ	ს	ს	ბ	ს	ბ	ბ

შენიშვნა: თუ საწინააღმდეგო აზრი არაა დაფიქსირებული, მაშინ ყოველთვის ვიგულისხმებთ, რომ მონეტა „წესიერია“, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი სიმეტრიულია და ერთგვაროვანი მასალისაგანაა დამზადებული.

დაკვირვებათა რაოდენობა 10-ის ტოლია. შესაბამისად მონაცემთა რაოდენობაც 10-ია. „ბორჯღაღის“ მოსვლის სიხშირე ტოლია 6-ის, ხოლო - ფარდობითი სიხშირე 6/10-ის. „საფასურის“ მოსვლის სიხშირე ტოლია 4-ის, ხოლო ფარდობითი სიხშირე 4/10-ის. ამასთან, $6+4=10$ და $0.6+0.4=1$

შენიშვნა: თუ k არის n -ჯერ ჩატარებულ ცდაში რაიმე A ხდომილობის მოხდენათა რაოდენობა, მაშინ რიცხვი: $\frac{k}{n} = P_n^*(A)$ არის n ცდაში A ხდომილობის ფარდობითი სიხშირე, რომელიც შეიძლება ჩავწეროთ პროცენტულადაც.

დავუბრუნდეთ მაგალითს.

მასში განხილული ცდები **ორშედეგიანია** – ცალკეული ცდის (დაკვირვების) ჩატარებამდე თეორიულად მოსალოდნელია ორი პოტენციური შედეგი (ხდომილობა) $\{b\} = \{\text{მოვა ბორჯღაღის}\}$ ან $\{s\} = \{\text{მოვა საფასურის}\}$, მაგრამ კონკრეტულად რომელი ხდომილობის მოხდენა დაფიქსირდება, ამის ზუსტად, ცალსახად განსაზღვრა შეუძლებელია. აღნიშნული ხდომილობები შემთხვევითი ხდომილობებია.

გავერკვეთ ფარდობითი სიხშირის სტატისტიკური მდგრადობის თვისებაში. ამ კანონზომიერების ჭეშმარიტების საილუსტრაციოდ შეიძლება მოვიყვანოთ უამრავი პრაქტიკული მაგალითი, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც შემჩნეული და შესწავლილია თეორიის განვითარების ადრე ისტორიულ ეტაპზე.

მაგალითი 1.7. ცხრილი 3-ით მოცემულია სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მეცნიერ-დამკვირვებლის მიერ სიმეტრიული მონეტის n -ჯერ აგდების მიხედვით ჩატარებული ცდების სერიებში $\{\text{საფასურის}\}$ მოსვლათა სიხშირეზე დაკვირვების შედეგები (იხ. [12], გვ. 163).

ცხრილი 3.


ცდის პირი	მონეტის აგ- დებათა რიცხვი n	საფასურის მოსვლათა სიხშირე	საფასურის მოს- ვლის ფარდობითი სიხშირე $\frac{K}{n}$	%
ჟ. ბიუფონი (1707-1788) ფრანგი მკვლევარი	4040	2048	0,5080	50,6%
კ. პირსონი (1857-1936) ინგლისელი მათე- მატიკოსი	12000	6019	0,5016	50,16%
კ. პირსონი	24000	12012	0,5005	50,05%

ცხრილიდან ჩანს, რომ დაკვირვებათა სხვადასხვა სერებში „საფასურის“ ფარდობითი სიხშირეები მცირედ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და 0,5-ის ტოლი მუდმივი რიცხვისაგან. განსხვავება მით უფრო მცირეა, რაც უფრო დიდია დაკვირვებათა რიცხვი. ესაა ფარდობითი სიხშირეების სტატისტიკური მდგრადობის კანონზომიერება.

იგივე კანონზომიერება ფიქსირდება ცდათა სერებში {ბორჯღალი}-ს ({გერბი}-ს) ფარდობითი სიხშირეებისათვის.

ანალოგიური ფაქტი მოგვიანებით დაადასტურა ელექტრონულ გამომთვლელ მანქანაზე რიცხვების 1-ისა და 0-ის შემთხვევითი გათამაშების შედეგებმაც. რიცხვი 1 შეესაბამება მონეტაზე {საფასური}-ის მოსვლას, 0 კი {ბორჯღალი}-ის მოსვლას. კომპიუტერის (ე.გ.მ.) გამოყენება საშუალებას იძლევა თანმიმდევრულად გაიზარდოს როგორც დაკვირვებათა სერიების რაოდენობა, ასევე სერებში დაკვირვებათა რაოდენობებიც.

„საფასურის“ მოსვლის აღმნიშვნელი ხდომილობის ფარდობითი სიხშირეების სტატისტიკური მდგრადობის ტენდენცია ნათლად ჩანს ჩატარებული კვლევების შედეგების შესაბამისად აგებულ ნახ. 3-ზე (იხ. [12], გვ. 11).



ნახ. 3

აბცისათა ღერძზე აღებულია ლოგარითმული მასშტაბი (**lgn**), რაც ასე უნდა გავიგოთ: თუ მაგალითად, ჩატარდა $n=10$ ცდა, მაშინ აბცისათა ღერძზე გადავზომავთ $\lg 10=1$ -ს და არა 10 -ს. რიცხვი 10 გადაიზომება, თუ ჩატარებულია $n=10^{10}$ დაკვირვება (ცდა), რადგან $\lg 10^{10}=10$ და ა.შ.

ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური მდგრადობის კანონზომიერების საილუსტრაციოდ, განვიხილავთ კიდევ ერთ მაგალითს დემოგრაფიული მეცნიერების სფეროდან. მსოფლიოს მრავალ რეგიონში სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შობადობის საკითხის შესწავლისათვის ჩატარებულმა დემოგრაფიულმა კვლევებმა დაადასტურა შემდეგი სტატისტიკური კანონზომიერება, რომ დაკვირვებათა დიდი რიცხვის პირობებში ახალშობილთა საერთო რაოდენობიდან საშუალოდ 48-49% ქალია, ხოლო 51-52% ვაჟია.

აღნიშნულს ადასტურებს შემდეგი ცნობილი:

მაგალითი 1.8. ცხრილი 4-ით მოცემულია შვეციაში 1935 წელს დაბადებული ბავშვების სქესის მიხედვით სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა განაწილება (მონაცემები აღებულია შვეციის ოფიციალური სტატისტიკიდან, იხ. [12], გვ. 184; [19], გვ. 43).


ცხრილი 4

თვეები	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	სულ წელში
ახალშობილთა რიცხვი	7280	6957	7883	7884	7892	7609	7585	7393	7203	6903	6552	7132	88273
ბიჭები	3743	3550	4017	4173	4117	3944	3964	3797	3712	3512	3392	3761	45682
გოგონები	3537	3407	3866	3711	3775	3665	3621	3596	3491	3391	3160	3371	42591
გოგონების ფარდობითი სიხშირე	0,486	0,489	0,490	0,471	0,478	0,482	0,462	0,484	0,485	0,491	0,482	0,473	0,4825

გოგონათა ფარდობითი სიხშირეები ფლუქტუაციას განიცდიან (მერყეობენ) $\frac{42591}{88,273} = 0,482$ რიცხვის მახლობლობაში, რაც პროცენტულად შეადგენს საერთო ახალშობილთა 48,2%-ს.

დავალება: იპოვეთ ბიჭების დაბადებათა შესაბამისი ფარდობითი სიხშირეები, ფორმულით - k/n (n დაკვირვებათა რიცხვია, k - ბიჭების სიხშირე).

ნახ. 4-ზე ნაჩვენებია ახალშობილ გოგონათა თვეების მიხედვით ნაპოვნი ფარდობითი სიხშირეების გადახრები წლიური მაჩვენებლისაგან.



ნახ. 4

აბცისათა ღერძზე მონიშნული უნდა იყოს გოგონათა რაოდენობა, ხოლო ორდინატთა ღერძზე – შესაბამისი ფარდობითი სიხშირეები.

დავალება: ანალოგიური დიაგრამა ააგეთ ახალშობილი ბიჭების ფარდობითი სიხშირეებისათვის.

აღბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა მათემატიკის უმნიშვნელოვანესი დარგია. იგი შეისწავლის შემთხვევით მოვლენებთან დაკავშირებულ მათემატიკურ მოდულებსა და მასობრივ შემთხვევით მოვლენათა რაოდენობრივ კანონზომიერებებს.

მასობრივი ერთგვაროვანი შემთხვევითი მოვლენების ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური მდგრადობის თვისება იძლევა ამ შემთხვევით მოვლენათა პროგნოზირების საშუალებას, რაც გაურკვეველობის პირობებში გადაწყვეტილებების მიღებისა და მოქმედების ოპტიმალური სტრატეგიების არჩევაში გვეხმარება.

რამდენიმე შენიშვნა:

1) ერთგვაროვან შემთხვევით ხდომილობათა ფარდობითი სიხშირეების სტატისტიკური მდგრადობის თვისების თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ე.წ. „დიდი რიცხვთა კანონი“. ეს კანონი აღბათობათა თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ერთ-ერთი ძირითადი დებულებაა. მას მოგვიანებით შევისწავლით.

2) დაკვირვებათა n რიცხვის გაზრდის პირობებში რომელიმე ფიქსირებულ სერიაში გამორიცხული არაა სტატისტიკური კანონზომიერების ერთჯერადი დარღვევა თუნდაც რომელიმე დიდი n რიცხვისთვის.

3) თუ დაკვირვება ისეთია, რომ ფიქსირდება მხოლოდ ორი შედეგიდან ერთ-ერთი ა) განსახილველი ხდომილობა „ხდება“, ან ბ) „არ ხდება“, მაშინ მათ ორშედეგიან დაკვირვებებს ვუწოდებთ.

სიბრტყეზე მონეტის დაგდება ორშედეგიანი დაკვირვების მაგალითია.

რაიმე A ხდომილობის არ მოხდენას, მისი საწინააღმდეგო ხდომილობა ეწოდება, და აღინიშნება \bar{A} სიმბოლოთი.

§6. ბამოყენების სფეროები და მოკლე ისტორიული ექსკურსი

- აღბათობის თეორიასა და მათემატიკურ სტატისტიკას კვლევისა და გამოყენების მრავალმხრივი მიმართულება აქვს.

შემთხვევითი მოვლენის უამრავი მაგალითის განხილვა შეიძლება მეცნიერებისა და ტექნიკის ყველა დარგიდან. მაგალითად, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში, დემოგრაფიაში, ეკონომიკასა და ბიზნესში, სადაზღვევო, საბანკო საქმეში, მართვის თეორიაში, მასობრივ წარმოებაში, ფსიქოლოგიაში, ეკოლოგიაში, მედიცინაში, სოციალურ მეცნიერებებში, საინჟინრო-ტექნიკურ მეცნიერებებში და სხვა.

მათემატიკური, ალბათურ-სტატისტიკური კვლევების, მეთოდებისა და გამოყენების სფეროების შესაბამისად ჩამოყალიბდა განსხვავებული მიმართულებები, როგორცაა ეკონომეტრიკა, სტატისტიკური ფიზიკა, ეკონომიკური სტატისტიკა, ბიომეტრია, ბიო-სამედიცინო სტატისტიკა, სპორტული სტატისტიკა, ბიზნესის სტატისტიკა, სადაზღვევო სტატისტიკა, სოციალური სტატისტიკა და სხვა დარგების სტატისტიკა.

• ძველი ჩინეთის, ბაბილონის, ეგვიპტის, საბერძნეთის არქეოლოგიური მასალების შესწავლის საფუძველზე დადგენილია, რომ ისტორიულად სტატისტიკური მეცნიერების განვითარება სათავეს იღებს უძველეს დროში და ვითარდებოდა სახელმწიფოთა წარმოშობა-განვითარებასთან ერთად. სახელმწიფოს სჭირდებოდა დაცვისა და შენახვის ხარჯები. სპეციალურად შერჩეული აღმრიცხველები აწარმოებდნენ მოსავლიანობის, მოსახლეობის დემოგრაფიულ და სხვადასხვა სახის აღწერებს, რამაც სათავე დაუდო პირველი მონაცემების შეგროვებასა და ამ მონაცემების ანალიზის აუცილებლობას. თავიდან მოპოვებული მონაცემების დამუშავება მარტივი მეთოდებით ხდებოდა. შეგროვილ სტატისტიკურ მონაცემთა დამუშავების თეორიული საფუძვლების შექმნას დასაბამი მისცეს XVII საუკუნის ინგლისელმა მეცნიერებმა ვ. პეტიმ, ჯონ გრანტმა და შემდგომში განვითარება ჰპოვა ვ. კენეს შრომებში. მათ მასობრივი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის საფუძველზე შეისწავლეს და დაადგინეს ამ მოვლენების განვითარების სტატისტიკური კანონზომიერებები. შემდგომში საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ განვითარებასთან ერთად მონაცემთა შეგროვების, ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის მეთოდები თანდათან იხვეწებოდა და მიაღწია განვითარების თანამედროვე დონეს.

- სახელდობრ, ალბათობის თეორია სათავეს იღებს XVII საუკუნის საფრანგეთში აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული შემთხვევითობის კვლევებში პასკალის (1623-1662), ფერმის (1601-1665) და ჰიუგენსის (1629-1695) შრომების წყალობით. განვითარების თანამედროვე დონეს ალბათობის თეორიამ მიაღწია აკადემიკოს ა.ნ. კოლმოგოროვის (1903-1987) შრომებში ჩამოყალიბებულ აქსიომებზე დაყრდნობით XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან.

- საქართველოში ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებას საფუძველი ჩაუყარა ანდრია რაზმაძემ (1889-1929) ახლად დაარსებულ თბილისის უნივერსიტეტში. პროფესორმა გვანჯი მანიამ (1918-1985) საფუძველი დაუდო მათემატიკის ამ დარგის განვითარებას საქართველოში, ხოლო რევაზ ჩიტაშვილმა (1942-1995) კიდევ უფრო განავითარა კვლევები აღნიშნულ დარგში როგორც თეორიული, ისე გამოყენებითი მიმართულებით, მან ჩაუყარა საფუძველი საქართველოში სტოქასტური ფინანსური ანალიზის განვითარებას.

თავი II. აღწერიითი სტატისტიკა (Descriptive statistics)

§1. სტატისტიკური მონაცემები, პოპულაცია და შერჩევა

1. მონაცემები (**Data** - მრავლობითი, datum - მხოლობითი), სტატისტიკური მონაცემები ერთგვაროვან ობიექტთა რაიმე სიმრავლის რაოდენობრივ ან თვისებრივ მახასიათებელთა დაკვირვებული მნიშვნელობების ერთობლიობაა.

სტატისტიკური მონაცემები ჩატარებული ცდების (დაკვირვებების, ექსპერიმენტების) შედეგთა ერთობლიობაა.

სტატისტიკა (Statistics) წარმოადგენს მეცნიერების დარგს, რომელიც იკვლევს მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის მეთოდებს.

აღნიშნული კვლევები ხორციელდება საზოგადოებრივი მეცნიერებების სხვადასხვა ამოცანის გადასაწყვეტად რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით. მიღებული რეკომენდაციები წარმოადგენს ქმედების ოპტიმალური სტრატეგიების არჩევის საფუძველს ადამიანთა მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროში, შემთხვევით მოვლენებთან და პროცესებთან დაკავშირებით.

მონაცემთა მოპოვების, დალაგების, დაჯგუფების, სხვადასხვა ხერხებით წარმოდგენის მეთოდოლოგია შეადგენს აღწერიითი ანუ **დესკრიფციული სტატისტიკის (Descriptive statistics)** საგანს.

აღწერიითი სტატისტიკის მიზანს წარმოადგენს იმ მეთოდების დამუშავება, რომლებიც ემსახურებიან მონაცემების შეგროვებას, მოხერხებული ფორმით წარმოდგენას და სხვადასხვა რიცხვითი მახასიათებლებით აღწერას.

პოპულაცია (Population), ან სტატისტიკური პოპულაცია ეწოდება შესასწავლი ობიექტების კონკრეტული რაოდენობრივი ან ხარისხობრივ-თვისებრივი მახასიათებლების ყველა შესაძლო მნიშვნელობების ერთობლი-

ობას. პოპულაციის ელემენტთა რაოდენობას პოპულაციის მოცულობა (Population Size) ეწოდება.

პოპულაცია და გენერალური ერთობლიობა სინონიმებია.

პოპულაციის ელემენტარულ ერთეულებს (ობიექტებს, ინდივიდებს), რომელთაც ახასიათებს ერთი საერთო ნიშან-თვისება (მახასიათებელი) პოპულაციის ბაზისს (Frame) უწოდებენ. საერთო ნიშან-თვისება წარმოადგენს მონაცემების მიღების ძირითად კრიტერიუმს.

სტატისტიკური მონაცემები (დაკვირვებული მნიშვნელობები) საკვლევი ნიშან-თვისების მიხედვით უნდა იყოს ერთგვაროვანი, რაც შერჩევის საფუძველსაც შეადგენს.

განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები უნდა განვაცალკევოთ და დავყოთ კლასებად თითოეული საერთო ნიშან-თვისების მიხედვით.

აღალბედზე, პოპულაციის ნაწილზე დაკვირვებების მნიშვნელობათა ერთობლიობას (მოპოვებულ მონაცემებს) პოპულაციიდან შემთხვევითი შერჩევა, (ან შერჩევითი ერთობლიობა-ამონაკრეფი Probability or Statistical) ეწოდება. ამ მეთოდით შერჩევის გამოყოფას პოპულაციიდან შემთხვევითი შერჩევის (ან შემთხვევითი ამოკრეფის) მეთოდი ეწოდება. ამ მეთოდისათვის ძირითადად დამახასიათებელია ის, რომ პოპულაციის თითოეული ელემენტისათვის განსაზღვრულია შერჩევაში (ამონაკრეფში) მოხვედრის შანსი.

შემთხვევითი შერჩევის ძირითადი მეთოდებია:

ა) მარტივი შემთხვევითი შერჩევა (Simple random sampling), როდესაც პოპულაციის ყოველ ელემენტს შერჩევაში მოხვედრის ერთნაირი შანსი აქვს.

ბ) სისტემატური შემთხვევითი შერჩევა, როდესაც აღალბედზე ვირჩევთ მხოლოდ პირველ ელემენტს 1-დან m -მდე, ხოლო შემდეგ ისევ აღალბედზე ვირჩევთ ყოველ მომდევნო k ბიჯით დაშორებულ ელემენტს. m რიცხვი განისაზღვრება პოპულაციისა და შერჩევის მოცულობების შეფარდების მიხედვით.

გ) განშრეგებული ანუ სტრატეფიცირებული შემთხვევითი შერჩევა, რომელიც ეფუძნება პოპულაციის

დაყოფას თანაუკვეთ ჯგუფებად, რომლებსაც შრეები ეწოდებათ. შრეები ისე უნდა შეირჩეს, რომ პოპულაციის განმსაზღვრელი მახასიათებელი, ნიშან-თვისება თითოეულ შრეში იყოს შექლებისამებრ ერთნაირი. შემთხვევითი შერჩევა ისე უნდა განხორციელდეს, რომ ამ ჯგუფების პროპორციები შერჩევაში ისეთივე იყოს როგორც მთელ პოპულაციაში. შერჩევის ელემენტების არჩევა შრიდან ხდება მარტივი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით.

დ) **კლასტერული შერჩევა**, რომლის მიხედვით პოპულაცია იყოფა თანაუკვეთ ჯგუფებად ანუ კლასტერებად, რომლებიც დამოუკიდებლად განიხილება როგორც მცირე პოპულაციები. ჯერ ხდება პირველადი კლასტერების მარტივი შემთხვევითი შერჩევა, ხოლო შემდეგ შერჩეული კლასტერებიდან ელემენტების გამოსაყოფად გამოიყენება შემთხვევითი შერჩევის რომელიმე მეთოდი.

შერჩევა შეიძლება იყოს **დაბრუნებითი (with replacement)**, ან **დაბრუნების გარეშე (Without replacement)**.

პოპულაციიდან შერჩევა დაბრუნებითია თუ პოპულაციის ყოველი დაკვირვებული ელემენტი მორიგი დაკვირვების ჩატარებამდე ისევ პოპულაციაში ბრუნდება და შერჩევის პროცესი გრძელდება. ამ შემთხვევაში შერჩევის ელემენტების მნიშვნელობები განმეორებადია. თუ არა და შერჩევა ხდება დაბრუნების გარეშე.

ამონაკრეფში (შერჩევაში) ელემენტთა რაოდენობას შერჩევის **მოცულობა (Sample size)** ეწოდება. შერჩევის მოცულობა ყოველთვის სასრულია, მაშინ როცა პოპულაციის მოცულობა შეიძლება იყოს სასრული ან უსასრულო.

შერჩევას ეწოდება **წარმომადგენლობითი, ანუ რეპრეზენტატული (Representative)**, თუ ის კარგად ასახავს იმ პროპორციებს, რომელიც პოპულაციას გააჩნია. თუ შერჩევა არაა წარმომადგენლობითი, მაშინ ამბობენ, რომ პოპულაციიდან შერჩევას აქვს ცდომილება.

სტატისტიკაში განიხილება არაშემთხვევითი შერჩევის მეთოდიც (**Convenience sampling**), ანუ მიწველობადი შერჩევა, როცა შერჩევა ხდება მხოლოდ პოპულაციის მიწველობადი

ნაწილის და მიზანმიმართული შერჩევა (**Judgement sampling**), როცა მცირე, მაგრამ არაერთგვაროვანი პოპულაციის გამოსაკვლევად შეისწავლიან მთელ პოპულაციას და ირჩევენ ტიპური ერთეულების მცირე რაოდენობას, ანუ ისეთებს, რომლებიც კარგად ასახავენ პოპულაციის ძირითად თავისებურებებს.

გავაკეთებთ რამოდენიმე არსებით შენიშვნას:

ბიოლოგიური (ზოოლოგიური) მეცნიერებების მიხედვით რაიმე საერთო ნიშან-თვისების მქონე ინდივიდთა (ობიექტთა) ერთობლიობა წარმოადგენს ოჯახს (სახეობას). სახეობა არსებობს პოპულაციის სახით, რომელიც ბინადრობს განსაზღვრულ გეოგრაფიულ გარემოში, არეალში, მაგალითად: შეგვიძლია ვისაუბროთ კუნძულ „ცეცხლოვან მიწაზე“ მცხოვრები თოლიების პოპულაციაზე. კატისებრთა ოჯახის (სახეობის) შესახებ. მგლის სახეობა არსებობს სვანეთის მგლების პოპულაციის, რაჭის მგლების პოპულაციის და სხვა სახით. შეგვიძლია ვისაუბროთ მუშათა სხვადასხვა კატეგორიებზე მათი საერთო გამაერთიანებელი ხარისხობრივი, თვისობრივი ნიშნის (მახასიათებლის) ან რაოდენობრივი ნიშნის (მახასიათებლის) მიხედვით.

ისევე გვინდა გავუსვათ ხაზი იმ გარემოებას, რომ პოპულაციის თითოეული ობიექტის, ანუ ელემენტარული ერთეულის შესწავლა მოცემული მახასიათებლის მიხედვით ხშირად ვერ ხერხდება, ან მიუღწეველია სხვადასხვა მიზეზის გამო, როგორცაა: ამ ერთეულების დიდი რაოდენობა, რაც გამოიწვევდა შემოწმების დიდ დროით და მატერიალურ ხარჯებს. ანდა როდესაც შემოწმების შედეგად ობიექტი უვარგისი ხდება. მაგალითად: სანადიროდ მიმავალმა მონადირემ, რომ შეამოწმოს წასაღები ყველა ასანთის ღერის ვარგისიანობა ანთებით, ანდა ნათურების ქარხანაში რომ ჩაატარონ ყოველი წარმოებული ნათურის შემოწმება გადაწვამდე (დაღლამდე) დროის განსაზღვრავად. ხშირად პოპულაციის ერთეულების შემოწმება მიუღწეველია; ტბაში რომელიმე სახეობის თევზის შესწავლა წონის, ან დაავა-

დებულობის მიხედვით, ინდივიდების სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესწავლა და სხვა.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ასეთ შემთხვევებში ხდება პოპულაციიდან შემთხვევითი შერჩევის (შემთხვევითი ამონაკრეფის) გამოყოფა, მათი შესწავლა მოცემული მახასიათებლის (ნიშან-თვისების) მიხედვით და შემდეგ მიღებული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე კეთდება დასკვნები პოპულაციაში არსებული პროპორციების შესახებ.

განვიხილოთ კიდევ ერთი საილუსტრაციო მაგალითი:

რაიმე ტექნიკური სისტემის მოცემულ დროში საიმედოდ ფუნქციონირება დამოკიდებულია მისი თითოეული ელემენტის საიმედოდ ფუნქციონირებაზე, ამიტომ წარმოებებში, ქარხნებში ხდება ტექნიკური გამოცდების მოწყობა, მათზე დაკვირვება და მიღებული მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე კეთდება სტატისტიკური დასკვნები და შემდეგ ხდება გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება.

მათემატიკური სტატისტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს შერჩევის საშუალებით პოპულაციის შესწავლა. გარკვეულ პირობებში შერჩევის მახასიათებლებზე სტატისტიკური მეთოდებით გაკეთებული დასკვნები მიახლოებით სამართლიანია პოპულაციის იგივე მახასიათებლებისთვისაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ პირობებში შერჩევის მახასიათებლებს ვიყენებთ მთელი პოპულაციის ანალოგიური მახასიათებლების შესაფასებლად. ამასთან, რაც უფრო დიდია შერჩევის მოცულობა, მით უფრო ზუსტია პოპულაციის მახასიათებლების შესახებ გაკეთებული დასკვნები და პროგნოზები.

როგორც აღვნიშნეთ, მათემატიკური სტატისტიკა პირობითად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად: აღწერითი (დესკრიპციული) სტატისტიკა და სტატისტიკური დასკვნების თეორია, რომელიც მოიცავს პარამეტრულ და არაპარამეტრულ სტატისტიკურ შეფასებებს, ჰიპოთეზათა შემოწმებებს, ცვლადებს შორის კავშირების დადგენას,

კორელაციურ და რეგრესიულ ანალიზს და პროგნოზების გაკეთებას.

საზოგადოდ, სტატისტიკური დასკვნების მისაღებად არსებობს ორი ძირითადი მიდგომა: შეფასება და ჰიპოთეზათა შემოწმება.

§2. მონაცემთა მოპოვების მეთოდები. ცვლადი.

1) დაკვირვება (observation), გაზომვა, აღწერა, რაც წარმოადგენს მონაცემების შეგროვების მეთოდს შესასწავლ ობიექტზე უშუალოდ ჩატარებული დაკვირვებების პროცესში.

მაგალითი 2.1. ცხრილი 2.1-ით მოცემულია შემთხვევით შერჩეული ათი სტუდენტის სიმაღლე, გაზომვის რიგის მიხედვით (აღვნიშნოთ სიმაღლე X ცვლადით).

ცხრილი 2.1

დაკვირვების რიგითი №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
სტუდენტის სიმაღლე X	164	178	172	166	162	174	178	176	168	182

სიმაღლეები გაზომილია სანტიმეტრებში და მიღებულია “ნედლი” მონაცემები. „სიმაღლე“ პოპულაციის რიცხვითი მახასიათებელია. იგი ზოგადად აღვნიშნოთ X ცვლადით. დაკვირვების რიგითი ნომრის მიხედვით გაზომვით მიღებული X-ის მნიშვნელობებია: $x_1=164$; $x_2=178$; $x_3=172$; $x_4=166$; $x_5=162$; $x_6=174$; $x_7=178$; $x_8=176$; $x_9=168$; $x_{10}=182$. მათ ნედლ რიცხვით მონაცემებს ვუწოდებთ. X ცვლადის მნიშვნელობები შემთხვევით ფაქტორებზეა დამოკიდებული. X-ს შემთხვევით სიდიდესაც უწოდებენ. x_1, x_2, \dots, x_{10} მისი შესაძლო მნიშვნელობებიდან დაკვირვებით, „გაზომვით“ მიღებული რიცხვითი მნიშვნელობებია (ანუ რიცხვითი მონაცემებია).

ცვლადები შეიძლება იყოს დისკრეტული და უწყვეტი ტიპის. ცვლადებს აღვნიშნავთ X, Y, Z... სიმბოლოებით.

- **დისკრეტული ცვლადები** წარმოადგენენ ისეთი მახასიათებლების აღმწერ (შესაბამის) ცვლადებს, რომლებმაც შეიძლება მიიღოს ცალკეული განმხილველი მნიშვნელობები.

- **ცვლადები უწყვეტია**, თუ ისინი შეესაბამებიან ისეთ მახასიათებლებს, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ მნიშვნელობების უსასრულო რაოდენობა, ამასთან უწყვეტმა ცვლადმა შეიძლება მიიღოს ნებისმიერი რიცხვითი მნიშვნელობა რაიმე რიცხვითი ინტერვალიდან.

- ცვლადები, რომლებიც ახასიათებენ პოპულაციის ელემენტარული ერთეულების ისეთ თვისებას, რომლისთვისაც შესაძლებელია მხოლოდ იმის დადგენა, თუ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება ობიექტი, **კატეგორიზებული ცვლადები** ეწოდებათ.

- ცვლადებს, რომლებიც ყველაზე სრულფასოვნად გამოიხატება რიცხვების საშუალებით **რაოდენობრივი ცვლადები** ეწოდებათ.

2) ექსპერიმენტის ჩატარება (Experimentation), რაც წარმოადგენს ექსპერიმენტის წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მკვლევარის მიერ წარმოებულ ქმედებათა თანმიმდევრობას გამოსაკვლევ ობიექტების რაოდენობრივი ან თვისებრივ-ხარისხობრივი მახასიათებლების მონაცემების მოსაპოვებლად და საინტერესო პარამეტრების განსაზღვრისათვის. ექსპერიმენტის ჩატარებისას ხდება ერთი ან რამოდენიმე პარამეტრის შეცვლა ისე, რომ განისაზღვროს მათი ზეგავლენა გამოსაკვლევ პარამეტრებზე (მახასიათებლებზე).

3) მითითებულ რესპონდენტთა ჯგუფის გამოკითხვა მზა ანკეტით (კითხვარით) Survey.

მაგალითი 2.2. თვალსაჩინოებისათვის იხილეთ დანართი IV, V, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საქართველოს განათლების სფეროში რეალურად ჩატარებული გამოკვლევების კითხვარს (ანკეტას). იგი შექმნილია დაგვარად სრულყოფილი სახითაა წარმოდგენილი ორიგინალთან მიმართებაში, ამდენად დაინტერესებულ მკითხველს დიდ დახმარებას გაუწევს.

რესპონდენტი არის ადამიანი, რომელიც გამოკითხვის ჩატარების დროს ინფორმაციის უშუალო წყაროს წარმოადგენს.

კორესპონდენტი (ინტერვიუერი) არის ის პიროვნება, ვინც შეკითხვებით მიმართავს რესპოდენტს და ინიშნავს მიღებულ პასუხებს. იგი სპეციალურად შეიძლება მომზადდეს. მას უნდა ჩაუტარდეს სათანადო ინსტრუქტაჟი (გაეცანით დანართ IV, V-ს).

გამოკითხვის ძირითადი ეტაპებია:

- გამოკითხვის მიზნის და ამოცანების განსაზღვრა.
- გამოკითხვის მიზნებიდან გამომდინარე რესპონდენტთა კატეგორიების განსაზღვრა.
- კითხვარის შექმნა **დახურული, ღია ან შერეული** კითხვებით.
 - კითხვარის წინასწარი ტესტირების ჩატარება.
 - რესპონდენტთა რაოდენობისა და მათი შერჩევის მეთოდების განსაზღვრა.
 - რესპონდენტთა შერჩევა და გამოკითხვის ჩატარება. მონაცემების შეგროვება.
 - მონაცემების **ანკეტირებით** მოპოვების შემთხვევაში ძირითადად გამოიყენება **დახურული და ღია ტიპის** კითხვები (**Closed-end questions**) და (**Open end questions**).
 - **დახურული ეწოდება** კითხვას, რომელსაც თანახლავს პასუხის შესაძლო ვარიანტები.
 - **ღია ეწოდება** კითხვას, რომელსაც პასუხის შესაძლო ვარიანტები არ ახლავს.

მაგალითად, დახურულია კითხვა:

„რომელ ტაძარშია დაკრძალული ქართველთა განმანათლებელი წმინდა ნინო?“

- ა) ალავერდის ბ) ბოდბის
- გ) გელათის დ) სვეტიცხოვლის

ხოლო კითხვა: „რომელი ქართული ეკლესიები მდებარეობენ დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე“ - **ღია ტიპისაა.**

- კითხვები, რომლებიც შეეხება რესპოდენტის პირად მონაცემებს **დემოგრაფიული (Demografic)** კითხვებია. გამოკითხვის ჩატარების ფორმები შეიძლება იყოს:

- პირადი ინტერვიუთი (**Personal interview**) – სტრუქტურირებული (**Structured**), როცა ყველა კითხვა წინასწარ არის განსაზღვრული, ან არასტრუქტურირებული (**Unstructured**), რომელიც იწყება ერთი ან რამოდენიმე ზოგადი კითხვით და მომდევნო კითხვები დამოკიდებულია რესპოდენტის პასუხებზე.

- სატელეფონო გამოკითხვები (**Telephone survey**) და წერილობითი გამოკითხვები (**Telephone survey**).

- სატელევიზიო, რადიო და ზოგადად მედიასაშუალებებით რესპოდენტთა გაზრდილი რაოდენობის ერთდროულად ინტერაქტიული გამოკითხვები.

ჩამოთვლილი მეთოდებით შეგროვილ მონაცემებს ეწოდებათ პირველადი მონაცემები.

4) მონაცემების მოპოვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდია უკვე არსებული და გამოქვეყნებული მონაცემების გამოყენება (**Published source**). ამ მეთოდით მოპოვებულ მონაცემებს მეორადი მონაცემები (**Secondary Data**) ეწოდებათ.

მეორადი მონაცემები შეიძლება მოვიპოვოთ სტატისტიკური დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიდან, სხვადასხვა დარგობრივი სამინისტროების, უწყებების, ბიზნეს ორგანიზაციების, ფირმების გამოქვეყნებული მასალებიდან, კატალოგებიდან, საარქივო მასალებიდან, ჟურნალ-გაზეთებიდან, ინტერნეტიდან და სხვა.

5) საარქივო ჩანაწერები (**archival records**) წარმოადგენს ჩანაწერების სახით არქივებში დაგროვილ ინფორმაციას საზოგადოების წევრების შესახებ, როგორცაა: დაბადების, ნათლობის, ქორწინების, გარდაცვალების, დაავადებების, მკვლევლობების, მოსახლეობის აღწერის მონაცემების ჩანაწერების, ზოგადად კრიმინალური ანგარიშების სახით, არქივებში დაცული საწარმოო, საბუღალტრო-ეკონომიკური ანგარიშები და სხვ.

არსებობს მრავალი ისტორიული მაგალითი იმისა, თუ როგორ წარმატებით გამოიყენა საარქივო ჩანაწერები ამა თუ იმ მკვლევარმა. საილუსტრაციოდ შეგიძლიათ იხილოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოში მაგ. 1.6., მაგ. 1.7.; ასევე ცნობილია, რომ ლონდონელმა მკვლევარმა ჯონ გრანტმა

(John Crant, 1620-1674) შეისწავლა დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ საარქივო ჩანაწერები და გამოიკვლია განსხვავება მამაკაცებისა და ქალების სიკვდილის მიზეზებში.

6) ბუნებრივი დაკვირვება (Naturalistic observation)
წარმოადგენს სიტუაციებში ჩარევის გარეშე ბუნებრივ პირობებში ადამიანთა, ცხოველთა, ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელ ინდივიდთა ქცევებზე დაკვირვებების საფუძველზე მონაცემების მოტივების კვლევის მეთოდს, მაგალითად: ტრინკაუსი (Trincaus) 1982-1993 წლებში აკვირდებოდა მძღოლების ქცევას ერთ გზაჯვარედინზე. აღმოაჩინა, რომ მისი 10-წლიანი დაკვირვების განმავლობაში შემცირდა მძღოლების დამორჩილება შუქნიშნის წითელ შუქზე. მძღოლებმა დამკვირვებლის არსებობა არ იცოდნენ.

მონაცემების მოპოვებისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მონაცემთა „დამახინჯება“, ანუ ჩანაცვლება (**Bias**). მისი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს: მკვლევარის სუბიექტური აღქმით გამოწვეული ჩანაცვლება (**Observer bias**), გაზომვის ცდომილება (**Measurement error**), *გამოკითხვის დროს უპასუხოდ დარჩენილი კითხვების დიდი რაოდენობა (Nonresponse bias)*, კვლევისას დაკვირვებულ მნიშვნელობათა შერჩევის მეთოდით გამოწვეული ჩანაცვლება (*Selection bias*).

სასწავლო ექსპერიმენტული გამოკვლევა

ქვემოთ მოცემულია ანკეტის ნიმუში, რომლითაც სახელმძღვანელოს ერთ-ერთმა ავტორმა ჩაატარა ინფორმატიკის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის II კურსის 20-კაციანი აკადემიური ჯგუფის სტუდენტთა სასწავლო ექსპერიმენტული გამოკითხვა. გამოკითხვა ჩატარდა რეალურ პირობებში ანკეტის ნიმუშის მიხედვით, წესების ფორმალური დაცვით, 2009 წლის 1 აპრილს. კვლევის თემა მითითებულია ანკეტაში.

სასწავლო-ექსპერიმენტული ანკეტა

საქართველოში წარმატებული კარიერისათვის აუცილებელი წინაპირობის შესახებ სტუდენტთა აზრის გამოკვლევა.

სასწავლებელი ----- ფაკულტეტი, კურსი -----
ინტერვიუერი -----
(გვარი, სახელი) (ხელმოწერა) (თარიღი)
ინტერვიუერის შენიშვნები და კომენტარები -----

ზედამხედველი -----
(გვარი, სახელი) (ხელმოწერა) (შემოწმების თარიღი)
ზედამხედველის შენიშვნები და კომენტარები -----

კორექტორის შენიშვნები და კომენტარები -----

• წინამდებარე კითხვარის მიზანია სამსახურებრივი კარიერისათვის აუცილებელი წინაპირობის შესახებ საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა აზრის გამოკვლევა.

რესპონდენტს: თქვენი პასუხები გამოყენებული იქნება მხოლოდ სასწავლო მიზნით, განზოგადებული სტატისტიკური შეფასების მისაღებად.

ინტერვიუერს: გთხოვთ გამოჰკითხოთ მხოლოდ არსებული სასწავლებლისა და ფაკულტეტის სტუდენტებს, რესპონდენტს პირველ რიგში წარუდგინეთ თქვენი თავი, გააცანით ანკეტის შესავალი და ზოგადად აუხსენით გამოკვლევის მიზნები, შემდეგ კი - წინამდებარე კითხვარის სტრუქტურა და პირობები.

1. რა მიგაჩნიათ საქართველოში წარმატებული კარიერის წინაპირობად?

- შრომა
- ნიჭი
- ბედი
- მემკვიდრეობითობა
- ახლობელთა და მეგობართა წრე
- განათლების მიღება უცხოეთში, თუნდაც
- ნებისმიერ ქვეყანაში
- პასუხი არა მაქვს

2. რომელი საგნის ან საგნების შესწავლა მიგაჩნიათ აუცილებელ პირობად თქვენს სპეციალობაში წარმატებული კარიერის მისაღწევად? -----

3. რესპონდენტს (სტუდენტს): მოკლედ, წერილობით, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები და შენიშვნები წინამდებარე ანკეტის აღექვატურობის შესახებ კვლევის ძირითადი მიზნის მიღწევის საქმეში. კითხვარში რა საკითხს ჩაუმატებდით ან ამოიღებდით? -----

გმადლობთ ინტერვიუსათვის.

შენიშვნა: დანართ IV-ში შემოთავაზებული საქართველოში ქართველი მკვლევარების მიერ ჩატარებული ერთ-ერთი გამოკვლევის ანკეტის ნიმუში ვფიქრობთ, დაგეხმარებათ გამოკითხვით მონაცემთა შეგროვების სტრუქტურულ-ორგანიზაციული საკითხების გააზრებაში.

გამოკითხვის ანკეტის პირველი პუნქტის მიხედვით დაფიქსირებულ შედეგებზე დაყრდნობით შედგა მონაცემთა სისშირეების დათვლის შემდეგი ცხრილი.

ცხრილი 2.2.

შრომა		1
ნიჭი		6
ბედი		0
მემკვიდრეობითობა		4
ახლობელთა და მეგობართა წრე		2
განათლების მიღება უცხოეთში		2
პასუხი არა აქვს		1
ბათილი ბიულეტენი		4

ა) ავაგოთ მონაცემების სისშირეთა შესაბამისი პროცენტული განაწილების წრიული დიაგრამა

ამოხსნა. წრიული დიაგრამის ასაგებად წრე იყოფა სისშირეთა პროპორციულ სექტორებად, რისთვისაც ვპოულობთ თითოეული სექტორის შესაბამის ცენტრალურ კუთხეს მოცემული n_i სისშირის მიხედვით ფორმულით:

$$\alpha_i = \frac{360^\circ \cdot n_i}{100n} \cdot 100 = \frac{360^\circ \cdot n_i}{n}$$


$$\sum_{i=1}^K n_i = 20, \text{ რესპოდენტთა რიცხვი ტოლია 20-ის. (n=20)}$$

შედეგება სამუშაო ცხრილი:

ცხრილი 2.3.

ღონე	მონიშვნა	სიხშირე n_i	პროცენტული $n_i/n \cdot 100\%$	a %-ის შესაბამისი ცენტრალური კუთხე $\alpha = (3,6 a)^\circ$
შრომა		1	5%	18°
ნიჭი		6	30%	108°
ბედი		0	0%	0°
მემკვიდრეობითობა		4	20%	72°
ახლობელთა და მეგობართა წრე		2	10%	36°
განათლების მიღე- ბა უცხოეთში		2	10%	36°
პასუხი არა აქვს		1	5%	18°
ბათილი ბიულეტენი		4	20%	72°
სულ		20 რესპონ- დენტი	100%	360°

ცენტრალური კუთხეების მიხედვით აიგება წრიული დიაგრამა.



ნახ. 2.1.

შენიშვნა:

- არ უნდა დაგვავიწყდეს ბათილი კითხვარების აღრიცხვა და იმ რესპოდენტთა აღრიცხვა, რომლებმაც

პასუხისაგან თავი შეიკავებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კვლევა სრულფასოვანი არ იქნება.

- დიაგრამაზე კუთხეები მონიშნულია მიახლოებით, მხოლოდ შესაბამისი პროპორციების დაცვით.

5) ხარისხის ტექნიკური კონტროლის სტატისტიკური მეთოდი ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდია, როგორც წარმოების ყოველი უბნისა და კონტროლის ობიექტისათვის, ისე პროდუქციის (ნაწარმის) ხარისხის შესწავლისათვის მოხმარების სფეროში. (იხილეთ წიგნი ი. ზედგენიძე, მ. ბაიაშვილი, ხარისხის მართვა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008).

ტექნიკურ კონტროლს ექვემდებარება ობიექტების როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი მახასიათებლები და პარამეტრები. მოპოვებული მონაცემები ძირითადად სპეციალური დანიშნულებისაა.

შეიძლება გამოვყოთ ხარისხის ტექნიკური კონტროლის მონაცემების მოპოვების შემდეგი ძირითადი მიმართულებები:

- ვიზუალური დათვალიერება (აღწერა), რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ვიზუალურად ზედაპირული დეფექტების არსებობა, ან არ არსებობა (თვისობრივი მონაცემები).

- ლაბორატორიული ანალიზი, რომელიც მასალის, ნაწარმის, დეტალის მექანიკური, ქიმიური, ფიზიკური, მეტალოგრაფიული და სხვა თვისებების განსაზღვრის საშუალებას იძლევა (რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემები).

- მექანიკური გამოცდა - სიმტკიცის, გამძლეობის და სხვა პარამეტრების განსაზღვრისათვის (რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემები).

- რენტგენოგრაფიული, ელექტროთერმული, ელექტრომაგნიტური და სხვა გამოცდის ფიზიკური მეთოდები (თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები).

- ტექნიკური დისციპლინის კონტროლი და ტექნოლოგიური გასინჯვები, რომელიც ტარდება მაშინ, როდესაც ლაბორატორიული ანალიზი საკმარისი არ არის (თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემები).

- საკონტროლო - ჩასაბარებელი გამოცდა - ხარისხის კონკრეტული მოცემული მაჩვენებლისა და მახასიათებლის განსაზღვრისათვის.

- მოხმარების სფეროში გამოკვლევებისა და კონტროლის ის მეთოდები, რომლებიც დამყარებულია ელექტრონული, იონური სხივების გამოყენებაზე, როგორცაა ელექტრონული სპექტროსკოპია. ელექტრონულ - ზონდური რენტგენული მიკროანალიზი, მეორადი იონური მას - სპექტროგრაფია, რენტგენოსკოპია, ულტრაბგერითი კვლევები და სხვა.

ხარისხის კონტროლის შედეგად მოპოვებული მონაცემების დამუშავების, ანალიზისა და დასკვნის საუკეთესო საშუალებაა კვლევის ალბათურ-სტატისტიკური მეთოდები.

§3. სტატისტიკურ მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები და ანალიზი

- განსაზღვრებიდან გამომდინარე, სტატისტიკური მონაცემები (შემდგომში მონაცემები) უნდა შეიცავდნენ ობიექტურ ინფორმაციას პოპულაციის შესასწავლი საერთო მახასიათებლის, ანუ პოპულაციის ობიექტთა შესასწავლი საერთო ნიშან-თვისების შესახებ. მონაცემების რეპრეზენტატიულობას (წარმომადგენლობითობას), მონაცემთა სწორად მოპოვებისა და წარმოდგენის ხერხებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და შემდგომში გვეხმარება ამ ინფორმაციის ადეკვატურად გააზრების, სწორი ანალიზის, შესაბამისად, სწორი დასკვნების გამოტანისა და შესასწავლი ნიშან-თვისების ობიექტურად, წარმატებულად პროგნოზირებაში.
- სტატისტიკური მონაცემების მოსახერხებელი ფორმით წარმოდგენის სხვადასხვა საშუალება არსებობს, როგორცაა: ნედლი მონაცემების ცხრილი, პიქტოგრამა, ხისებრი ფოთლებიანი დეროების დიაგრამა, წერტილოვანი დიაგრამა, ხაზოვანი დიაგრამა, მესერული დიაგრამა, სვეტოვანი დიაგრამა (Bar chart) – იგივე პარეტოს დიაგრამა, წრიული დიაგრამა, მონაცემების სიხშირეთა (ან ფარდობით სიხშირეთა) და პროცენ-

ტული განაწილების ცხრილებში მონაცემების სიხშირეთა (ან ფარდობით სიხშირეთა) ინტერვალური განაწილებისა და დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა (ან დაგროვილ სიხშირეთა) განაწილების ცხრილები.

- მონაცემების სიხშირეთა (ან ფარდობით სიხშირეთა) ინტერვალური განაწილების მიხედვით, აგებენ განაწილების შესაბამის ჰისტოგრამას (histogram), განაწილების პოლიგონს, ოგივას და სხვა.
- მონაცემების დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა მიხედვით, მონაცემთა მისთვის ინტერვალებად დაყოფის გათვალისწინებით აგებენ განაწილების კუმულატას.

ზოგიერთი შენიშვნა

n_i არაუარყოფით მთელ რიცხვს, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ განმეორდა რომელიმე x_i მონაცემი, ეწოდება ამ მონაცემის სიხშირე.

მონაცემის სიხშირის განაყოფს მონაცემთა რაოდენობაზე ეწოდება ამ მონაცემის ფარდობითი სიხშირე $\left(\frac{n_i}{n}\right)$.

პროცენტულად $\left(\frac{n_i}{n}\right)100\%$.

მოდა (Mo) ეწოდება იმ მონაცემს, რომლის სიხშირე (ან ფარდობითი სიხშირე) თითოეული სხვა მონაცემის სიხშირეზე (ფარდობით სიხშირეზე) მეტია.

მონაცემებს შეიძლება არ ჰქონდეთ მოდა, ეს მაშინ მოხდება თუ თითოეული მონაცემის სიხშირე ტოლია, შეიძლება ჰქონდეს ერთი ან ერთზე მეტი მოდა.

შინაარსობრივად სიტყვა „მოდა“ ცხოვრებაშიც მსგავსი შინაარსით გამოიყენება. პოპულარული, გავრცელებული, მაგრამ არა ყველა.

მაგალითად: 1) მონაცემებს 5; 3; 6; 0; 7; 9; 2; 1; 4; 8 მოდა არ გააჩნია. ხოლო მონაცემებს 4; 3; 5; 4; 3; 3; 4; 8; 6; 9 აქვს ორი მოდა 3 და 4.

მაგალითებში: 1.1; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1, პირველადი ნედლი მონაცემები ჩაწერილია ცხრილში, ისეთივე თანმიმდევრობით, როგორც ისინი დაკვირვებათა (ცდების) მიხედვით მიიღებიან.

- ნედლი რიცხვითი მონაცემების მოწესრიგება და დამუშავება იწყება, მათი არაკლებადი მიმდევრობის სახით გადალაგებით. ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ მონაცემები დალაგებულია ვარიაციული მწკრივის სახით. მათ შორის უდიდეს და უმცირესს კიდურა მონაცემები ეწოდება.

– უდიდეს და უმცირეს მონაცემებს შორის სხვაობას მოცემული მონაცემების გაბნევის დიაპაზონი (**Range**) ეწოდება და აღინიშნება R -ით.

ვთქვათ $x'_1, x'_2, x'_3, \dots, x'_n$ x ცვლადზე დაკვირვების რიგის მიხედვით ჩაწერილი ნედლი რიცხვითი მონაცემებია. n მონაცემთა მოცულობაა. დავალაგოთ მონაცემები „ვარიაციული მწკრივის“ სახით:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \text{ სადაც } x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_n$$

$$(\text{ან } x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_k, \text{ სადაც } 0 < k \leq n)$$

x_1 არის უმცირესი მონაცემი, ხოლო x_n (ან x_k) - უდიდესი მონაცემია.

$$\text{თუ } x_1 = \min_{1 \leq i \leq n} x'_i; \quad x_k = \max_{1 \leq i \leq n} x'_i, \text{ მაშინ}$$

$$R = x_k - x_1$$

x_i -ს ვარიანტასაც უწოდებენ.

– **მედიანა (Me)** არის არაკლებადი მიმდევრობით დალაგებული მონაცემებიდან:

ა) შუა მონაცემი, თუ მონაცემთა n რიცხვი კენტია.

მონაცემების: 4; 4; 4; 5; 6; 7; 9 მედიანა 5-ის ტოლია

ბ) ორი მეზობელი შუა მონაცემის არითმეტიკული საშუალო, თუ მონაცემთა n რიცხვი ლუწია.

მონაცემების 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 მედიანა 6-ის ტოლია, რადგან $\frac{5+7}{2} = \frac{12}{2} = 6$

- ზოგადად, თუ დავუშვებთ, რომ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ვარიაციულ მწკრივად დალაგებული მონაცემებია და აღვნიშნავთ მედიანას Me – სიმბოლოთი, მაშინ იგი გამოითვლება შემდეგი წესით:

$$\text{ა) } Me = x_{\frac{1+n}{2}}, \text{ რაც იმას ნიშნავს, რომ მედიანა } \frac{1+n}{2}$$

ნომრიანი მონაცემია, თუ მონაცემების მოცულობა n კენტი რიცხვია.

მაგალითად, თუ გვაქვს სამი მონაცემი x_1, x_2, x_3 , მაშინ შუა მონაცემი, ანუ მედიანა $Me = x_2 = x_{\frac{1+3}{2}}$. იგი $\frac{1+3}{2} = 2$ ნომრიანი წევრია, მონაცემების მოცულობა $n=3$, კენტი რიცხვია.

ბ) $Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$, თუ n ლუწი რიცხვია.

მონაცემების x_1, x_2, x_3, x_4 შემთხვევაში, $n=4$ და $Me = \frac{x_2 + x_3}{2}$, ანუ იგი $x_{\frac{4}{2}} = x_2$, მე-2 ნომრიანი წევრისა და $x_{\frac{4}{2}+1} = x_3$, ერთით მეტნომრიანი წევრის არითმეტიკული საშუალოა.

- ვარიაციის დიაპაზონს, მოდას, მედიანას სტატისტიკური მონაცემების რიცხვით მახასიათებლებს უწოდებენ. ისინი გარკვეულ საჭირო ინფორმაციას გვაწვდიან სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. იგივე აზრით განისაზღვრება შერჩევისათვის დიაპაზონი, მოდა, მედიანა, რომლებიც საბოლოო ჯამში პოპულაციის (შესასწავლი ცვლადის, ანუ ატრიბუტის) ანალიზური მახასიათებლების შეფასებას წარმოადგენენ.

მონაცემთა წარმოდგენის მახასიათებელი

ზოგჯერ წარმოდგენილი მონაცემები სპეციალური დანიშნულებისაა.

მაგალითი 2.4. მოცემულია A, B, C, D, M, N, L ქალაქებს შორის მანძილები (კილომეტრებში) შემდეგი ცხრილით:

ცხრილი 2.4.

A						
108	B					
176	81	C				
56	138	174	D			
104	78	74	102	M		
32	88	146	50	72	N	
74	36	122	124	92	74	L

ცხრილში რეალური ქალაქების დასახელებები გამიზნულადაა შეცვლილი პირობითი ასოებით. მონაცემები აღებულია [12] წიგნიდან.

ორ ქალაქს შორის მანძილი შესაბამისი ჰორიზონტალური სტრიქონისა და ვერტიკალური სვეტის გადაკვეთაზე მდგომი რიცხვია. მაგალითად CN მანძილი 146 კმ-ია.

ა) რა საშუალებით შეიძლება ამ მონაცემების შეგროვება?

ბ) დაასახელეთ სხვადასხვა ქალაქების წყვილები და იპოვეთ მათ შორის მანძილები.

გ) დაასახელეთ მონაცემები, რომლებიც მეორდებიან და შესაბამისი ქალაქების წყვილები.

დ) რა უმოკლესი მანძილია B-დან N ქალაქამდე, D ქალაქის გავლით?

მაგალითი 2.5. საქართველოს ერთ-ერთმა ბანკმა იმ პირებს, რომლებიც მისი მომსახურებით სარგებლობენ და საშუალოდ ყოველთვიურად იხდიან არანაკლებ 100 ლარის კომუნალურ გადასახადს, შესთავაზა სესხის ახალი ფორმა.

ქვემოთ მოცემულია საბანკო სესხის (თანხის) განაწილების ცხრილი ლარებში:

ცხრილი 2.5.

ყოველთვიური საშუალო კომუნალური გადასახადი (ბოლო 6 თვის მონაცემების მიხედვით)	სესხი 12 თვის ვადით
100	1000
150	1500
200	2000
250	2500
300	3000
350	3500
400	4000

მონაცემები წარმოდგენილია ბანკის სარეკლამო ბარათის მიხედვით. წარმოადგინეთ მონაცემები **ხაზოვანი დიაგრამის სახით**, ამისათვის აბსცისათა ღერძზე დაა-

ფიქსირეთ კომუნალური გადასახადის შესაბამისი, ორდინატო ღერძზე კი სესხის შესაბამისი წერტილები. საკოორდინატო ღერძებზე მონიშნული წერტილები შეაერთეთ. აგებული დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ კითხვებს:

ა) რა თანხის აღება შეიძლება სესხად, თუ ყოველთვიური საშუალო კომუნალური გადასახადი შეადგენს 225 ლარს?

ბ) აღმოაჩინეთ კანონზომიერება მონაცემთა ცხრილში და გამოსახეთ ფორმულით კავშირი საშუალო კომუნალურ გადასახადსა და სესხის სიდიდეს შორის. რა თანხის აღება შეიძლება სესხად, თუ საშუალო კომუნალური გადასახადი შეადგენს 315 ლარს.

გ) რა თანხის აღება შეიძლება სესხად, თუ ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადახდილია კომუნალური გადასახადები (ლარებში):

150; 160; 190; 140; 110; 90.

„ხარისხის კონტროლის შვიდი იაპონური ინსტრუმენტის“ ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილია საკონტროლო ფურცელი. (იხილეთ წიგნი ი.ზედგენიძე, მ. ბაიაშვილი. ხარისხის მართვა. სტუ. თბილისი 2008). საკონტროლო ფურცელი მონაცემების შეკრების და მათი მოწესრიგების ინსტრუმენტია მოპოვებული (შეგროვილი) ინფორმაციის შემდგომი გამოყენების გასაადვილებლად.

საკონტროლო ფურცელი ქაღალდის ბლანკია, რომელზეც წინასწარ ამობეჭდილია საკონტროლო პარამეტრები, რომელთა შესაბამისად შესაძლებელია მონაცემების შეტანა სიმბოლოების საშუალებით. საკონტროლო ფურცლების შედგენისას საჭიროა ყურადღება მიექცეს, რომ ნაჩვენები იყოს, ვინ, პროცესის რომელ ეტაპზე და რა დროის განმავლობაში შეაგროვა მონაცემები, აგრეთვე იმას, რომ ფურცლის ფორმა იყოს უბრალო და დამატებითი განმარტებების გარეშე გასაგები.

მონაცემთა სიზშირეების ღათვლა

მაგალითი 2.6. [იხ. წიგნი [11]. მოვიყვანოთ საკონტროლო ფურცელი, რომელიც გამოიყენება ტელევიზორის ნამტყუნები დეტალების ფიქსირებისათვის (ნახ. 2.2).

ატელიეში შეცვლილი დეტალები ყოველი შეცვლილი დეტალი აღნიშნეთ ხაზით აღნიშნეთ ასე: (1, 2, 3, 4, 5) დრო: 1-6 აპრილი 2008 წ. ხელოსანი: კახიანი ა.ბ.		სიხშირე
მოდელი 1013		
ინტეგრალური სქემები		3
კონდენსატორები		26
წინაღობები		1
ტრანსფორმატორები		2
გადამრთველები		8
მილაკები		1
	სულ	41
მოდელი 1017		
ინტეგრალური სქემები		1
კონდენსატორები		24
წინაღობები		2
ტრანსფორმატორები		3
გადამრთველები		0
მილაკები		1
	სულ	31
მოდელი 1019		
ინტეგრალური სქემები		4
კონდენსატორები		27
წინაღობები		1
ტრანსფორმატორები		4
გადამრთველები		3
მილაკები		1
	სულ	40
	ჯამი	112

ნახ. 2.2. საკონტროლო ფურცელი

- შეადგინეთ მტყუნებათა სიხშირეებისა და სიხშირეთა პროცენტული განაწილების ცხრილი

ამოხსნა

საკონტროლო ფურცლის საშუალებით შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე შედგება ჯამური მტყუნებების სიხშირეთა ცხრილი 2.6

ცხრილი 2.6.

ყველა მოდელის მიხედვით	ტყუნებების რაოდენობა სიხშირე n_i	პროცენტული შემადგენლობა $\left(\frac{n_i \cdot 100}{n}\right)$
ინტეგრალური სქემები	8	7,1
კონდენსატორები	77	68,8
წინაღობები	4	3,6
ტრანსფორმატორები	9	8,0
გადამრთველები	11	9,9
მილაკები	3	2,6
ჯამი	112	100

ტელევიზორის ნამტყუნები დეტალების ჯამური რაოდენობა

სიხშირეთა (ან ფარდობით სიხშირეთა) განაწილების ცხრილი წარმოადგენს ცხრილს, რომელშიც წარმოდგენილია დალაგებული მონაცემების ვარიანტების შესაძლო x_i მნიშვნელობები და ყოველი x_i მნიშვნელობის შესაბამისი სიხშირე (ან ფარდობითი სიხშირე $n_i/n=N_i$, $n = \sum_{i=1}^k n_i$) $i=1,2,\dots,n$. თითოეული მონაცემის ფარდობითი სიხშირის 100-ზე გამრავლებით მივიღებთ მონაცემთა პროცენტულ განაწილებას.

ფოთლებიანი ღეროების დიაგრამის აბეზა

მაგალითი 2.7. ნავთობმომპოვებელი კომპანიის მიერ მოპოვებული ნავთობის რაოდენობა დღეების მიხედვით (ბარელებში, 1 ბარელი=159 ლიტრს), წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. შევადგინოთ ა) ფოთლებიანი ღეროების დიაგრამა, სიხშირეთა, ფარდობით სიხშირეთა და პროცენტული განაწილების ცხრილი. წინასწარ დააღაგეთ მონაცემები ვარიაციულ მწკრივად და იპოვეთ გაბნევის დიაპაზონი, მოდა და მედიანა.

ცხრილი 2.7.

დაკვირვების ნომერი (დღეები)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
მოპოვებული ნავთობის რაოდენობა	208	182	208	207	203	201	191	194	183	181	207	205	207	221

ამოხსნა. თვალსაჩინოების მიზნით ხშირად სტატისტიკურ მონაცემებს წარმოადგენენ ფოთლებიანი ღეროების დიაგრამის სახით შემდეგი წესით: ყოველი რიცხვი თუ მონაცემი დაეყოს ორ ნაწილად. რიცხვის პირველი ორი ციფრი ჩავწერთ ვერტიკალური ხაზის მარცხნივ, ხოლო ბოლო ციფრი კი მივუწერთ შესაბამისად ჰორიზონტალურად ამ ხაზის მარჯვენა მხრიდან. ამასთან დავიცვათ ზრდადობის ტენდენცია ზემოდან ქვემოთ და მარცხნიდან მარჯვნივ

ცხრილი 2.8.

ღ			
ქ	18	123	
რ	19	14	
ო	20	13577788	
ქ	21		
ბ	22	1	
ო			

არაკლებადი მიმდევრობით დალაგებული მონაცემები, ანუ ვარიაციული მწკრივია: 181, 182, 183, 191, 194, 201, 203, 205, 207, 207, 207, 208, 208, 221. გაბნევის დიაპაზონია $R=221-181=40$ (ბარელი) – იგი არის უდიდეს და უმცირეს მონაცემთა სხვაობა

მოდა $Mo=207$ ბ (ბარელი) – იგი არის უდიდესი სიხშირის მქონე მონაცემი.

$$\text{მედიანა } Me = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1} \right) = \frac{1}{2} (x_7 + x_8) = \frac{203 + 205}{2} = 204 \text{ ბ}$$

სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) განაწილების ცხრილს აქვს სახე:

ცხრილი 2.9

ვარიანტის № i	მოპოვებული ნაუთობის რაოდენობა x_i (ვარიანტა)	შესაბამისი სიხშირე n_i	შესაბამისი ფარდობითი სიხშირე n_i/n
1	181	1	-
2	182	1	1/14
3	183	1	1/14
4	191	1	1/14
5	194	1	1/14
6	201	1	1/14
7	203	1	1/14
8	205	1	1/14
9	207	3	3/14
10	208	2	2/14
11	221	1	1/14
ჯამი Σ		14	1

$n=14$ – მონაცემების მოცულობაა.

$K=11$ – ვარიანტების (ზრდადობით დალაგებული მონაცემების) რაოდენობაა.

$\sum_{i=1}^K n_i = n = 14$. ვარიანტების შესაბამისი სიხშირეთა ჯამი მონაცემთა რაოდენობის ტოლია.

$\sum_{i=1}^K \frac{n_i}{n} = 1$. ვარიანტების შესაბამისი ფარდობითი სიხშირეთა ჯამი ერთის ტოლია.

მაგალითი 2.8. უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ჯგუფის 10 სტუდენტს ჩაუტარეს ორმნიშვნელობიანი გამოკითხვა (იგულისხმება, რომ გამოკითხვის ყოველ შედეგს აქვს ერთი თვისებრივი ნიშანი ორი დონით: A - სტუდენტი სპორტსმენია, ან მისი უარყოფა \bar{A} - სტუდენტი არაა სპორტსმენი. დაკვირვების შედეგები მოცემულია შემდეგი ცხრილის სახით.

ცხრილი 2.10.

გამოკითხული სტუდენტის რიგითი ნომერი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
დონე A სპორტსმენია \bar{A} არაა სპორტსმენი	\bar{A}	A	A	\bar{A}	A	\bar{A}	A	A	\bar{A}	A

დავაჯგუფოთ ეს მონაცემები მახასიათებელი ნიშნის დონეების მიხედვით და ჩავწეროთ სიხშირეთა განაწილების ცხრილის სახით. მივიღებთ:

ცხრილი 2.11.

დონე	A (სპორტსმენია)	\bar{A} არაა სპორტსმენი	Σ ჯამი
სიხშირე	6	4	n=10
ფარდობითი სიხშირე	0,6	0,4	1
პროცენტული	60%	40%	100%

დავალება: სიხშირეთა, ფარდობით სიხშირეთა და პროცენტული განაწილებები თვალსაჩინოებისათვის წარმოვადგინოთ მართკუთხედებიანი სვეტოვანი დიაგრამების (პარეტოს დიაგრამის) სახით და წრიული დიაგრამის სახით.


ამოხსნა

პარეტოს დიაგრამის აბეზა.

I ეტაპი. დავალაგოთ მონაცემები სიხშირეების (ფარდობითი სიხშირეების) მიხედვით ზრდადი ან კლებადი თანმიმდევრობით (იხ. ცხრილი 1.7).

II ეტაპი. საკოორდინატო სიბრტყეზე ავიღოთ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ღერძები. ჰორიზონტალურ ღერძზე მოვნიშნოთ ასაგები მართკუთხედების მცირე გვერდები დონის მონიშვნით. ხოლო ვერტიკალურ ღერძზე მოვნიშნოთ შესაბამისი სიხშირის ან ფარდობითი სიხშირის სიდიდე. შესაბამისად პროპორციები უნდა შეირჩეს და მონიშნულ ფუძეებზე ავაგოთ სიხშირის (ფარდობითი სიხშირის) სათანადო სიმაღლის მართკუთხედები.

მართკუთხედები უნდა იყოს ტოლი სიგანის. მართკუთხოვან დიაგრამას სვეტოვან დიაგრამასაც უწოდებენ.



პარეტოს დიაგრამა (დონეთა სიხშირეების განაწილება). ნახ. 2.3.

წრიული დიაგრამის აბეჯა


წრიული დიაგრამის ასაგებად ჯერ ვპოულობთ დონეთა შესაბამის პროცენტულ განაწილებას და წრეს დაეყოფთ პროცენტების პროპორციულ სექტორებად. ჯერ უნდა ვიპოვოთ შესაბამისი ცენტრალური კუთხეები. ამისათვის 360° გავამრავლოთ შესაბამის პროცენტზე და გავყოთ 100-ზე.

ცხრილი 2.12.

დონე	A	\bar{A}	ჯამი
პროცენტული წილი	60%	40%	100%

$$\frac{360^\circ \cdot 60}{100} = 216^\circ, \quad \frac{360^\circ \cdot 40}{100} = 144^\circ$$

წრიულ დიაგრამას ექნება სახე:




ნახ. 2.4. სპორტსმენი 60% (დონე A),
არასპორტსმენი 40% (დონე \bar{A}).

ზოგჯერ წრიულ დიაგრამებს მოცულობით სახეს აძლევენ:



ნახ. 2.5 სპორტსმენი 60 % (დონე A),
არასპორტსმენი 40% (დონე \bar{A})


მაგალითი 2.9. ნახ.2.6.-ით მოცემულია საფერავის ჯიშის სუფრის წითელ ღვინოში სხვადასხვა ნივთიერებების კონცენტრაციის დონეები მოცულობითი სვეტოვანი დიაგრამის სახით. I დასაშვები და II ნიმუშიდან აღებული თითოეული ნივთიერებისთვის იანგარიშეთ სხვაობები. იპოვეთ მოდალური გადახრა.



მოცულობითი სვეტოვანი დიაგრამა ნახ. 2.6.

საზოგადოებრივი ღია ბრუნვის აბეზა

მაგალითი 2.10. ავადმყოფს ტემპერატურა გაუზომეს 20 საათზე, თერმომეტრმა 40,50 აჩვენა, ექიმმა ავადმყოფს დაუნიშნა წამლები და მედდას დაავალა ტემპერატურის ყოველ 2 საათში ერთხელ გაზომვა - დილის 6 საათიდან 24 საათამდე ჩათვლით. გაზომვებით მიღებული მონაცემების შესაბამისი საზოგადოებრივი დიაგრამა ასე გამოიყურება:




ნახ. 2.7. ტემპერატურის გაზომვის დრო (სთ-ში)

- ა) როდის ჰქონდა ავადმყოფს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა? რამდენი?
- ბ) რამდენი საათის შემდეგ დაიწყო გამოჯანმრთელების პროცესი?
- გ) რამდენჯერ გაუზომეს ტემპერატურა ავადმყოფს?
- დ) დიაგრამაზე წარმოდგენილი მონაცემები (ტემპერატურები) დააღებთ ტემპერატურის კლებადობის მიხედვით და იპოვეთ: მედიანა, დიაპაზონი და მოდა. რამდენი მოდა აქვს?

მაგალითი 2.11. ქვემოთ მოცემულია დაუსრულებელი ცხრილი და მესერული დიაგრამა, რომლებიც ასახავენ ერთიდაიგივე აკადემიური ჯგუფის სტუდენტთა რაოდენობებს სემესტრში გაცდენილი დღეების მიხედვით:

ცხრილი 2.13.

გაცდენილი დღეები	ერთეულები	სტუდენტთა რაოდენობა (სიხშირე)
0		2
1		6
2		
3		
4		
5		
6		0
7		
სულ		



ნახ. 2.8.

დაასრულეთ თითოეული მათგანი და უპასუხეთ კითხვებს:

თუ გაცდენების რაოდენობების მიხედვით სტუდენტებს დავანაწილებთ ჯგუფებად, მაშინ

ა) სტუდენტთა რამდენ ჯგუფს აქვს ტოლი რაოდენობის გაცდენები?

ბ) გაცდენილი დღეების მიხედვით სტუდენტთა რომელი ჯგუფია მრავალრიცხოვანი?

გ) სტუდენტთა რომელი ჯგუფის ხვედრითი წილია მეტი საერთო გაცდენებში?

დ) რა საშუალებით შეიძლება ყოფილიყო მოპოვებული ზემოთ მოყვანილი მონაცემები?

§4. მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები. შემჩვევის რიცხვითი მახასიათებლები

მონაცემების თვალსაჩინო ვიზუალური წარმოდგენის გარდა მონაცემების ანალიზისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სხვადასხვა რიცხვითი მახასიათებლების პოვნა. როგორცაა: ა) მონაცემთა ცენტრალური ტენდენციის საზომები: მოდა (Mode), მედიანა (Median), საშუალო (Mean), ბ) მონაცემთა გაფანტულობის საზომები (Measures of dispersion), გაბნევის დიაპაზონი (Range), საშუალო გადახრა (Mean deviation), დისპერსია (Variance), თვისებრივი ვარიაციის ინდექსი (IQV), სტანდარტული გადახრა (Standard deviation).

ზოგიერთი მათგანი კერძოდ გაბნევის დიაპაზონი, მოდა, მედიანა რიცხვითი მონაცემებისათვის წინა პარაგრაფებში განვიხილეთ.

ა) ცენტრალური ტენდენციის საზომები

მოდა (Mo) წარმოადგენს შესასწავლი ცვლადის იმ მნიშვნელობას, ანუ იმ მონაცემს, რომელსაც ყველაზე ხშირად ირჩევენ რესპონდენტები, ანუ რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი სიხშირე. **მოდა შეიძლება ვიპოვოთ ნებისმიერი გაზომვის დონის მქონე ცვლადისათვის.**

იმისათვის, რომ ვიპოვოთ მოდა, უნდა ავაგოთ სიხშირეთა განაწილება და მასზე დაყრდნობით განვსაზღვროთ ის მონაცემი ან კატეგორიები, რომელთაც აქვთ უდიდესი სიხშირე. საზოგადოდ თითოეულ ცვლადს შეიძლება ჰქონდეს ერთი მოდა, როცა მხოლოდ ერთ კატეგორიას აქვს ყველაზე დიდი სიხშირე; ორი ან მეტი მოდა, როცა ორ ან რამოდენიმე კატეგორიას აქვს ერთნაირი დანარჩენ კატეგორიებზე მეტი სიხშირე; ცვლადს შეიძლება მოდა არ გააჩნდეს, როცა ყველა კატეგორიას აქვს ერთნაირი სიხშირე.

მედიანა (Me) წარმოადგენს იმ მონაცემს, რომელზე მეტი და ნაკლები მონაცემების რაოდენობა ერთნაირია. მედიანა არის ცვლადის შესაბამისი მონაცემების 50-პროცენტილი. მედიანა შეიძლება განისაზღვროს რიცხვითი მონაცემებისათვის.

მონაცემების მედიანის მოსაძებნად შესაბამისი მონაცემები ჯერ უნდა დავალაგოთ არაკლებადი მიმდევრობით, ანუ უნდა ავაგოთ მონაცემთა ვარიაციული მწკრივი. შემდეგ, თუ ცვლადის შესაბამისი მონაცემების რაოდენობა კენტია, მაშინ მედიანა $(n+1)/2$ ნომრის მქონე მონაცემის ტოლი იქნება, სადაც n არის მონაცემების რაოდენობა. თუკი რიცხვითი ცვლადის შესაბამისი მონაცემების რაოდენობა ლუწია, მაშინ უნდა განვიხილოთ $n/2$ და $\frac{n}{2}+1$ ნომრის მქონე მონაცემები, რომელთა არითმეტიკული საშუალოს ტოლია მედიანა.

არითმეტიკული საშუალო \bar{x} წარმოადგენს ცენტრალური ტენდენციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საზომს, რომელიც გამოითვლება რიცხვითი

ცვლადებისათვის და უდრის მონაცემთა ჯამის მათ რაოდენობასთან ფარდობას, ე.ი.

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \quad \text{სადაც } n \text{ მონაცემთა}$$

მოცულობაა.

შევნიშნოთ, რომ თუ განვიხილავთ შესაბამისად მონაცემებისა და მათი არითმეტიკული საშუალოს სხვაობებს, მაშინ მათი ჯამი ტოლი იქნება ნულის, ე.ი. საშუალოდან გადახრების ჯამი ნულის ტოლია.

იმ შემთხვევაში, როცა ცვლადის შესაბამისი მონაცემები დაჯგუფებულია და მოცემულია თითოეული კატეგორიის სიხშირე, მაშინ საშუალო შეიძლება გამოვთვალოთ შემდეგი ფორმულის გამოყენებით.

$$\bar{X} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + x_3 n_3 + \dots + x_k n_k}{n} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{n}$$

სადაც n_i წარმოადგენს i -ური x_i მნიშვნელობის სიხშირეს, ხოლო x_1, x_2, \dots, x_k კი ცვლადის განსხვავებული მნიშვნელობებია (მონაცემებია).

შევნიშნოთ, რომ მედიანა და მოდა წარმოადგენენ ცენტრალური ტენდენციის ისეთ საზომებს, რომლებზეც არ ახდენენ გავლენას განსაკუთრებული ანუ ძალიან დიდი ან ძალიან მცირე მონაცემები, მაშინ როცა არითმეტიკულ საშუალოზე დიდ გავლენას ახდენენ ამ ტიპის მონაცემები.

ამავე დროს უნდა აღვნიშნოთ, რომ თუ განვიხილავთ სხვადასხვა შერჩევებს, არითმეტიკული საშუალო არის ცენტრალური ტენდენციის ერთ-ერთი ყველაზე მდგრადი საზომი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოპულაციის საშუალოდან შერჩევების საშუალოს აბსოლუტური გადახრების საშუალო საზოგადოდ უფრო მცირეა, ვიდრე მედიანისა და მოდასათვის.

განაწილებას ეწოდება უნიმოდალური, თუ მას აქვს ერთადერთი მოდა.

განაწილებას ეწოდება სიმეტრიული, თუ არითმეტიკულ საშუალოზე მეტი და მასზე ნაკლები მნიშვნელო-

ბების რაოდენობები ტოლია, ე.ი. როცა საშუალო უდრის მედიანას.

თუ ცვლადის მნიშვნელობების განაწილება არის იდეალურად ზარის ფორმის, ე.ი. არის სიმეტრიული, უნიმოდალური, არ არის ზემოთ ძალიან გაწევილი და არ აქვს დიდი ბოლოები, მაშინ მას ეწოდება ნორმალური განაწილება.

განაწილებას ეწოდება ასიმეტრიული, თუ საშუალო არ ემთხვევა მედიანას.

განაწილებას ეწოდება დადებითად ასიმეტრიული, თუ საშუალო მედიანაზე მეტია.

განაწილებას ეწოდება უარყოფითად ასიმეტრიული, თუ საშუალო მედიანაზე ნაკლებია.

x_1, x_2, \dots, x_n შერჩევის ცენტრალური ტენდენციის მახასიათებლები ანალოგიურად განისაზღვრება.

ბ) მონაცემთა და შერჩევის გაფანტულობის საზომები

გაფანტულობის საზომები ახასიათებენ ცენტრის ერთ-ერთი საზომის მიმართ მონაცემების განლაგების სიმჭიდროვეს.

გავიხსენოთ: გაბნევის დიაპაზონი (R) წარმოადგენს მონაცემთა გაფანტულობის საზომს, რომელიც უდიდეს და უმცირეს მონაცემებს შორის სხვაობის ტოლია.

მონაცემთა საშუალო გადახრა (MD) უდრის საშუალოდან გადახრების აბსოლუტური მნიშვნელობების საშუალოს, ე.ი.

$$MD = \frac{|x_1 - \bar{X}| + |x_2 - \bar{X}| + \dots + |x_n - \bar{X}|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{X}|}{n}$$

სადაც x_1, x_2, \dots, x_n მონაცემებია.

დისპერსია წარმოადგენს საშუალოს მიმართ მონაცემების გაფანტულობის საზომს, რომელიც მონაცემებიდან საშუალომდე მანძილების კვადრატების საშუალოს ტოლია და აღინიშნება S^2 -ით.

$$S^2 = \frac{(x_1 - \bar{X})^2 + (x_2 - \bar{X})^2 + \dots + (x_n - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n-1} - \frac{n}{n-1} (\bar{X})^2$$

სადაც n - მონაცემების რაოდენობაა, \bar{X} - საშუალოა.

სტანდარტული გადახრა (Standard deviation)
 წარმოადგენს კვადრატულ ფესვს დისპერსიიდან, ე.ი.

$$S = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n-1} - \frac{n}{n-1} (\bar{X})^2}$$

იმ შემთხვევაში, როცა შესასწავლი ცვლადისათვის მოცემულია სიხშირეთა განაწილება ანუ მონაცემები დაჯგუფებულია კატეგორიების მიხედვით, მაშინ სტანდარტული გადახრის გამოსათვლელად შეიძლება გამოვიყენოთ მოდიფიცირებული ფორმულა

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 n_i}{n-1} - \frac{n}{n-1} (\bar{X})^2}$$

სადაც x_1, x_2, \dots, x_k - განსხვავებული მონაცემებია, ხოლო n_1, n_2, \dots, n_k წარმოადგენენ ამ მონაცემების სიხშირეებს.

ცვლადისათვის, რომლის შესაბამისი მონაცემების განაწილება არის ნორმალური, ე.ი. არის სიმეტრიული და აქვს ზარისებრი ფორმა, საშუალოდან სიმეტრიულ ინტერვალში მოხვედრილი მონაცემების რაოდენობის დასადგენად შეიძლება გამოვიყენოთ შემდეგი წესი:

მონაკვეთი $[\bar{X}-S, \bar{X}+S]$ შეიცავს მონაცემთა დაახლოებით 68%;

მონაკვეთი $[\bar{X}-2S, \bar{X}+2S]$ შეიცავს მონაცემთა დაახლოებით 95%;

მონაკვეთი $[\bar{X}-3S, \bar{X}+3S]$ შეიცავს მონაცემთა დაახლოებით 99,7%,

სადაც \bar{X} არის საშუალო, ხოლო S კი სტანდარტული გადახრა.

§5. მონაცემთა რანგი. მონაცემთა დაბროვილი სიხშირეები. კუმულატა

§§5, 6, 7, 8-ის მასალა ძირითადად აღებულია წიგნიდან: თ. ბეიტრიშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, ტ. ბუაძე, დ.

კაპანაძე, მათემატიკა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, გამომცემლობა „აზრი“, თბილისი, 2007 [7].

სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებისას იყენებენ გარკვეულ მახასიათებელს, რომელსაც რანგი ეწოდება.

მაგალითი 2.12. 10 მონაწილისაგან შედგენილმა სტუდენტ ვაჟთა გუნდმა სროლაში მოიპოვა ქულები: 98, 95, 97, 100, 94, 91, 99, 96, 93, 92.

თუ ამ მონაცემებს არაკლებადი მიმდევრობით დავალაგებთ, გვექნება: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

თითოეულმა მონაწილემ განსხვავებული ქულა დააგროვა. მონაცემები არ მეორდებათ. ყველაზე ნაკლებ მონაცემს ანიჭებენ 1-ის ტოლ რანგს და ა.შ. 100-ის რანგია 10.

მაგალითი 2.13. 10 მონაწილისაგან შედგენილმა სტუდენტ გოგონათა გუნდმა სროლაში მოიპოვა ქულები: 98, 83, 99, 80, 99, 96, 100, 97, 99, 96.

დავალაგოთ ეს მონაცემები არაკლებადი მიმდევრობის სახით: 80, 83, 96, 97, 98, 99, 99, 99, 100.

წინა მაგალითის ანალოგიურად, 80 და 83-ის რანგები შესაბამისად არის 1 და 2. მაგრამ რა რანგი მივანიჭოთ თანატოლ 96 ქულებს?

ბუნებრივია ჩავთვალოთ, რომ განმეორებული მონაცემების რანგი დალაგებულ მიმდევრობაში მათი რიგითი ნომრების არითმეტიკულ საშუალოს ე.ი. 96-ის რანგი $(3+4):2=3,5$ -ის ტოლია და ა.შ. 99 –ის რანგი კი $(7+8+9):3=8$ -ის ტოლია.

მაგალითი 2.14. შეამოწმეთ შემდეგი ცხრილის სისწორე:

ცხრილი 2.14.

მონაცემები	98	83	99	80	99	96	100	97	99	96
რანგი	6	2	8	1	8	3,5	10	5	8	3,5

რანგი ეწოდება არაკლებადი მიმდევრობით დალაგებულ მონაცემთა რიგით ნომერს, თუ მონაცემები არ მეორდება, გამეორებადი მონაცემების შემთხვევაში კი ამ მიმდევრობაში მათი რიგითი ნომრების არითმეტიკულ საშუალოს.

ვთქვათ, x ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია, $x \in \mathbb{R}$. n - მონაცემთა რაოდენობაა. დაგროვილი სიხშირე) $N_n(x)$ ეწოდება ზრდადობით დალაგებულ მონაცემთა იმ მნიშვნელობების სიხშირეების ჯამს, რომლებიც მოცემულ x რიცხვზე ნაკლებნი არიან (ან არ აღემატებიან).

$\frac{N_n(x)}{n}$ ფარდობას დაგროვილი ფარდობითი სიხშირე ეწოდება.

ვიზუალური თვალსაჩინოებისათვის აგებენ დაგროვილ სიხშირეთა, ან დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა გრაფიკებს.

კუმულატას აბეზა

მაგალითი 2.15. მოცემულია საავადმყოფოს კარდეოლოგიური განყოფილების ერთ-ერთი პაციენტის არტერიული წნევის 20-ჯერ გაზომვის მონაცემები:

ცხრილი 2.15.

გაზომვის №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
წნევის განაზომი მნიშვნელობა	170	140	150	180	178	160	155	150	170	160

გაზომვის №	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
წნევის განაზომი მნიშვნელობა	155	165	175	160	175	165	175	170	165	165

დავალაგოთ მონაცემები არაკლებადი მიმდევრობის სახით:

140, 150, 150, 155, 155, 160, 160, 160, 165, 165, 165, 165, 170, 170, 170, 175, 175, 175, 178, 180.

საიდანაც მივიღებთ ზრდადი მიმდევრობით დალაგებულ მონაცემებს შესაბამისი სიხშირეებით:

x_i : 140, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 178, 180.

n_i : 1 2 2 3 4 3 3 1 1 $n = \sum_{i=1}^n n_i = 20$

შევადგინოთ მონაცემთა სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა განაწილების შემდეგი ცხრილი

ცხრილი 2.16.


დალაგებული მონაცემები X_i	140	150	155	160	165	170	175	178	180	ჯამი
სიხშირე n_i	1	2	2	3	4	3	3	1	1	$n=20$
ფარდობითი სიხშირე n_i/n	0,05	0,1	0,1	0,15	0,2	0,15	0,15	0,05	0,05	1
დაგროვილი სიხშირე $N_n(x)$	0	1	3	5	8	12	15	18	19	20
დაგროვილი ფარდობითი სიხშირე $N_n(x) \setminus n$	0	0.05	0.15	0.25	0.40	0.60	0.75	0.90	0.95	1

ამ ცხრილის მეოთხე სტრიქონი შემდეგი წესითაა მიღებული:

უმცირესი $X_1=140$ მონაცემამდე დაგროვილი სიხშირეა 0; $X_1=140$ -სათვის დაგროვილი სიხშირეა $0+1=1$; ფარდობითი სიხშირეა $1/20=0,05$; $X_2=150$ -სათვის დაგროვილი სიხშირეა $0+1=2$, დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეა $2/20=0,05$.

ცხრილის მეხუთე სტრიქონი მიიღება ზედა სტრიქონის რიცხვების გაყოფით $n=20$ -ზე.

მონაცემთა სიხშირეები შეგვიძლია დაგვეთვალოს ფორმულიანი ღეროების დიაგრამით:




აგაგოთ მონაცემთა დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეების შესაბამისი დიაგრამა (კუმულატა) შემდეგი წესით:

- სიბრტყეზე აღებული კოორდინატთა სისტემის აბსცისათა ღერძზე მოვნიშნოთ ვარიაციულ მწკრივად, ზრდადი მიმდევრობით დალაგებული მონაცემების შესაბამისი წერტილები. ღერძი დაიყოფა ინტერვალებად.
- ორდინატთა ღერძზე მოვნიშნოთ მიღებული დაყოფის ინტერვალების მარჯვენა საზღვრითი მონაცემებისა-

თვის დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეების შესაბამისი წერტილები გარკვეული მასშტაბით (გარდა კიდურა მარჯვენა უსასრულო ინტერვალისა).

- დაყოფის ინტერვალს მისი მარჯვენა საზღვრითი მონაცემი არ მივაკუთვნოთ და აბსცისათა ღერძის პარალელურად თითოეული ინტერვალისათვის ავაგოთ მონაკვეთი, რომლის წერტილთა ორდინატები ინტერვალზე დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეების ტოლია.
- მიიღება კიბისებური საფეხურებიანი გრაფიკი, რომელსაც **კუმულატას უწოდებენ**. იგი ასახავს ინფორმაციას დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების შესახებ.
- თუ მონაცემთა რაოდენობა და დაყოფის ინტერვალების რაოდენობა დიდია, მაშინ კუმულატა გარკვეულწილად მრუდის მიახლოებას წარმოადგენს.



ნახ.2.9.

კითხვები განმეორებისათვის

1. მონაცემის რანგი წარმოადგენს:

- ა) შუა მონაცემის ნომერს
- ბ) მონაცემების კოზიციის მახასიათებელს
- გ) დიდი სიხშირის მქონე მონაცემის ნომერს.

2. რა არის მონაცემის სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე?

3. თვალსაჩინოდ როგორ შეიძლება წარმოვადგინოთ მონაცემთა სიხშირეები და ფარდობითი სიხშირეების განაწილება?

4. რას წარმოადგენს მონაცემთა დაგროვილი სიხშირეები?

5. როგორ შეიძლება წარმოვადგინოთ მონაცემთა დაგროვილი სიხშირეების განაწილება?

6. კუმულატას ასაგებად მონაცემები ზრადობის მიხედვით უნდა დალაგდეს თუ კლებადობის მიხედვით?

მაგალითი 2.16. მოცემული ცხრილი 2.17. გვიჩვენებს 10 კომერციული ბანკის აქტივებისა და წლიური მოგების მონაცემებს. ცხრილში თითოეულ ბანკს აქვს კოდური სახელწოდება, ნომრებით 1, 2, 3,... 10.

ცხრილი 2.17.

ბანკის №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
აქტივები (მლნ.ლარი)	10	15	20	25	30	30	50	60	70	80
წლიური მოგება (მლნ. ლარი)	0,5	0,5	0,7	0,6	0,7	1,3	1,0	1,3	1,5	2,0

გამოთვალეთ:

- ა) აქტივების შესაბამისი რანგები.
- ბ) წლიურ მოგებათა შესაბამისი რანგები.
- გ) ფარდობითი წლიური მოგება ანუ წლიური მოგება გაყოფილია აქტივების სიდიდეზე და მიღებული მონაცემთა რანგები. რანგების მიხედვით შეადარეთ ბანკების ეფექტურობა.

მაგალითი 2.17. მაგალითი 2.15-ის მონაცემებისათვის გამოთვალეთ რანგები.

მაგალითი 2.18. თვეების მიხედვით, თბილისში უცხოეთიდან შემოსულ ტურისტთა რაოდენობები მოცემულია შემდეგი ცხრილით (1:1000):

ოვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ტურისტთა რაოდენობა	1	0,5	1,5	2	3	3	2	0,5	2	2,5	2	0,5

ა) შეადგინეთ დაგროვილ სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

ბ) დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა ცხრილი.

გ) ააგეთ კუმულატა.

დ) იპოვეთ მონაცემთა რანგები.

დავალება განმეორებისათვის

მაგალითი 2.19. ფირმის მენეჯერი იკვლევს პორტატული კომპიუტერის ბატარეების ექსპლოატაციის ხანგრძლივობას. ქვემოთ მოცემულია მის მიერ აღაღებედზე შერჩეულ „A“ ტიპის 40 ბატარეაზე დაკვირვების მონაცემები (წთ-ში):

130 146 126 145 152 132 130 164 155 133

129 145 137 139 127 140 131 126 145 148

126 126 132 125 126 135 131 129 136 129

136 147 156 146 130 146 132 132 142 132

ა) ააგეთ ფოთლებიანი ღეროების დიაგრამა, რომლის ღეროებად პირველი ორი ციფრია გამოუყენებელი, დანარჩენები ფოთლებად.

ბ) დაალაგეთ ფოთლებად გამოყენებული ციფრები არაკლებად მიმდევრობად და დაწერეთ მონაცემების ფარდობით სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

გ) ააგეთ კუმულატა.

დ) გამოთვალეთ მონაცემთა რანგები.

ე) იპოვეთ ცენტრალური ტენდენციის საზომები.

ვ) იპოვეთ გაფანტულობის საზომები.

§ 6. რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება ინტერვალებად

იმ შემთხვევაში, როდესაც X ცვლადის დაკვირვებით მიღებული მონაცემთა რაოდენობა დიდია, ან ცვლადი უწყვეტია, შემდგომი ანალიზის მიზნით მიმართავენ მონაცემთა დაჯგუფებას ქვეინტერვალებად მითითებული წესით:

1. მონაცემებს ალაგებენ ზრდადობის მიხედვით;
2. მინიმალურ და მაქსიმალურ მონაცემს შორის ინტერვალს ყოფენ ტოლი ან არატოლი სიგრძის რამოდენიმე ქვეინტერვალად; ჯერ განვიხილავთ ტოლი სიგრძის ინტერვალებად დაყოფას.
3. გამოყოფენ ცალკეულ ქვეინტერვალში მოთავსებულ მონაცემთა ჯგუფებს;
4. დაითვლიან თითოეული ჯგუფის მონაცემების სიხშირეებსა და ფარდობით სიხშირეებს და ადგენენ მონაცემების სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა ინტერვალური განაწილების ცხრილს - სიხშირეთა ინტერვალურ განაწილებებს.
5. ქვეინტერვალების კიდურა მონაცემებისათვის გამოთვლიან დაგროვილ სიხშირეებს, დაგროვილ ფარდობით სიხშირეებს; მარჯვენა კიდურა მონაცემების მიხედვით ადგენენ მონაცემთა დაგროვილი სიხშირეებისა და დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეების ინტერვალური განაწილებების ცხრილს - დაგროვილ სიხშირეთა ინტერვალურ განაწილებებს.
6. სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) და დაგროვილ სიხშირეთა (დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა) განაწილებებს თვალსაჩინოდ წარმოადგენენ სხვადასხვა გრაფიკული ფორმით.

აღნიშნული მეთოდი აადვილებს ინფორმაციის აღქმასა და ანალიზს.

მონაცემის ინტერვალებად (ანუ კლასებად) დაჯგუფებისას, ასევე ჰისტოგრამების აგებისას არსებითი მნიშვნელობა აქვს ინტერვალთა რაოდენობის სწორად შერჩევას. ინტერვალების რაოდენობა არ უნდა იყოს 1) ძალიან დიდი და 2) არც ძალიან მცირე. პირველ შემთხვევაში ინტერვალების სიგრძეები ხდებიან მცირე და

მონაცემთა სიხშირეები მასში განიცდიან არაკანონზომიერ ცვალებადობას (ფლუქტაციას), მეორე შემთხვევაში ინტერვალების სიგრძეები დიდია და სიხშირეთა განაწილებები აღიწერებიან ძალიან უხეშად.

პრაქტიკით დადგენილია, რომ თუ მონაცემების რაოდენობა $n \in (40-100)$, მიზანშეწონილია 7-9 ინტერვალის არჩევა, როცა $n \in (100-500)$, მიზანშეწონილია 8-12 ინტერვალი, ხოლო როცა $n \in (500-1000)$ – 10-16 ინტერვალი.

ვთქვათ X ცვლადია. მასზე დაკვირვების მონაცემების მიხედვით x_{\min} არის უმცირესი მონაცემი, ხოლო x_{\max} - უდიდესი მონაცემი. n მონაცემთა რაოდენობაა, აღწერილი მეთოდით n -ის მიხედვით ვთქვათ საჭიროა ავიღოთ k ინტერვალი. მაშინ ინტერვალის სიგრძე h გამოითვლება ფორმულით

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k}$$

მონაცემთა ინტერვალებად დასაჯგუფებლად და ჰისტოგრამების ასაგებად ასევე ხშირად მიმართავენ სხვადასხვა მეთოდებს. ერთ-ერთია **სტერ-ჯერსის ფორმულის** გამოყენება. სტატისტიკური მონაცემების დაჯგუფებისას ჯგუფების ოპტიმალური k რაოდენობის განსაზღვრის **სტერჯესის ფორმულას** აქვს სახე:

$$k = 1 + 3,2 \log n,$$

სადაც n მონაცემთა მოცულობაა.

ამჟამად შემოგთავაზებთ მონაცემების ინტუიციურ დაყოფას კლასებად.

მაგალითი 2.20. წინა პარაგრაფის მაგალითით 2.15-ის მიხედვით პაციენტის არტერიული წნევის გაზომვით მიღებული მონაცემების ცვლილების არე დავეოთ 5 ტოლი სიგრძის ქვეინტერვალად. შევადგინოთ სიხშირეთა, დაგროვილ სიხშირეთა და დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა ინტერვალური განაწილებები და ავაგოთ დიაგრამები.


1. საწყისი მონაცემებია:

170, 140, 150, 180, 178, 160, 155, 150, 170, 160, 155, 165, 175, 160, 175, 165, 175, 170, 165, 165

დავალაგოთ არაკლებადი მიმდევრობით:

140, 150, 150, 155, 155, 160, 160, 160, 165, 165, 165, 165, 170, 170, 170, 175, 175, 175, 178, 180.

2. მონაცემთა ცვლილების დიაპაზონი $x_{\max}-x_{\min}=180-140=40$ -ის ტოლია. რადგან დაყოფის ინტერვალების რაოდენობა $k=5$ -ია, ამიტომ თითოეული ქვეინტერვალის სიგრძე $h=40/5=8$. დაყოფა მოხდება შემდეგი სქემით:



3. ინტერვალში გამოყოფით მონაცემთა ჯგუფებს

140, 150, 150, 155, 155, 160, 160, 160, 165, 165, 165, 165, 170, 170, 170, 175, 175, 175, 178, 180

უმცროსი კიდურა მონაცემი 140 მივაკუთვნოთ პირველ ქვეინტერვალს.

4. ქვეინტერვალების მიხედვით სიხშირეთა გამოთვლის შედეგები მოცემულია შემდეგი ცხრილით:
- 5.

ცხრილი 2.19.

ინტერვალის ნომერი	ინტერვალი	სიხშირეთა დათვლა	სიხშირე
1	[140; 148]		1
2	[148; 156]		4
3	[156; 164]		3
4	[164; 172]		7
5	[172; 180]		5
სულ			$n=20$

დაჯგუფებულ მონაცემთა ფარდობითი სიხშირეები შესაბამისად ტოლია:

პირველი ინტერვალისათვის $1/20=0,05$

მეორე ინტერვალისათვის $4/20=0,2$

მესამე ინტერვალისათვის $3/20=0,15$

მეოთხე ინტერვალისათვის $7/20=0,35$

მეხუთე ინტერვალისათვის $5/20=0,25$

სიხშირეთა ინტერვალური განაწილება:

ცხრილი 2.20

ინტერვალის ნომერი	ინტერვალი	ინტერვალში მონაცემების სიხშირეთა დათვლა	მონაცემთა ფარდობითი სიხშირე ინტერვალში
1	[140; 148]	1	0,05
2	[148; 156]	4	0,2
3	[156; 164]	3	0,15
4	[164; 172]	7	0,35
5	[172; 180]	5	0,25
ჯამი		n=20	1

5. ქვეინტერვალების კიდურა მონაცემებისათვის გამოთვლილი დაგროვილი $\tilde{N}_n(x)$ სიხშირეები ტოლია (n=20):

$$x=140, \quad \tilde{N}_{20}(140)=0; \quad x=148, \quad \tilde{N}_{20}(148)=0+1=1$$

$$x=156, \quad \tilde{N}_{20}(156)=1+4=5; \quad x=164, \quad \tilde{N}_{20}(164)=8$$

$$x=172, \quad \tilde{N}_{20}(172)=15; \quad x=180, \quad \tilde{N}_{20}(180)=20$$

მიღებული შედეგების მიხედვით გამოთვლილი დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეები შესაბამისად ტოლია: 0-ის; 0,05-ის; 0,25-ის; 0,4-ის; 0,75-ის; 1-ის.

დაგროვილ სიხშირეთა განაწილებაა:

ცხრილი 2.21

ინტერვალის ნომერი	ინტერვალი	დაგროვილი სიხშირე	დაგროვილი ფარდობითი სიხშირე
1	[140; 148]	1	0,05
2	[148; 156]	5	0,25
3	[156; 164]	8	0,4
4	[164; 172]	15	0,75
5	[172; 180]	20	1

მაგალითი 2.21. თუ ზემოთ განხილულ მაგალითში მონაცემთა დაჯგუფება მოხდება 8 ინტერვალად:

ა) რისი ტოლი იქნება ქვეინტერვალის სიგრძე და დაყოფის რა ქვეინტერვალები მიიღება?

ბ) გამოითვალეთ ქვეინტერვალში მონაცემთა სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე, მონაცემთა დაგროვილი სიხშირეები და დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეები.


გ) როგორ შეამოწმებთ, რომ დაჯგუფებული მონაცემებისათვის სიხშირეები და ფარდობითი სიხშირეები სწორადაა ჩაწერილი?

**§7. დაჯგუფებული მონაცემების სიხშირეთა
ბრაზიკული წარმოდგენა. ჰისტოგრამა. ობივსა.
პოლიგონი. მოდალური ინტერვალი**

ა) ჰისტოგრამის აბეზა.

ჰისტოგრამა – წარმოადგენს ქვეინტერვალებზე აშენებულ მართკუთხედებს, რომელთა სიმაღლეები შესაბამისად მითითებულ ქვეინტერვალის მონაცემთა სიხშირის (ფარდობითი სიხშირის) ინტერვალის სიგრძეზე განაყოფის ტოლია.

სიხშირეთა ჰისტოგრამას არტერიული სისტოლური წნევისათვის აქვს შემდეგი სახე:



ქვეინტერვალები

ნახ. 2.10

ინტერვალის სიგრძე $n=8$, სიმაღლეებია: 0,125; 0,5; 0,375; 0,875; 0,625.

ქვეინტერვალს, რომლის მონაცემთა სიხშირე ყველაზე მეტია, მოდალური ინტერვალი ეწოდება. ჩვენს მაგალითში მოდალური ინტერვალია 164-172.


ბ) ობივსას აბეზა

ოვივა საკოორდინატო სიბრტყის იმ წერტილების შემაერთებელი ტეხილია, რომელთა აბსცისები ქვეინტერვალების მარცხენა საზღვრებია, ორდინატები კი – შესაბამისი დაგროვილი სიხშირეები (ან ფარდობითი სიხშირეები).

დაგროვილი ფარდობითი სიხშირეებისათვის აგებული ოგოვა ნახ. 2.11 -ით მოცემული მრუდისაგან მხოლოდ მასშტაბით განსხვავდება.

ჩვენს მაგალითში დაგროვილი სიხშირეების მიხედვით აგებულ ოგოვას ასეთი სახე აქვს:

ბ) სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) პოლიგონის აბეზა




ნახ. 2.11

დაგროვილ სიხშირეთა ოგოვა

პოლიგონი საკოორდინატო სიბრტყის იმ წერტილების შემადგენელი ტეხილია, რომელთა აბსცისები ქვეინტერვალების შუა წერტილებია, ორდინატები კი შესაბამისი სიხშირეები ან ფარდობითი სიხშირეები. ამასთან, ტეხილის ბოლოები შეერთებულია აბსცისათა ღერძის იმ წერტილებთან, რომლებიც პირველი და ბოლო ქვეინტერვალის შუა წერტილებიდან დაშორებულია ქვეინტერვალის სიგრძით (შესაბამისად მარცხნივ და მარჯვნივ).

გავიხსენოთ, რომ (a,b) ინტერვალის შუა წერტილი გამოითვლება ფორმულით: $a+b/2$.



ქვეინტერვალები ნახ. 2.12

სიხშირეთა პოლიგონი არტერიული წნევისათვის. ინტერვალის სიგრძე $h=8$, სიმაღლეებია: 0,125; 0,5; 0,375; 0,875; 0,625.

ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა საშუალებას იძლევა ვიზუალურად შეფასდეს სტატისტიკური მონაცემების ფარდობით სიხშირეთა „განაწილების კანონი“.

კითხვები განმეორებისათვის

1. რა არის ჰისტოგრამა? როგორი მონაცემებისთვის აიგება ჰისტოგრამა?
2. რამდენი სახის ჰისტოგრამა შეიძლება აიგოს ერთი და იგივე მონაცემებისათვის?
3. რას წარმოადგენს ოგივა?
4. რა არის პოლიგონი? აღწერეთ პოლიგონის აგების სქემა.

შეენიშნოთ, რომ გარეგნული მსგავსების მიუხედავად, სვეტოვან დიაგრამასა და ჰისტოგრამას შორის არის არსებითი განსხვავება. სვეტოვანი დიაგრამის სვეტებს შორის შეიძლება იყოს ადგილები, სვეტების ფუძეების შესაბამის ღერძზე წარწერები უბრალოდ აღნიშნავენ ცვლადის კატეგორიებს, ხოლო მათ მიმდევრობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. ჰისტოგრამის სვეტებს შორის არ არის ადგილები და ფუძეების შესაბამის ღერძზე მონიშნულია უწყვეტი რიცხვითი ცვლადის მნიშვნელობები, რომლებიც მთლიანად უნდა მოიცავდნენ უწყვეტი ცვლადის შესაძლო ცვლილების მთელ დიაპაზონს.

მაგალითი 2.22. იხ.[11] ცხრილში 2.22 მოცემულია 60 ერთტიპური მონ- სტრუქტურის დიელექტრიკული ფენების გამრღვევი ძაბვის გაზომვის შედეგები, რომლებიც ფიქსირებულია სახომ დანადგარზე მათი შემოსვლის თანმიმდევრობით.

60 ერთტიპური მონ სტრუქტურის დიელექტრიკული ფენების გამრღვევი ძაბვა ვოლტებში

ცხრილი 2.22

153	158	161	168	165	161	164	168	173	163
150	159	163	165	168	171	151	161	163	171
161	155	157	161	163	167	172	158	162	166
157	156	160	164	162	166	169	172	152	158
162	167	170	154	157	160	159	155	162	171
170	162	154	156	160	166	159	165	160	169

დააჯგუფეთ მონაცემები ინტერვალებად. ჩაწერეთ სიხშირეთა ინტერვალური განაწილების ცხრილი და ააგეთ სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამა, ოგევა, პოლიგონი.

აღმოაჩინე შეცდომები:

ა) $h = \frac{170 - 130}{8} = 5$


ბ) 60 ერთტიპური მონ-სტრუქტურის დიელექტრიკული ფენების გამრღვევი ძაბვის სიხშირეთა ინტერვალური განაწილება

ცხრილი 2.23.

ინტერვალის (კლასის) №	ინტერვალი		მონაცემები	სიხშირე, m_i
	\geq	$<$		
1	130	153		3
2	153	156		5
3	156	159		8
4	159	162		12
5	162	165		11
6	165	168		8
7	168	171		7
8	172	174		6

$\sum m_i = 60$

ბ)



ნახ. 2.13 გამრღვევი ძაბვის ჰისტოგრამა

მაგალითი 2.23 . მოცემულია 100 მაღაზიაში ტელევიზორების გაყიდვის მონაცემები

ცხრილი 2.24.

გაყიდული ტელევიზორების რაოდენობა	მაღაზიების რაოდენობა
[100; 200]	0
[200; 300]	5
[300; 400]	39
[400; 500]	31
[500; 600]	16
[600; 700]	6
[700; 800]	3

ამ მონაცემების მიხედვით შეასრულეთ შემდეგი სავარჯიშოები:

1. შეადგინეთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

2. შეადგინეთ დაგროვილ სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

3. შეადგინეთ დაგროვილი ფარდობით სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

4. ააგეთ სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამები.

5. ააგეთ სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა პოლიგონები.

6. ააგეთ დაგროვილ სიხშირეთა ოჯივა და დაგროვილ ფარდობით სიხშირეთა ოჯივა.

7. ააგეთ დაგროვილი ფარდობით სიხშირეთა გრაფიკი (კუმულატა).

§8. რიცხვითი მახასიათებლები დაჯგუფებული მონაცემებისათვის.

სიხშირეთა განაწილების ტიპობრივი ფორმები

რიცხვითი მახასიათებლების განსაზღვრა დაჯგუფებული მონაცემებისათვის ხელსაყრელია იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა რაოდენობა დიდია, ან მონაცემთა მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ დაჯგუფებული სახით და ამავე დროს გვაკმაყოფილებს მიღებული მიახლოებითი პასუხის სიზუსტე.

მაგალითი 2.24. ცხრილით მოცემულია ფირმის ოფისის ერთ-ერთი ტელეფონიდან ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად განხორციელებული საერთაშორისო სატელეფონო საუბრების დრო (წუთებში):


6,2 11,2 10,4 6,8 5,5 6,1
 15,3 12,3 8,5 2,3 18,7 8,8
 10,2 8,0 11,4 13,5 9,6 19,5
 8,9 9,1 7,7 15,9 12,1 11,7
 11,8 3,6 16,6 7,2 4,8 14,5

დავაჯგუფოთ მონაცემები ტოლი სიგრძის ქვეინტერვალებად (კლასებად). უმცირესი მონაცემია 2,3; უდიდესია 19,5. 2,3 დავამრგვალოთ მთელამდე ნაკლებობით, ხოლო 19,5 მეტობით (მონაცემთა დიაპაზონი გაიზრდება მთელამდე სიზუსტით) (2,3) 2 (19,5) 20. დავყოთ მიღებული შუალედი (2;20) ექვს ტოლ ქვეინტერვალად. ინტერვალის სიგრძე:

$$h = \frac{20 - 2}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

მონაცემთა ქვეინტერვალებად (კლასებად)

დაჯგუფებისა და შესაბამისი ინტერვალური სიხშირეების დათვლის შედეგებია:



დაყოფის ინტერვალების საზღვრებია: 2 5 8 11 14 17 20. ინტერვალებში შესაბამისი n_i სიხშირეებია: 3 6 8 7 4 2. ქვეინტერვალებში მოხვედრილ მონაცემთა სიხშირეები შეიძლება დაითვალოს ფოთლებიანი ღეროების მსგავსი დიაგრამითაც.


ავაგოთ სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამა და პოლიგონი.

რადგან დაჯგუფება მოხდა ტოლი სიგრძის ქვეინტერვალებად, ამიტომ ჰისტოგრამის აგებისას დაჯგუფების ინტერვალებზე აგებული მართკუთხედების სიმაღლეებად შეგვიძლია ავიღოთ შესაბამის ინტერვალში მოხვედრილ მონაცემთა ჯამური სიხშირის განაყოფი ინტერვალის სიგრძეზე, რადგან ვაგებთ სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამას და პოლიგონს (ან ჯამური

ფარდობითი სიხშირეების განაყოფი ინტერვალის სიგრძეზე, თუ ვაგებთ ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამას ან პოლიგონს).

აგებული მართკუთხედების ფართობები შესაბამის ინტერვალში მონაცემთა სიხშირეების (ან ფარდობითი სიხშირეების) ტოლი უნდა იყოს.

სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამას აქვს შემდეგი სახე:



სატელეფონო საუბრების ხანგრძლივობა წთ-ში. ნახ. 2.15

დავალება: ააგეთ სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი და მისი ფორმა შეადარეთ აგებული ჰისტოგრამის ფორმას.

მოდალურია ის ქვეინტერვალი (კლასი), რომლის შესაბამისი დაგროვილი ფარდობით სიხშირე უდიდესია.

სიხშირეთა აგებული ჰისტოგრამა და პოლიგონი სიმეტრიული (ზარისებური) ფორმისაა. [8,11] ქვეინტერვალი წარმოადგენს მოდალურ კლასს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სატელეფონო საუბრების მაქსიმალური სიხშირე დაფიქსირდა 8 წთ-დან 11 წთ-იანი ხანგრძლივობით.

კლასებად (ქვეინტერვალებად) დაჯგუფებული მონაცემების არითმეტიკული საშუალო \bar{x} ასე გამოითვლება:

ყოველი ქვეინტერვალის „შუა წერტილი“ (შესაბამისი კოორდინატი) უნდა გავამრავლოთ ამ ქვეინტერვალში მოხვედრილ მონაცემთა სიხშირეზე, შევაჯამოთ და გავყოთ მონაცემთა რაოდენობაზე.

თუ დაყოფის i -ური ქვეინტერვალისათვის აღვნიშნავთ: „შუა წერტილს“ \tilde{x}_i -ით, მონაცემთა სიხშირეს ქვეინტერვალში კი \tilde{n}_i -ით მაშინ

$$\bar{X} = \frac{1}{n} (\tilde{n}_1 \tilde{x}_1 + \tilde{n}_2 \tilde{x}_2 + \dots + \tilde{n}_k \tilde{x}_k)$$

სადაც n არის მონაცემთა რაოდენობა, k - დაყოფის ქვეინტერვალთა რაოდენობა.

შევადგინოთ სატელეფონო საუბრების სიხშირეთა ინტერვალური განაწილების შემდეგი ცხრილი 2.25. (წთში).

ცხრილი 2.25.

ინტერვალი i	შუა წერტილი \tilde{x}_i	სიხშირე ინტერვალში \tilde{n}_i	ნამრავლი $\tilde{n}_i \tilde{x}_i$
[2; 5]	3,5	3	10,5
[5; 8]	6,5	6	39
[8; 11]	9,5	8	76
[11; 14]	12,5	7	87,5
[14; 17]	15,5	4	62
[17; 20]	18,5	2	37
ჯამი		30	312

განხილული მეთოდით გამოთვლილი არითმეტიკული საშუალოა:

$$\bar{X} = \frac{3,5 \cdot 3 + 6,5 \cdot 6 + 9,5 \cdot 8 + 12,5 \cdot 7 + 15,5 \cdot 4 + 18,5 \cdot 2}{30} = \frac{312}{30} \approx 10,4$$

ამრიგად, მითითებული სატელეფონო საუბრების საშუალო დღიური დანახარჯია 10,4 წთ.

არითმეტიკული საშუალოდან მონაცემების გაფანტულობის საზომია დისპერსია და სტანდარტული გადახრა. გამოვთვალოთ ეს მახასიათებლები დაჯგუფებული მონაცემებისათვის.

დაჯგუფებული მონაცემების დისპერსია S^2 ასე გამოითვლება:

ყოველი ქვეინტერვალის „შუა წერტილის“ კვადრატისა და ამ ინტერვალში მონაცემთა სიხშირის ნამრავ-

ლების ჯამს უნდა გამოვაკლოთ მონაცემთა მოცულობის და არითმეტიკული საშუალოს კვადრატის ნამრავლი და მიღებული შედეგი გავყოთ მონაცემთა ერთი ერთეულით შემცირებულ რაოდენობაზე.

$$S^2 = \frac{(\tilde{n}_1 \tilde{x}_1^2 + \tilde{n}_2 \tilde{x}_2^2 + \dots + \tilde{n}_k \tilde{x}_k^2) - n(\bar{X})^2}{n-1}$$

სტანდარტული გადახრა $S = \sqrt{S^2}$

გამოთვლების გასაიოლებლად შევადგინოთ შემდეგი ცხრილი 2.26:

ცხრილი 2.26.

ინტერვალი i	შუა წერტილი \tilde{x}_i	\tilde{x}_i^2	სიხშირე ინტერვალში \tilde{n}_i	$\tilde{n}_i \tilde{x}_i$	$\tilde{n}_i \tilde{x}_i^2$
[2; 5]	3,5	12,25	3	10,5	36,75
[5; 8]	6,5	42,25	6	39	253,50
[8; 11]	9,5	90,25	8	76	722
[11; 14]	12,5	156,25	7	87,5	1093,75
[14; 17]	15,5	240,25	4	62	961
[17; 20]	18,5	342,25	2	37	684,5
ჯამი			30	312	

$$S^2 = \frac{1}{30} 3 \cdot (3,5)^2 + 6 \cdot (6,5)^2 + 8 \cdot (9,5)^2 + 7 \cdot (12,5)^2 + 4 \cdot (15,5)^2 + 2 \cdot (18,5)^2 - 30 \cdot (10,4)^2 =$$

$$= \frac{1}{29} (3751,5 - 3244,8) \approx 17,47$$

$$S = \sqrt{17,47} \approx 4,18$$

განხილულ მაგალითში აღმოჩნდა, რომ არითმეტიკული საშუალო $\bar{X} \approx 10,4$ მოთავსებულია მოდალურ [8;11] ინტერვალში. ამდენად, სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი და ჰისტოგრამა სიმეტრიულია $\bar{X} \approx 10,4$ წრფის მიმართაც. ასეთ შემთხვევაში, გარკვეულ „სტანდარტულ“ ინტერვალებში მოხვედრილ მონაცემთა პროცენტული რაოდენობები შეიძლება მიახლოებით გამოითვალოს ცნობილი წესით. კერძოდ:

ა) ინტერვალი $[\bar{X} - S; \bar{X} + S]$ შეიცავს მონაცემთა 68%-ს.

ბ) ინტერვალი $[\bar{X} - 2S; \bar{X} + 2S]$ შეიცავს მონაცემთა 95%-ს.

გ) ინტერვალი $[\bar{X} - 3S; \bar{X} + 3S]$ შეიცავს მონაცემთა 99%-ს.


დ) ინტერვალი $[\bar{X}-4S; \bar{X}+4S]$ შეიცავს პრაქტიკულად ყველა მონაცემს.

საზოგადოდ, ზარისებული პოლიგონის შემთხვევაში $[\bar{X}-4S; \bar{X}+4S]$ შუალედი წარმოადგენს დაჯგუფებული მონაცემების დიაპაზონს.

ჩვენი მაგალითის შემთხვევაში $[\bar{X}-2S; \bar{X}+2S]$ არის $[2,04; 18,76]$ შუალედი. მას არ ეკუთვნის მხოლოდ ერთი 19,5-ის ტოლი მონაცემი, რაც შეადგენს 30 მონაცემის 3,3%-ს. ე.ი. ამ შუალედში აღმოჩნდა მონაცემების 96,7%, რაც თეორიულ (95%-იან) წესს მიახლოებით ეთანადება. ეს ნიშნავს, რომ სატელეფონო საუბრების ძირითადი მასა ამ შუალედშია გაბნეული. თუმცა დიაპაზონია $[\bar{X}-4S; \bar{X}+4S]$ შუალედი.


სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) ჰისტოგრამისა და პოლიგონის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ განაწილებათა ტიპობრივი ფორმები, რაც მნიშვნელოვანია შემდეგში მონაცემთა სიხშირეების განაწილებათა შედარებისას. ცხადია, პოლიგონის შესაბამისი ტეხილი (ასევე ჰისტოგრამა) მით უფრო მიიღებს მრუდის (წირის) სახეს, რაც უფრო დიდი რაოდენობის მონაცემებს და დაჯგუფებების ქვეინტერვალებს განვიხილავთ, ამასთან რაც უფრო მცირე იქნება ქვეინტერვალის სიგრძე. ამიტომ სიხშირეთა განაწილების სავარაუდო გავრცელებული ფორმები გრაფიკულად შეგვიძლია შემდეგი მრუდების (წირების) მეშვეობით წარმოვიდგინოთ:

მრუდი სიმეტრიულია. ხ მრუდი უფრო მდორედ (ნელა) იცვლება, ვიდრე a მრუდი. კიდურა მნიშვნელობები უფრო იშვიათად გვხვდება, ვიდრე შუალედური. აქვს ერთი წვერო.




ნახ. 2.17

სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) განაწილების სიმეტრიული ტიპი



ნახ. 2.18.



ნახ. 2.19.

სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) განაწილების ასიმეტრიული ტიპი

უმრავლეს შემთხვევაში უმჯობესია დაკვირვების მონაცემები თავიდანვე ჩაიწეროს სიხშირეთა ინტერვალური განაწილების (დაჯგუფებული) სახით. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მონაცემთა რაოდენობა დიდია და ძნელია ცალ-ცალკე გამოირჩეს ერთმანეთისაგან არსებითად განსხვავებული ინდივიდუალური მონაცემები.

დავალებები დამოუკიდებელი მუშაობისთვის

მაგალითი 2.25. მოცემულია მონაცემები ერთ-ერთ დიდ სავაჭრო ცენტრში საქონლის რეალიზაციით შემოსული თანხების დღეების მიხედვით განაწილების შესახებ (100 დღის განმავლობაში, 1000 ლარებში).

ცხრილი 2.27.

ინტერვალი n_i	ნავაჭრი თანხა	დღეების სიხშირე
1	[100; 200)	1
2	[200; 300)	4
3	[300; 400)	31
4	[400; 500)	38
5	[500; 600)	20
6	[600; 700)	5
7	[700; 800)	1

ა) შეადგინეთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების ცხრილი.

ბ) ააგეთ ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა და პოლიგონი.

გ) დაახასიათეთ, როგორია განაწილების ფორმა (სიმეტრიულია თუ ასიმეტრიული).

დ) იპოვეთ მოდალური შუალედი, რამდენ დღეში დაფიქსირდა ყველაზე ხშირი შემოსავლების რაოდენობა და რას შეადგენს იგი.

ე) იპოვეთ შემოსავლების არითმეტიკული საშუალო.

ვ) იპოვეთ სტანდარტული გადახრა.

ზ) თუ ჩავთვლით, რომ შესაძლებელია მონაცემთა დიაპაზონის პოვნა, იპოვეთ იგი.

კითხვები განმეორებისათვის

1. როდის იყენებენ დაჯგუფებული მონაცემების რიცხვითი მახასიათებლების განსაზღვრას.

2. ამ შემთხვევაში როგორ პასუხს ვღებულობთ ზუსტს, თუ მიახლოებითს?

3. რას წარმოადგენს მოდალური კლასი?

4. რას წარმოადგენს არითმეტიკული საშუალო დაჯგუფებული მონაცემებისათვის? როგორ გამოითვლება იგი?

5. როგორ შეიძლება გამოვთვალოთ დისპერსია და სტანდარტული გადახრა დაჯგუფებული მონაცემებისათვის.

მაგალითი 2.26. ამოწერეთ მაგალითი 2.24-ის მონაცემები და გამოთვალეთ მონაცემთა რამდენ პროცენტს შეიცავს

ა) $[\bar{X}-4S; \bar{X}+4S]$ ინტერვალი? $[\bar{X}-3S; \bar{X}+3S]$ ინტერვალი? $[\bar{X}-S; \bar{X}+S]$ ინტერვალი?

ბ) იპოვეთ მედიანა და მოდა საწყისი მონაცემებისათვის.

გ) იპოვეთ არითმეტიკული საშუალო საწყისი მონაცემებისათვის. შეადარეთ მონაცემთა დაჯგუფებით მიღებულ პასუხს.

დ) იპოვეთ სტანდარტული გადახრა საწყისი მონაცემებისათვის და შეადარეთ მონაცემთა დაჯგუფებით მიღებულ პასუხს.

მაგალითი 2.27. სასურსათო მაღაზიის მარკეტინგის კონსულტანტმა შეისწავლა 30 მყიდველის მიერ მაღაზიაში დახარჯული თანხის რაოდენობა ლარებში. დაკვირვების რიგის მიხედვით მონაცემები მოცემულია ცხრილით:

10; 5; 8; 6; 1; 7; 15; 31; 32; 35; 42; 3; 9; 4; 5

40; 29; 30; 45; 22; 21; 11; 13; 15; 38; 30; 30; 17; 30; 14

დაყავით მონაცემთა ცვლილების არე 8 ტოლ ინტერვალად. იპოვეთ:

ა) დაყოფის ინტერვალები და ინტერვალებში მონაცემთა სიხშირეები და ფარდობითი სიხშირეები.

ბ) ააგეთ სიხშირეთა და ფარდობითი სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამები. იპოვეთ მოდალური კლასი. სიხშირეთა განაწილებები დაახასიათეთ სიმეტრიულობის, გაშლილობის მიხედვით.

გ) გამოთვალეთ არითმეტიკული საშუალო დაჯგუფებული და დაუჯგუფებელი მონაცემებისათვის და პასუხები შეადარეთ ერთმანეთს.

დ) იპოვეთ მონაცემთა გაბნევის დიაპაზონი, გამოთვალეთ სტანდარტული გადახრა და შეისწავლეთ $[\bar{X}-2S; \bar{X}+2S]$, $[\bar{X}-3S; \bar{X}+3S]$ და $[\bar{X}-4S; \bar{X}+4S]$ ინტერვალებში მონაცემთა პროცენტული შემადგენლობა.

მაგალითი 2.28. [3] მოცემულია მონაცემები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით კუნძულზე დაავადებულ ადამიანთა რაოდენობების შესახებ.

ცხრილი 2.27.

ასაკობრივი ჯგუფები (ინტერვალები)	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
დაავადებულთა რაოდენობა (სიხშირე)	8	56	163	204	143	144	79	89

ცხრილი 2.28.

ასაკობრივი ჯგუფები (ინტერვალები)	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	ჯამი
დაავადებულთა რაოდენობა (სიხშირე)	44	48	41	26	18	18	3	3	1	1058

ა) ააგეთ სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამა. არის თუ არა იგი სიმეტრიული?

ბ) იპოვეთ მოდალური შუალედი.

გ) ააგეთ განაწილების პოლიგონი. არის თუ არა იგი სიმეტრიული?

დ) გამოთვალეთ არითმეტიკული საშუალო და სტანდარტული გადახრა.

ე) იპოვეთ $[\bar{X}-S; \bar{X}+S]$ შუალედში მოხვედრილ მონაცემთა პროცენტული რაოდენობა.

მაგალითი 2.29 [3] იმ ფირმის მენეჯერს, რომელსაც შეუკვეთეს ქალის 10 000 წყვილი ფეხსაცმლის შეკერვა, სურს გაარკვიოს რომელი ზომის რამდენი წყვილი ფეხსაცმელი უნდა შეკეროს ფირმამ.

რადგან ყველა მომხმარებლის გამოკითხვა შეუძლებელია, ამიტომ მენეჯერმა ალაღბედზე 100 ქალისაგან მოიპოვა ინფორმაცია მათი ფეხსაცმელების ზომის შესახებ.

ხებ. მიღებული მონაცემების სიხშირეებისა და ფარდობითი სიხშირეების განაწილებები მოცემულია შემდეგი ცხრილით:

ცხრილი 2.29.

ზომა	34	35	36	37	38	39	40	41
სიხშირე	2	6	15	20	24	24	8	1
ფარდობითი სიხშირე	0,02	0,06	0,15	0,2	0,24	0,24	0,08	0,01

ფარდობითი სიხშირეები მიუთითებს იმ პროპორციას, რომლის მიხედვითაც განაწილება შეკვეთა. ამიტომ მენეჯერმა ფარდობითი სიხშირეები გაამრავლა 10 000 და ფირმას წარუდგინა პროგნოზი შესაკერ ფეხსაცმელთა წყვილების რაოდენობების შესახებ:

ცხრილი 2.30.

ზომა	34	35	36	37	38	39	40	41
რაოდენობა	200	600	1500	2000	2400	2400	800	100

მაგალითი 2.30 [7] რაიონში გამოცხადდა წინასაშობაო შეჯიბრი მათემატიკაში მეთერთმეტეკლასელთა შორის: - თითოეული სკოლიდან მონაწილეობის უფლება ეძლეოდა ერთ მოსწავლეს. ამიტომ (რადგან შეჯიბრი წერიითი უნდა ყოფილიყო) მასწავლებელმა მეთერთმეტეკლასელებს წარუდგინა სექტემბრიდან 10 დეკემბრამდე ოთხი წარმატებული მოსწავლის წერით ნამუშევრებში (დამოუკიდებელ საკლასო და საკონტროლო სამუშაოებში) მიღწეული შემდეგი შედეგები:

ცხრილი 2.31.

მოსწავლე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	საშუალო
ზურა	8	10	9	8	9	10	8	10	9	9
ნატო	9	9	8	7	10	9	9	8	10	8,8
დათო	6	8	8	9	10	10	9	10	10	8,9
მაია	9	8	10	7	8	9	9	8	10	8,6

ამ მონაცემთა წარმოდგენის ხერხებზე მსჯელობისა და მცირე კამათის შემდეგ მოსწავლეებმა გადაწყვიტეს დაეთვალიათ სხვა მახასიათებლებიც:

ცხრილი 2.32.

მოსწავლე	მოდა	მედია	ართომეტიკული საშუალო	დიაპაზონი	სტანდარტული გადახრა
ზურა	10	9	9	2	≈0,8
ნატო	9	9	8,8	3	≈0,9
დათო	10	9	8,9	4	≈1,3
მაია	8 და 9	9	8,7	3	≈0,9

(გამოთვლათა შედეგების სისწორე შეამოწმეთ დამოუკიდებლად)

ზემო მონაცემების საფუძველზე (მისი შედეგების სტაბილურობას ყველაზე მცირე სტანდარტული გადახრა ადასტურებს) ზურა საუკეთესო ჩანს. ტრენდის გათვალისწინებით კლასმა გადაწყვიტა, რომ დათო იყო გამარჯვებული და ის უკეთეს შედეგებს აჩვენებდა მათემატიკურ შეჯიბრში (თუ საწინააღმდეგო მოსაზრება გაგიჩნდათ, შეგიძლიათ დაასაბუთოთ).


მაგალითი 2.31 [7] ერთ-ერთ რძის ქარხანაში მიწვეულმა ექსპერტთა 6-კაციანმა ჯგუფმა აქ წარმოებული ხაჭოს გემოსა და სუნზე დეგუსტაციის შედეგები შეაფასა ქულებით, რომელიც მოცემულია შემდეგ ცხრილში:

ცხრილი 2.33.


ექსპერტთა ნომრები	შეაფასებები (ქულები)
1	44
2	43
3	44
4	43
5	45
6	44

ეს მონაცემები წარმოდგენილია წერტილოვანი ნახ (2.20) და მესერული დიაგრამებით, (ნახ. 2.21) ხოლო მონაცემთა ფარდობითი სიხშირეები - წრიულ დიაგრამაზე. (ნახ. 2.22) თითოეული დიაგრამის აგებისას დაშვებულია შეცდომა.


ჩაატარეთ აუცილებელი გამოთვლები, იპოვეთ ეს შეცდომები და გაასწორეთ ისინი.



წერტილოვანი დიაგრამა
ნახ.2.20.



მესერული დიაგრამა
ნახ. 2.21.



წრიული დიაგრამა
ნახ. 2.22.

მაგალითი 2.31. [7] ერთ-ერთ სკოლაში მეთერთმეტეკლასელებმა ჩაატარეს X კლასის მოსწავლე-რესპოდენტთა გამოკითხვა - „რამდენი შვილი ჰყავს თქვენს მშობლებს?“ კითხვაზე პასუხი გასცა 100-მა რესპოდენტმა, რომელთაგან არც ერთი წყვილი არ იყო ერთი დედ-მამის შვილი. პასუხები წინასწარ შედგენილ ცხრილში ფიქსირდებოდა, რომელმაც ბოლოს ასეთი სახე მიიღო:

ცხრილი 2.34.

შვილების რაოდენობა	1	2	3	4	5 და მეტი
სიხშირე n_i	20	52	18	7	3

დადგინდა ისიც, რომ ყველაზე მეტი შვილი (8 ბავშვი) იყო მხოლოდ ერთ ოჯახში.

ა) ჩაატარეთ ამ მონაცემთა ანალიზი. დააღწიეთ შვილების რაოდენობის ყველა მონაცემი არაკლებადი მიმდევრობით და იპოვეთ მონაცემთა ფარდობითი სიხშირეები, მოდა და მედიანა, საშუალო, დიაპაზონი, დისპერსია და სტანდარტული გადახრა.

ბ) მონაცემთა სიხშირეების მიხედვით წარმოადგინეთ შესაბამისი სვეტოვანი დიაგრამა, ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა, ხაზოვანი დიაგრამა (ფარდობით სიხშირეთა პოლიგონი), წრიული დიაგრამა.

გ) მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე დაადგინეთ სტატისტიკური დასკვნა მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის შესახებ.

მაგალითი 2.32. დავალბა ჯგუფური მეცადინეობისთვის. სტუდენტთა ჯგუფში ორგანიზებულად შეადგინეთ კითხვარი.

დასმული საკითხის შესაბამისად ჩაატარეთ გამოკითხვა სასწავლებელში (სტუდენტთა რაოდენობა შეიძლება იყოს 100-ზე ნაკლები), შეადგინეთ სიხშირეთა და ფარდობით სიხშირეთა ცხრილი. ააგეთ სათანადო დიაგრამები.

მაგალითი 2.33. თქვენს ბაღში 120 ძირი მსხმოიარე ვაშლის ხეა დასაკრეფი. როგორ განვსაზღვრავდით მოსავლიანობას, თუ შეგიძლიათ წინასწარ დაკრიფოთ ვაშლი მხოლოდ 6 ხეზე, როცა:

- ა) ყველა ვაშლის ხე „კეხურაა“
- ბ) 40 „ანტონოვკა“ და 80 „კეხურაა“
- გ) 20 „ანტონოვკა“, 40 „შაფრანი“ და 60 „კეხურაა“


რომელი ჯიშის რამდენ ხეს შეარჩევდით თითოეულ შემთხვევაში? გაკეთებული დასკვნა რომელ შემთხვევაში იქნებოდა უფრო ზუსტი?

მაგალითი 2.34. შეაგროვეთ მონაცემები თქვენი ჯგუფის სტუდენტი (სკოლის ან უფროსკლასელი) ვაჟების ფეხსაცმელების ზომის შესახებ. მაგალითი 2.29-ის მიხედვით რა დასკვნას გააკეთებდა ფირმის მენეჯერი თქვენს მიერ მოპოვებული მონაცემების მიხედვით? დაეხმარეთ მას.

საზარჯიშოები

1. ფირმის მოგება და ზარალი მის შემოსავლებსა და ხარჯებზეა დამოკიდებული.

დიაგრამაზე (ნახ. 2.23) მოცემულია, რამდენ ათას ლარს შეადგენს ტურისტული ფირმის შემოსავლები და ხარჯები თვეების მიხედვით მთელი წლის განმავლობაში.



ნახ. 2.23

დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ შეკითხვებს:

ა) რომელ თვეში იყო ფირმის შემოსავლები 30 ათასი ლარის ტოლი?

ბ) მოიგო თუ იზარალა ფირმამ აგვისტოში და რამდენი?

გ) რამდენი ათასი ლარი იზარალა სულ ფირმამ წლის ბოლო მეოთხედში (ოქტომბრის, ნოემბრის და დეკემბრის თვეების განმავლობაში)?

2. ცხრილში 2.35 თვეების მიხედვით წარმოდგენილია მონაცემები ახალშობილი გოგონების და ვაჟების რაოდენობათა შესახებ.

ცხრილი 2.35

თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	წელიწადში
გოგონები	3537	3407	3866	3711	3775	3665	3621	3596	3491	3391	3160	3371	42591
ვაჟები	3743	3550	4017	4173	4117	3944	3964	3797	3712	3512	3392	3761	45682
ერთად	7280	6957	7883	7884	7892	7609	7585	7393	7203	6903	6552	7132	88273

მოცემული ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ შეკითხვებს:

ა) რამდენი გოგონა დაიბადა მაისში?

ბ) თუ მთელი წლის განმავლობაში ახალშობილი ვაჟების რაოდენობა გოგონების რაოდენობაზე ხ-ითაა მეტი, მაშინ:

გ) რომელ თვეში იყო ახალშობილ ვაჟთა რაოდენობა ყველაზე მცირე?

დ) რამდენი თვეა ისეთი, რომელშიც ახალშობილთა საერთო რაოდენობა 7800-ზე მეტია?


ე) შეადარეთ ახალშობილ გოგონათა და ვაჟთა წლიური საშუალო რიცხვი. იპოვეთ თითოეული მათგანიდან გადახრის მაჩვენებლები.

3. ფსიქოლოგის თხოვნაზე, დაესახელებინათ თავისუფალი დროის გატარების მხოლოდ ერთი, მათთვის ყველაზე საყვარელი ფორმა, სტუდენტებმა დაასახელეს: მეგობრებთან ურთიერთობა, ტელევიზორის ყურება, მუსიკის მოსმენა, წიგნის კითხვა, სეირნობა.

სვეტოვან დიაგრამაზე წარმოდგენილია იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებსაც

თავისუფალი დროის ამა თუ იმ ფორმით გატარება უყვართ.

ნახ.2.24



მოცემული დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) თავისუფალი დროის გატარების რომელი ფორმა დაასახელა სტუდენტთა ყველაზე მცირე ნაწილმა?

ბ) რამდენჯერ მეტია იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასახელეს ტელევიზორის ყურება, იმ სტუდენტთა რაოდენობაზე, რომლებმაც დაასახელეს მუსიკის მოსმენა?

გ) სტუდენტთა რამდენმა პროცენტმა დაასახელა წიგნის კითხვა?

დ) იმ სტუდენტების რაოდენობათა ჯამი, რომლებმაც დაასახელეს მეგობრებთან ურთიერთობა და სმირნობა, გამოკითხულთა საერთო რაოდენობის: ა) ნახევარზე მეტია, ბ) ნახევარზე ნაკლებია, გ) ნახევარზე ნაკლებია მაგრამ მესამედზე მეტია, დ) მესამედია, ე) მესამედზე ნაკლებია, მაგრამ მეოთხედზე მეტია.

ე) იპოვეთ გამოკითხულ სტუდენტთა რაოდენობა.

4. ახალ მხატვრულ ფილმს 4 დღის განმავლობაში უჩვენებდნენ. ფილმის ჩვენებას ყველაზე მეტი მაყურებელი პირველ დღეს დაესწრო. ყოველ მომდევნო დღეს კი მაყურებელთა რაოდენობა წინა დღესთან შედარებით 50-ით მცირდებოდა. ბოლო დღეს ეს ფილმი ნახა 200-მა მაყურებელმა საშუალოდ დღეში რამდენ მაყურებელს უნახავს ეს ფილმი?

5. ცხრილში 2.36 მითითებულია, თუ რამდენი ლარი იყო ზოგიერთი საკვები პროდუქტის საშუალო ფასი სხვადასხვა წელს (1995 წლიდან 1998 წლის ჩათვლით)

ცხრილი 2.36.

	1995	1996	1997	1998
საქონლის ხორცი (1 კგ)	3.72	3.30	3.80	4.10
ღორის ხორცი (1 კგ)	3.88	3.70	4.00	4.20
ქათამი (1 კგ)	4.62	4.50	4.00	3.62
კვერცხი (10 ცალი)	1.30	1.40	1.50	1.60
კარაქი (1 კგ)	5.20	5.00	5.00	6.20
ყველი (1 კგ)	4.90	3.80	3.80	3.80
შაქრის ფხვნილი (1 კგ)	0.80	0.91	0.84	0.97
ხორბლის ფქვილი (1 კგ)	0.85	1.00	0.94	1.00
ღვინო (0,7 ლ.)	1.13	1.37	1.37	1.37

მოცემული ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:


ა) რამდენი ლარი იყო 1 კგ ყველის საშუალო ფასი 1995 წელს?

ბ) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროდუქტის საშუალო ფასი შემცირდა 1997 წელს წინა წელთან შედარებით?

გ) რომელი პროდუქტის საშუალო ფასი იმატებდა ყოველწლიურად 1995-1998 წლებში?

დ) რა ფარგლებში მერყეობდა (იცვლებოდა) ღორის ხორცის საშუალო ფასი 1995-1998 წლებში?

6. სვეტოვან დიაგრამაზე წარმოდგენილია მაღაზიაში ერთი თვის განმავლობაში გაყიდული სხვადასხვა სახის სათამაშოთა რაოდენობები:



ნახ.2.25

მოცემული დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) რა სახის სათამაშოები გაიყიდა მაღაზიაში და რამდენი?

ბ) რა სახის სათამაშოები გაყიდულა ყველაზე დიდი რაოდენობით?


გ) რამდენჯერ ნაკლებია გაყიდული კონსტრუქტორების რაოდენობა გაყიდული მანქანების რაოდენობაზე?

დ) გაყიდული სათამაშოების საერთო რაოდენობის რამდენი პროცენტია გაყიდული ნაძვის ხის სათამაშოების რაოდენობა?

ე) გაყიდულ სათამაშოთა საერთო რაოდენობის მეოთხედზე მეტია, მაგრამ მესამედზე ნაკლები.

7. მეწარმის შემოსავალი იანვარში 1000 ლარი იყო. თებერვალში მისი თვიური შემოსავალი 100 ლარით გაიზარდა, მარტში - კიდევ 100 ლარით. აპრილიდან მოყოლებული სამი თვის განმავლობაში მეწარმის შემოსავალი ყოველთვიურად 200 ლარით მცირდებოდა. საშუალოდ რამდენი ლარი იყო მეწარმის შემოსავალი თვეში ამ 6 თვის მონაცემებით?

8. სვეტოვან დიაგრამაზე წარმოდგენილია მაღაზიაში ერთი თვის განმავლობაში გაყიდული სხვადასხვა სახის სათამაშოთა რაოდენობები:



ნახ. 2.26

მოცემული დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) სულ რამდენი სათამაშო გაიყიდა?

ბ) რა სახის სათამაშოები გაყიდულა ყველაზე დიდი რაოდენობით?

გ) რამდენჯერ ნაკლებია გაყიდული კონსტრუქტორების რაოდენობა გაყიდული მანქანების რაოდენობაზე?

დ) გაყიდული სათამაშოების საერთო რაოდენობის რამდენი პროცენტია გაყიდული ნაძვის ხის სათამაშოების რაოდენობა?

ე) მანქანების და თოჯინების რაოდენობის ჯამი. გაყიდულ სათამაშოთა საერთო რაოდენობის მეოთხედზე მეტია, მაგრამ მესამედზე ნაკლები? დაასაბუთეთ.

ვ) საშუალოდ დღეში რამდენი სათამაშო იყიდებოდა?

ზ) საშუალოდ დღეში რამდენი ბურთი გაიყიდა?

შენიშვნა: იყო ნოემბრის თვე.

9. მეწარმის შემოსავალი იანვარში 3000 ლარი იყო. თებერვალში მისი თვიური შემოსავალი 100 ლარით გაიზარდა, მარტში - კიდევ 200 ლარით. აპრილიდან მოყოლებული სამი თვის განმავლობაში მეწარმის შემოსავალი ყოველთვიურად 200 ლარით მცირდებოდა. სულ რამდენი ლარი იყო თვეში მეწარმის საშუალო შემოსავალი ამ 6 თვის მონაცემებით?

10. ცხრილში 2.37 მითითებულია, თუ რამდენი ლარი იყო ზოგიერთი საკვები პროდუქტის საშუალო ფასი სხვადასხვა წელს (1995 წლიდან 1998 წლის ჩათვლით)

ცხრილი 2.37.

	1995	1996	1997	1998
საქონლის ხორცი (1 კგ)	3.72	3.30	3.80	4.10
ღორის ხორცი (1 კგ)	3.88	3.70	4.00	4.20
ქათამი (1 კგ)	4.62	4.50	4.00	3.62
კვერცი (10 ცალი)	1.30	1.40	1.50	1.60
კარაქი (1 კგ)	5.20	5.00	5.00	6.20
ყველი (1 კგ)	4.90	3.80	3.80	3.80
შაქრის ფხვნილი (1 კგ)	0.80	0.91	0.84	0.97
ხორბლის ფქვილი (1 კგ)	0.85	1.00	0.94	1.00
ღვინო (0,7 ლ.)	1.13	1.37	1.37	1.37

მოცემული ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) რამდენი ლარი იყო 1 კგ ყველის საშუალო ფასი 1995 წელს?

ბ) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი პროდუქტის საშუალო ფასი შემცირდა 1997 წელს წინა წელთან შედარებით?

გ) რომელი პროდუქტის საშუალო ფასი იმატებდა ყოველწლიურად 1995-1998 წლებში?

დ) რა ფარგლებში მერყეობდა (იცვლებოდა) ღორის ხორცის საშუალო ფასი 1995-1998 წლებში?

11. ცხრილში 2.38 მოცემულია ქალაქის მერის არჩევნების შედეგები. ქალაქი ხუთ საარჩევნო უბნად იყო დაყოფილი. არჩევნებში მხოლოდ ორმა - M და N კანდიდატმა მიიღო მონაწილეობა. გაიმარჯვა იმ კანდიდატმა, რომელმაც მეტი ხმა დააგროვა. განსაზღვრეთ, რომელ უბანში მიიღო გამარჯვებულმა კანდიდატმა ყველაზე მეტი ხმა?

შენიშვნა: იგულისხმება, რომ არჩევნებში ყველა ამომრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა და თითოეულმა მათგანმა ხმა მხოლოდ ერთ კანდიდატს მისცა.


ცხრილი 2.38

უბანი	ამომრჩეველთა რაოდენობა	M კანდიდატის მომხრეთა პროცენტული რაოდენობა	N კანდიდატის მომხრეთა პროცენტული რაოდენობა
1	1800	60%	40%
2	1000	25%	75%
3	700	50%	50%
4	1200	50%	50%
5	1800	75%	25%

12. ელენეს თავისი ელექტრონული ფოსტის კოდი დაავიწყდა. მას ახსოვს, რომ კოდი 6 სიმბოლოსგან შედგება. ამასთან, პირველი ოთხი სიმბოლო მისი სახელის პირველი ოთხი ასოა, მეხუთე სიმბოლო ციფრია, ხოლო

ბოლო სიმბოლო ხმოვანია (ა, ე, ი, ო, უ). ყველაზე უარეს შემთხვევაში, რამდენი ვარიანტის გადასინჯვა მოუწევს ელენეს თავისი კოდის მისაგნებად?

13. დიაგრამაზე (ნახ. 2.27) მითითებულია ვიდეოგაქირავეების სალონში არსებული სხვადასხვა ჟანრის ფილმების რაოდენობების პროცენტული განაწილება.



ნახ.2.27

განსაზღვრეთ დოკუმენტური ჟანრის ფილმების რაოდენობის პროცენტული მაჩვენებელი.

14. ავეჯის საამქრო ამზადებს მაგიდებს, სკამებს, საწოლებს და კარადებს, რომელთა დღიური რაოდენობები მითითებულია სვეტოვან დიაგრამაზე, ხოლო პროცენტული განაწილება - წრიულ დიაგრამაზე. ცნობილიაბ რომ ყოველდღე მზადდება იმდენივე სკამი, რამდენიც მაგიდა. დიაგრამებზე მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე დაადგინეთ, დღეში დამზადებულ ნაკეთობათა საერთო რაოდენობის რამდენ პროცენტს შეადგენს კარადები?

15. ცხრილში 2.39 მოცემულია, რამდენი სტუდენტი სწავლობდა 2000-2005 წლებში ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის ჰუმანიტარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტების სპეციალობებზე.

	ჰუმანიტარული ფაკულტეტი			საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი			
	ფილოლოგია	ისტორია	ფსიქოლოგია	ფიზიკა	ქიმია	ბიოლოგია	გეოლოგია
2000	160	120	90	80	30	45	40
2001	180	100	85	75	25	40	35
2002	190	110	80	85	20	35	25
2003	180	105	90	80	25	30	20
2004	175	110	95	70	30	45	35
2005	170	100	95	65	35	40	25

ცხრილის მიხედვით უპასუხეთ შეკითხვებს:

ა) რომელ წლებში იყო იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის სპეციალობაზე სწავლობდნენ, უფრო მეტი, ვიდრე მათი საერთო რაოდენობა, ვინც იმავე ფაკულტეტის ბიოლოგიის ან გეოლოგიის სპეციალობებზე სწავლობდა?

ბ) რამდენჯერ მეტი იყო იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც 2001 წელს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობაზე სწავლობდნენ, მათ რაოდენობაზე, ვინც იმავე წელს საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ბიოლოგიის სპეციალობაზე სწავლობდა?

გ) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნაა მართებული ცხრილის მიხედვით?

1) ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სტუდენტთა ნახევარზე მეტი ფილოლოგიის სპეციალობაზე სწავლობს.

2) იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობაზე სწავლობდნენ, ყოველწლიურად იკლებდა, ხოლო მათი, ვინც ფსიქოლოგიის სპეციალობაზე სწავლობდა - იმატებდა.

3) იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოლოგიის სპეციალობაზე სწავლობდნენ, 2000-2002 წლებში ყოველწლიურად იკლებდა, ხოლო 2003-2005 წლებში - იმატებდა.

4) საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის სპეციალობაზე ყოველ წელს უფრო მეტი სტუდენტი სწავლობდა, ვიდრე იმავე ფაკულტეტის სხვა დანარჩენ სპეციალობებზე (ერთად).

5) ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფსიქოლოგიის სპეციალობაზე ყოველ წელს სტუდენტთა უფრო ნაკლები რაოდენობა სწავლობდა, ვიდრე საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ფიზიკის ან ქიმიის სპეციალობებზე (ერთად).

16. ქალაქის მუნიციპალიტეტის დავალებით სხვადასხვა წლებში გამოიკვლიეს, ქალაქის მოსახლეობის რა ნაწილი სარგებლობს კერძო ტრანსპორტით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამა თუ იმ სახეობით (აქაც და შეკითხვებშიც საუბარია იმაზე, რა სახეობის ტრანსპორტით სარგებლობს მოსახლეობა უპირატესად). ცხრილში 2.40 მოცემულია, 1990-1996 წლებში ქალაქის მცხოვრებთა რამდენი პროცენტი სარგებლობდა კერძო ტრანსპორტით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემდეგი სახეობებით: ავტობუსით, მიკროავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით თუ მეტროპოლიტენით.

ცხრილი 2.40

	კერძო ტრანსპორტი	საზოგადოებრივი ტრანსპორტი				
		ავტობუსი	იკროავტობუსი	ტროლეიბუსი	ტრამვაი	მეტროპოლიტენი
1990	11	35	8	15	7	24
1991	10	33	8	12	7	30
1992	11	32	10	12	5	30
1993	17	28	11	15	3	26
1994	15	30	12	15	3	25
1995	14	32	12	14	2	26
1996	12	35	10	13	2	28

- უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) ქალაქის მცხოვრებთა რამდენი პროცენტი მგზავრობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 1995 წელს?

ბ) რომელ წლებში იყო იმ მცხოვრებთა რაოდენობა, რომლებიც ტროლეიბუსით მგზავრობდნენ, უფრო ნაკლები, ვიდრე მათი საერთო რაოდენობა, ვინც მიკროავტობუსით ან ტრამვაით მგზავრობდა?

გ) რამდენჯერ მეტი იყო იმ მცხოვრებთა რაოდენობა, რომლებიც 1994 წელს ავტობუსით სარგებლობდნენ, მათ რაოდენობაზე, ვინც იმავე წელს კერძო ტრანსპორტით სარგებლობდა?

- ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნაა მართებული ცხრილის მიხედვით?

1) ქალაქის მცხოვრებთა ნახევარზე მეტი ავტობუსით სარგებლობს.


2) იმ მცხოვრებთა წილი, რომლებიც მეტროპოლიტენით სარგებლობდნენ, ყოველწლიურად იმატებდა, ხოლო მათი, ვინც მიკროავტობუსით სარგებლობდა - იკლებდა.

3) ყოველ წელს ქალაქის მცხოვრებთა უფრო ნაკლები რაოდენობა სარგებლობდა ტროლეიბუსით, ვიდრე - კერძო ტრანსპორტით ან ტრამვაით (ერთად).


4) საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობებიდან ავტობუსით ან ტროლეიბუსით (ერთად) ყოველ წელს უფრო მეტი მცხოვრები სარგებლობდა, ვიდრე - საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სხვა დანარჩენი სახეობებით (ერთად).

5) ყოველ წელს ქალაქის მცხოვრებთა უფრო მეტი რაოდენობა სარგებლობდა ავტობუსით, ვიდრე - ტრამვაით ან მეტროპოლიტენით (ერთად).

17. წრიულ დიაგრამებზე (2.28; 2.29) მითითებულია M და N ქალაქების მცხოვრებთა რამდენ პროცენტს შეადგენენ ბავშვები, ახალგაზრდები, შუახნის ადამიანები და მოხუცები.




ნახ.2.28
M ქალაქი



ნახ.2.29.
N ქალაქი

M ქალაქში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობა მეტია თუ N ქალაქში მცხოვრები მოხუცების რაოდენობა?

18. ცნობილია, რომ ადამიანის ფიზიოლოგიურ სისტემათა უმრავლესობის ქმედითუნარიანობა მაქსიმუმს, ანუ 100%-ს მაშინ აღწევს, როცა ადამიანი 20 წლისაა. დიაგრამაზე წარმოდგენილია, თუ როგორ იცვლება საშუალოდ ადამიანის გულსისხლძარღვთა და კუნთოვანი სისტემების ქმედითუნარიანობა პროცენტულად 20-დან 80 წლამდე ასაკში.



ნახ.2.30

მოცემული დიაგრამის მიხედვით უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს:

ა) რამდენ პროცენტს შეადგენს ადამიანის კუნთოვანი სისტემის ქმედითუნარიანობა 70 წლის ასაკში?

ბ) რამდენჯერაა შემცირებული გულსისხლძარღვთა სისტემის ქმედითუნარიანობა 75 წლის ასაკში, 35 წლის ასაკთან შედარებით?

გ) ქვემოთ ჩამოთვლილი ასაკობრივი შუალედებიდან რომელში მცირდება კუნთოვანი სისტემის ქმედითუნარიანობა უფრო ნაკლებად, ვიდრე – გულსისხლძარღვთა სისტემისა?

დ) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა მართებული დიაგრამის მიხედვით?

1) 40-დან 80-წლამდე ასაკში ადამიანის როგორც კუნთოვანი, ასევე - გულსისხლძარღვთა სისტემის ქმედითუნარიანობა არ იცვლება.

2) 20-დან 50-წლამდე ასაკში ადამიანის გულსისხლძარღვთა სისტემის ქმედითუნარიანობა ხან იმატებს, ხან - იკლებს.

3) 70-დან 80-წლამდე ასაკში ადამიანის გულსისხლძარღვთა სისტემის ქმედითუნარიანობა უფრო მეტად მცირდება, ვიდრე - კუნთოვანი სისტემისა.

4) 30-დან 70-წლამდე ასაკში ადამიანის გულსისხლძარღვთა სისტემისა და კუნთოვანი სისტემის ქმედითუნარიანობა ერთნაირად იცვლება.

5) 50-დან 60-წლამდე ასაკში ადამიანის კუნთოვანი სისტემის ქმედითუნარიანობა უფრო მეტად მცირდება, ვიდრე - გულსისხლძარღვთა სისტემისა.

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა კითხვები განმეორებისათვის

- 1) როგორ კანონზომიერებებს შეისწავლის მათემატიკა? მოკლედ ჩამოაყალიბეთ მათემატიკური მოდელირების ეტაპები.
- 2) როგორ წარმოგიდგენიათ ცვალებადობა და კანონზომიერებანი ჩვენს ცხოვრებაში, როგორი მოვლენებია შემთხვევითი? მაგალითებს ხომ ვერ გაიხსენებდით თქვენი ცხოვრებიდან?
- 3) რა იძლევა შემთხვევითი მოვლენების შესწავლის საფუძველს? როგორ გესმით მასობრივი შემთხვევითი მოვლენები. რა არის პროგნოზი და პროგნოზირება?
- 4) გაიხსენეთ სტატისტიკის, როგორც საგნის, წინასწარი, არაფორმალური განსაზღვრა.
- 5) ცვლადის ცნება ბიჰევიორისტულ მეცნიერებებში. ცვლადი, როგორც სტიმული ან შესასწავლ ობიექტთა თვისობრივი ან რაოდენობრივი მახასიათებელი.
- 6) როგორ მოიპოვება ინფორმაცია, გაზომვა, ჩამოთვალეთ ცვლადის გაზომვის სკალები.
- 7) განმარტეთ სახელდებისა და რიგის სკალა. შეადარეთ ერთმანეთს, როგორი ცვლადების გაზომვა შეიძლება ამ სკალებზე? რით განსხვავდებიან და რა აქვთ საერთო გაზომვის ამ სკალებს? რა ნაკლი აქვს სახელდების სკალას?
- 8) განმარტეთ ინტერვალების სკალა და შეფარდების სკალა.
- 9) რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლადები და მონაცემები.
- 10) განმარტეთ დისკრეტული და უწყვეტი ცვლადები.
- 11) განმარტეთ რიცხვის რეალური საზღვრები, რეალური ქვედა და რეალური ზედა საზღვარი.

- 12) რიცხვების დამრგვალების წესები. გამოთვლის შუალედური ნაბიჯები და გამოთვლის საბოლოო პასუხები.
- 13) რას წარმოადგენს შემთხვევითი ცდა (დაკვირვება, ექსპერიმენტი)?
- 14) რა არის მონაცემი? რა არის ხდომილობა?
- 15) რას წარმოადგენს თვისობრივი (ხარისხობრივი) მონაცემი? რას წარმოადგენს რაოდენობრივი მონაცემი?
- 16) როგორ რაოდენობრივ მონაცემს ვუწოდებთ დისკრეტულს? როგორ რაოდენობრივ მონაცემს ვუწოდებთ უწყვეტს?
- 17) როგორ ხდომილობას ეწოდება შეუძლებელი და როგორ აღინიშნება იგი?
- 18) როგორ ხდომილობას ეწოდება აუცილებელი და როგორ აღინიშნება იგი?
- 19) როგორ ხდომილობას ეწოდება შემთხვევითი და როგორ აღინიშნება იგი?
- 20) ძირითადად როგორ კანონზომიერებებს შეისწავლის მათემატიკა?
- 21) რას ეწოდება დინამიკური კანონზომიერებები? რას ეწოდება სტატისტიკური კანონზომიერებები?
- 22) რას ნიშნავს მოვლენათა პროგნოზირება?
- 23) მონაცემების წარმოდგენა ცხრილებით პრინციპულად რამდენნაირად შეგვიძლია?
- 24) რა არის ხდომილობის ფარდობითი სიხშირე?
- 25) რა არის მონაცემის სიხშირე და ფარდობითი სიხშირე?
- 26) როგორ დაკვირვებას ვუწოდებთ ორშედეგიან დაკვირვებას?
- 27) რა არის ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური კანონზომიერება?
- 28) მოიყვანეთ ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური კანონზომიერების მაგალითი.
- 29) რა არის ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საგანი?
- 30) როდის და სად წარმოიშვა ალბათობის თეორია?
- 31) როდის წარმოიშვა სტატისტიკის თეორიის დასაწყისი?
- 32) რა არის პოპულაცია (გენერალური ერთობლიობა)?
- 33) რას სწავლობს აღწერითი სტატისტიკა?
- 34) რას ეწოდება შემთხვევითი შერჩევა (ამოკრება)?

- 35) რას წარმოადგენს შემთხვევითი შერჩევა დაბრუნებით?
- 36) რას წარმოადგენს შემთხვევითი შერჩევა დაბრუნების გარეშე?
- 37) რას ეწოდება პოპულაციისა და შერჩევის მოცულობა?
- 38) როგორ შერჩევას ეწოდება რეპრეზენტატული (წარმომადგენლობითი)?
- 39) პირობითად რამდენ ნაწილად შეიძლება დაიყოს სტატისტიკის თეორია და როგორ?
- 40) როგორ მონაცემებს ეწოდება „ნედლი“ მონაცემები?
- 41) ჩამოთვალეთ მონაცემთა მოპოვების მეთოდები.
- 42) როგორია დახურული და ღია კითხვები?
- 43) ვინაა კორესპოდენტი (ინტერვიუერი) და რესპოდენტი?
- 44) რას ეწოდება ცვლადი და რამდენი სახის ცვლადს იცნობთ? განმარტეთ დისკრეტული და უწყვეტი ცვლადები.
- 45) რა არის და როდის ხდება მონაცემთა ჩანაცვლება (დამახინჯება)?
- 46) ჩამოთვალეთ მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები.
- 47) როგორ აიგება მონაცემთა სიხშირული განაწილების ცხრილი?
- 48) როგორ აიგება მონაცემთა ფარდობით სიხშირეთა განაწილების ცხრილი?
- 49) როგორ აიგება მონაცემთა პროცენტული განაწილების ცხრილი?
- 50) რას ეწოდება ვარიაციული მწკრივი?
- 51) რას ეწოდება სტატისტიკურ მონაცემთა დიაპაზონი?
- 52) როგორ ხდება სტატისტიკურ მონაცემთა წარმოდგენა წერტილოვანი დიაგრამით? (მითითება: „ნედლი“ მონაცემების მიხედვით და მონაცემთა სიხშირეების მიხედვით).
- 53) რას წარმოადგენს ხაზოვანი დიაგრამა და პრინციპულად რამდენი სახისაა იგი?
- 54) რას წარმოადგენს პიქტოგრამა?
- 55) როგორ აიგება ფოთლებიანი ღეროების დიაგრამა?
- 56) როგორ აიგება სვეტოვანი (მართკუთხოვანი) დიაგრამები და პრინციპულად რამდენი სახისაა იგი?
- 57) რა არის პიქტოგრამა და როგორ აიგება იგი?
- 58) რა არის მონაცემთა განაწილების პოლიგონი და როგორ აიგება იგი?

- 59) რა მსგავსება და განსხვავებაა მონაცემთა ხაზოვან დიაგრამასა და მონაცემების სიხშირეთა განაწილების პოლიგონს შორის?
- 60) რა მსგავსება და განსხვავებაა მონაცემთა მართკუთხოვანი დიაგრამით წარმოდგენასა და სიხშირეთა განაწილების ჰისტოგრამას შორის?
- 61) როდის და როგორ აიგება წრიული დიაგრამა?
- 62) წრიული დიაგრამის აგებისას როგორ გამოითვლება წრიული სექტორის კუთხე?
- 63) როგორ აიგება ოგივა?
- 64) როდის ხდება მონაცემთა დაჯგუფება?
- 65) რას ეწოდება მონაცემის რანგი და როგორ გამოითვლება იგი ა) განსხვავებული მონაცემებისათვის? ბ) განმეორებადი მონაცემებისათვის?
- 66) რას ეწოდება მოდა და როგორ ვიპოვით მას?
- 67) რას ეწოდება მონაცემების მედიანა და როგორ ვიპოვით მას?
- 68) რას ეწოდება მონაცემების არითმეტიკული საშუალო და როგორ ვიპოვით მას ა) დაუჯგუფებელი მონაცემებისათვის? ბ) დაჯგუფებული მონაცემებისათვის?
- 69) რას ეწოდება მონაცემთა დისპერსია და როგორ ვპოულობთ მას ა) დაუჯგუფებელი მონაცემებისათვის? ბ) დაჯგუფებული მონაცემებისათვის?
- 70) რას ეწოდება მონაცემთა საშუალო კვადრატული გადახრა (სტანდარტული გადახრა) და როგორ ვპოულობთ მას ა) დაუჯგუფებელი მონაცემებისათვის? ბ) დაჯგუფებული მონაცემებისათვის?
- 71) რას წარმოადგენს მოდალური ინტერვალი (ქვეინტერვალი)?
- 72) არითმეტიკული საშუალოსა და მოდალური ინტერვალის მიხედვით როგორ ვადგებთ სიხშირეთა განაწილების პოლიგონისა და ჰისტოგრამის სიმეტრიულობას?
- 73) როგორია მონაცემთა პროცენტული განაწილებები $[X-iS; X+iS]$, $(i=1,2,3,4)$, „სტანდარტულ ინტერვალში“?
- 74) როგორ ვადგებთ სიხშირეთა განაწილების ტიპობრივ ფორმებს?

თავი III. ალბათობის თეორიის ელემენტები. თეორიული მასალა

§1. ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. მოქმედებები ხდომილობებზე

გავიხსენოთ:

ცდა (ექსპერიმენტი, დაკვირვება) ეწოდება პირობათა გარკვეულ S კომპლექსის შესრულებას.

ცდის იმ შესაძლო შედეგთა ერთობლიობა, რომლებიც ერთმანეთს გამორიცხავენ, ერთ-ერთი მათგანი აუცილებლად ხდება, ერთგვაროვანნი არიან და არ იშლებიან მასზე „მარტივი“ ხდომილობების სახით ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს ქმნის. ამ სივრცის ელემენტებს ელემენტარულ ხდომილობებს უწოდებენ.

ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე აღინიშნება Ω , ხოლო ელემენტარული ხდომილობები ω სიმბოლოთი.

ცდის პირობათა S კომპლექსი ცალსახად განსაზღვრავს ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს.

ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცის ნებისმიერ ქვესიმრავლეს ხდომილობა ეწოდება.

ხდომილობები აღინიშნებიან ლათინური ანბანის დიდი ასოებით A, B, C, \dots

იმ ω ელემენტარულ ხდომილობებს, რომლებიც შედიან რაიმე ხდომილობაში, ხდომილობის ხელშემწყობი ელემენტარული ხდომილობები ეწოდებათ და ამ ფაქტს აღნიშნავენ შემდეგნაირად: $\omega \in A$.

ამბობენ, რომ A ხდომილობა მოხდა, თუ ცდის შედეგად ადგილი ჰქონდა მის ხელშემწყობ ერთ-ერთ ელემენტარულ ხდომილობას.

ხდომილობას, რომელიც მოცემული ცდის ყველა ელემენტარულ ხდომილობას შეიცავს, აუცილებელი ხდომილობა ეწოდება და, ბუნებრივია, ისევე როგორც ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე, Ω სიმბოლოთი აღინიშნება.

ხდომილობას, რომელიც მოცემული ცდის არცერთ ელემენტარულ ხდომილობას არ შეიცავს შეუძლებელი ხდომილობა ეწოდება და აღინიშნება \emptyset სიმბოლოთი.

ხდომილობას, რომელიც არც აუცილებელია და არც შეუძლებელი, შემთხვევითი ხდომილობა ეწოდება.

თუ Ω -ს ყველა ის ელემენტარული ხდომილობა, რომელიც იწვევს (ხელს უწყობს) რაიმე A ხდომილობას, ამავე დროს იწვევს სხვა B ხდომილობასაც, მაშინ ამბობენ, რომ A ხდომილობა იწვევს B ხდომილობას ან A ხდომილობა შედის B ხდომილობაში და ამ ფაქტს ასე აღნიშნავენ - $A \subset B$.

თუ $A \subset B$ და $B \subset A$, მაშინ A და B -ს ექვივალენტური (ტოლძალოვანი) ხდომილობები ეწოდებათ და წერენ $A=B$.

მოცემული ცდის ყველა აუცილებელი ხდომილობა ექვივალენტურია; ყველა შეუძლებელი ხდომილობაც ექვივალენტურია.

ორი A და B ხდომილობის ჯამი (გაერთიანება) ეწოდება ხდომილობას, რომელიც ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც A და B ხდომილობებიდან ერთი მაინც ხდება და აღინიშნება $A+B$ ან $A \cup B$ სიმბოლოთი.

ორი A და B ხდომილობის ნამრავლი (თანაკვეთა) ეწოდება ხდომილობას, რომელიც ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხდება A და B ხდომილობები ერთდროულად და აღინიშნება AB ან $A \cap B$ სიმბოლოთი.


ორი A და B ხდომილობის სხვაობა ეწოდება ისეთ ხდომილობას, რომელიც ხდება მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხდება A და არ ხდება B ხდომილობა და აღინიშნება $A-B$ ან $A \setminus B$ სიმბოლოთი.

A და B -ს უთავსებადი ხდომილობები ეწოდებათ, თუ მათი ერთდროული მოხდენა შეუძლებელია, ე.ი. $A \cdot B = \emptyset$.

A ხდომილობის არმოხდენას A -ს საწინააღმდეგო ხდომილობა ეწოდება და აღინიშნება \bar{A} სიმბოლოთი. ცხადია, რომ $\Omega - A = \bar{A}$, $\bar{\bar{A}} = A$, $\bar{A} \cdot A = \emptyset$.

ხდომილობათა ჯამი და ნამრავლი ნებისმიერი სასრული და თვლადი რაოდენობის ხდომილობებისათვის ანალოგიურად განისაზღვრება.

სქემატურად, ორი A და B ხდომილობის ჯამი, ნამრავლი, სხვაობა, საწინააღმდეგო ხდომილობა შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგნაირად:



(ნახ. 3.1).

A, B, C ხდომილობებისათვის სრულდება შემდეგი თანაფარდობანი:

1.1. ჯამისა და ნამრავლის კომუტატიურობა

$$A+B=B+A, A \cdot B=B \cdot A$$

1.2. ჯამისა და ნამრავლის ასოციატიურობა

$$A+B+C=A+(B+C)=(A+B)+C, A \cdot B \cdot C=A \cdot (B \cdot C)=(A \cdot B) \cdot C$$

1.3. დისტრიბუციულობა

$$(A+B) \cdot C=A \cdot C+B \cdot C; (A \cdot B)+C=(A \cdot C) \cdot (B+C)$$

1.4. $\overline{A+B}=\bar{A} \cdot \bar{B}; \overline{A \cdot B}=\bar{A}+\bar{B}; \overline{\bar{A}}=A; A+A=A; A \cdot A=A$

$$A+\Omega=\Omega; A+\emptyset=A; A \cdot \Omega=A; A \cdot \emptyset=\emptyset; \Omega \cdot \emptyset=\emptyset; \emptyset=\emptyset$$

A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობანი ქმნიან ხდომილობათა სრულ ჯგუფს, თუ სრულდება შემდეგი ორი პირობა:

ა) ერთ-ერთი A_i ($i=1, \dots, n$) ხდომილობა აუცილებლად ხდება, ე.ი. $A_1+A_2+A_3+\dots+A_n=\Omega$


ბ) ხდომილობები წყვილ-წყვილად უთავსებადია, ე.ი. $A_i \cdot A_j = \emptyset, i \neq j,$

$$i, j=1, 2, \dots, n$$

§2. კომბინატორიკა

კომბინატორიკის ძირითადი პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს: თანმიმდევრობით შესასრულებელია k მოქმედება. თუ პირველი მოქმედება შეიძლება შევასრულოთ n_1 , მეორე - n_2 , მესამე n_3 და ა.შ.

k -ური n_k განსხვავებული წესით, მაშინ k მოქმედება მთლიანობაში შეიძლება შესრულდეს $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ განსხვავებული წესით.



მაგალითად, თუ გიორგის აქვს 3 პერანგი და 2 ჰალსტუხი, მაშინ მათი არჩევის რამდენნაირი შესაძლებლობა გააჩნია მას?

ამოხსნა:

ჰალსტუხის არჩევის 2 ვარიანტი (2 განსხვავებული წესი) და ყოველ ვარიანტთან პერანგის შერჩევის 3 ვარიანტია, (3 განსხვავებული წესია) ე.ი. გიორგის სულ $2 \times 3 = 6$ არჩევანი აქვს.

განვიხილოთ შემდეგ მაგალითი: თუ მოცემულია ოთხ-ელემენტოვანი ($n=4$) სიმრავლე $\{a, b, c, d\}$, მაშინ ამ სიმრავლის ელემენტებისაგან რამდენი განსხვავებული ორ-ელემენტოვანი ($k=2$) ქვესიმრავლის შედგენა შეიძლება?

ამოხსნა: პირველ რიგში დავაზუსტოთ, ქვესიმრავლეები რით უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან?

ა) ქვესიმრავლედ $\{a, a\}, \{b, b\}$ და ა.შ. ორ-ელემენტოვანი სიმრავლეები და ა.შ. არ განიხილება, რადგან მოცემულ სიმრავლეში ელემენტი a, b, c ან d ორჯერ არ გვხვდება.

ბ) წამიერად დავუშვათ, რომ მოცემული სიმრავლის ელემენტები a, b, c და d რაიმე ორ-ელემენტოვანი კოდის (თუნდაც ორციფრიანი ტელეფონის ნომრის) ციფრებია. მაშინ ქვესიმრავლე $\{a; b\}$ და $\{b; a\}$ სხვადასხვა ქვესიმრავლე იქნება. ქვესიმრავლეში ელემენტების ადგილების შეცვლამ ქვესიმრავლის შეცვლა გამოიწვია. ვამბობთ: **ქვესიმრავლეში ელემენტების დალაგებას მნიშვნელობა ენიჭება.** მათ დალაგებულ სიმრავლეებს უწოდებენ, ხოლო თუ მათ განვიხილავთ როგორც რაიმე ოთხ-ელემენტოვანი სიმრავლის დალაგებულ ორ-ელემენტოვან ქვესიმრავლეებს, მაშინ მათ შესაბამისად, **ოთხ-ელემენტოვანი სიმრავლიდან შედგენილ ორ-ელემენტოვან წყობებს** უწოდებენ. გამორჩევის მიზნით მათ აღნიშნავენ (a, b) სიმბოლოთი.

მოცემული ოთხ-ელემენტოვანი ($n=4$) სიმრავლიდან $\{a, b, c, d\}$, შედგება 12 ორ-ელემენტოვანი ($k=2$) წყობა: $(a, b); (b, a); (a, c); (c, a); (a, d); (d, a); (b, c); (c, b)$.

ბუნებრივია, დაგებადათ კითხვა: ყოველთვის ამ ხერხით უნდა დავთვალოთ წყობათა რაოდენობები? პასუხი ცალსახაა: „ცხადია, არა“. არსებობს წყობათა

რაოდენობების აღნიშვნისა და გამოთვლის ზოგადი წესი. ამ საკითხს ამ პარაგრაფში ოდნავ მოგვიანებით განვიხილავთ.

ჯერჯერობით განვიხილოთ $\{a,b,c,d\}$, ოთხ ელემენტისანი ($n=4$) სიმრავლიდან ორ ელემენტისანი ($k=2$) დაულაგებელი ქვესიმრავლების შედგენისა და მათი რაოდენობების დათვლის საკითხი. ამ ქვესიმრავლებში ელემენტების გადალაგებით არ მიიღება ახალი ქვესიმრავლე, ანუ *ქვესიმრავლის ელემენტების დალაგებას მნიშვნელობა არ ენიჭება*. ასეთ ქვესიმრავლებს *ჯუფთებებს* უწოდებენ. გამორჩევის მიზნით, მათ აღნიშნავენ $[a,b]$ სიმბოლოთი. $[a,b]$ და $[b,a]$ ერთიდაიგივეა (მუჭში გვაქვს a და b ბურთულა, გადმოატრიალებ მუჭს, მუჭში ისევ იმავე შემადგენლობის b და a ბურთულის წყვილია).

ოთხ ელემენტისანი ($n=4$) სიმრავლიდან შედგება ორ ($k=2$) ელემენტისანი 6 ჯუფთება: $[a,b]$; $[a,c]$; $[a,d]$; $[b,c]$; $[b,d]$ და $[c,d]$.

ჯუფთებათა რაოდენობის აღნიშვნასა და გამოსათვლელ ზოგად წესს ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ.

ოთხ ($n=4$) ელემენტისანი $\{a,b,c,d\}$, სიმრავლიდან შედგება $k=4$ ელემენტისანი 24 წყობა. ისინი მხოლოდ ელემენტების გადანაცვლებით მიიღებიან: (a,b,c,d) , (b,a,c,d) და ა.შ. (თუ არ გჯერათ, შეამოწმეთ!) მათ *გადანაცვლებებს* უწოდებენ. გადანაცვლებათა რაოდენობის აღნიშვნისა და გამოთვლის ზოგად წესს ქვემოთ შემოგთავაზებთ.

კომბინატორიკის ზოგადი წესები

n -ელემენტისანი სიმრავლის ყოველ k -ელემენტისანი ისეთ ქვესიმრავლეს, რომლის ელემენტების ადგილების შეცვლა ქვესიმრავლეს არ ცვლის (ანუ ელემენტების დალაგებას მნიშვნელობა არ ენიჭება), n ელემენტიდან აღებული k -ელემენტისანი ჯუფთება ეწოდება; n -ელემენტისანი სიმრავლის ყველა k -ელემენტისანი ჯუფთებათა რიცხვი აღინიშნება C_n^k სიმბოლოთი და გამოითვლება ფორმულით

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k}$$

n-ელემენტის სიმრავლის k-ელემენტის ყოველ დალაგებულ ქვესიმრავლეს n ელემენტიდან აღებული k-ელემენტის წყობა ეწოდება.

n-ელემენტის სიმრავლის ყველა k-ელემენტის წყობათა რიცხვი, რომელიც აღინიშნება A_n^k სიმბოლოთი, გამოითვლება ფორმულით

$$A_n^k = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

n-ელემენტის სიმრავლის n-ელემენტის წყობას გადანაცვლება ეწოდება.

n-ელემენტის სიმრავლის ყველა გადანაცვლებათა რიცხვი აღინიშნება P_n სიმბოლოთი და გამოითვლება ფორმულით

$$P_n = n! \quad (n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1); 0! = 1; 1! = 1).$$

ვთქვათ k_1, k_2, \dots, k_m არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია,

ამასთან $\sum_{i=1}^m k_i = n$ წარმოვიდგინოთ n-ელემენტის A სიმრავლე, შესაბამისად, k_1, k_2, \dots, k_m -ელემენტის A_1, A_2, \dots, A_m სიმრავლეების გაერთიანების სახით. A სიმრავლის ასეთ ჯგუფებად ყველა შესაძლო დაყოფათა რიცხვი აღინიშნოს $C_n(k_1, k_2, \dots, k_m)$ და იგი განისაზღვრება ფორმულით

$$C_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

ვთქვათ, n-ელემენტის A სიმრავლე დაყოფილია

შესაბამისად n_1, n_2, \dots, n_k ($\sum_{i=1}^m n_i = n$)-ელემენტის სიმრავლეებად

და B არის A სიმრავლის m-ელემენტის ქვესიმრავლე, რომელიც შეიცავს A_1 სიმრავლის m_1 ელემენტს, A_2 სიმრავლის m_2 ელემენტს და ა.შ. A_k სიმრავლის m_k ელემენტს

($\sum_{i=1}^m m_i = m$). მოცემული n-ელემენტის A სიმრავლიდან ყველა

ასეთ m-ელემენტის B ქვესიმრავლეთა რიცხვი, კომბინა-

ტორიკის ძირითადი პრინციპის მიხედვით, ტოლია $C_{n_1}^{m_1} \times C_{n_2}^{m_2} \times \dots \times C_{n_x}^{m_x}$

საკვარჯიშოები

დაამტკიცეთ:

$$1. C_m^n = \frac{A_m^n}{P_n} = \frac{m!}{(m-n)!n!} = \frac{P_m}{P_{m-n} \cdot P_n}$$

$$2. C_m^n = C_m^{m-n}$$

მითითება ამ ტოლობის სამართლიანობა ცხადია, რადგან

$$C_m^n = \frac{m!}{[m-(m-n)]!(m-n)!} = \frac{m!}{n!(m-n)!} C_m^{m-n}$$

შენიშვნა: გადანაცვლების, წყობის და ჯუფთების გამოსაანგარიშებლად, შესაბამისად, ვისარგებლებთ ფორმულებით:

$$P_m = m!; A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!} = \frac{P_m}{P_{m-n}}; C_m^n = C_m^{(m-n)} = \frac{m!}{(m-n)!n!} = \frac{P_m}{P_{m-n} \cdot P_n}.$$

3. ერთ მერხზე 5 მოსწავლე უნდა დაჯდეს. რამდენი სხვადასხვა დაჯდომაა შესაძლებელი?

4. რამდენი ოთხნიშნა რიცხვი შეიძლება დაიწეროს შემდეგი ციფრებით: 0;1;2;3?

მითითება: ოთხი ციფრისაგან შესაძლებელ ყოველგვარ გადანაცვლებათა რაოდენობას უნდა გამოვაკლოთ 0-ით დაწყებულ გადანაცვლებათა რაოდენობა.

5. სივრცეში სიბრტყის მდებარეობა 3 წერტილით ისაზღვრება. რამდენი სხვადასხვა სიბრტყე შეიძლება გავავლოთ: 1) 4; 2) 7; 3) 10; 4) 6 წერტილზე, თუ ამ წერტილთა არც ერთი სამეული ერთ სწორ ხაზზე არ მდებარეობს და არც ერთი ოთხეული არაა ერთ სიბრტყეზე მოთავსებული?

6. 32 კარტიდან ვარაუდით ვიღებთ ოთხ-ოთხ კარტს. კარტების ამოღების რამდენი სხვადასხვა შემთხვევა შეიძლება იყოს?

7. რამდენი სხვადასხვა გადანაცვლება შეიძლება 1; 2; 3; 4; 5; 6 ციფრებისაგან მოვახდინოთ ისეთი, რომ თი-

თოეული გადანაცვლება იწყებოდეს ციფრი 4-იანით? ციფრებით 45? ციფრებით 456?

8. კლასში 32 მოსწავლეა, მათგან 6 მოსწავლე პირველ მერხზე უნდა დავსვათ. რამდენი სხვადასხვა შემთხვევაა შესაძლებელი, თუ სახეში მივიღებთ მხოლოდ მოწაფეთა გვარებს და არა მათ თანმიმდევრობას ჯდომის დროს?

9. გამოთვალეთ: ა) $\frac{6!-4!}{3!}$; ბ) $\frac{P_6 - P_5}{5!}$; გ) $\frac{A_8^5 - A_8^4}{A_8^3}$;


10. ამოხსენით განტოლება $C_x^2 = 153$;

11. დაამტკიცეთ, რომ $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ ბ) $A_n^k = \frac{C_n^m}{m!}$

კომბინატორიკის მარტივი სქემები


სასწავლო მიზნით ზოგჯერ სასარგებლოა შემდეგი მარტივი სქემების მიმოხილვა **ხისებრი დიაგრამის (დენდოგრამის)** გამოყენებით, მაგალითად:

ა) დენდოგრამით გამოსახულია შესაბამისად, ერთი და ორი „მონეტის“ სიბრტყეზე დაგდების შესაბამისი შესაძლო შედეგების სიმრავლე:




სულ 2 მოსალოდნელი შედეგია. ისინი ქმნიან სიმრავლეს $\Omega = \{ბ, ს\}$

შენიშვნა: (ბ) აღნიშნავს მონეტის ზედა მხარეზე ბორჯღალის დაფიქსირებას, (ს) კი – საფასურისას.



სულ 4 მოსალოდნელი შედეგია. ისინი ქმნიან სიმრავლეს: $\Omega = \{(ბ,ბ), (ბ,ს), (ს,ბ), (ს,ს)\}$


ბ) დენდოგრამით მოცემულია კამათელის გაგორების შემთხვევაში შესაბამისი შესაძლო „მარტივი“ შედეგების (ქულების) სიმრავლე:



სულ 6 მოსალოდნელი შედეგია. ისინი ქმნიან სიმრავლეს: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. ერთი აღნიშნავს კამათელზე 1-იანის მოსვლის ფაქტს, 2-ორიანის მოსვლის ფაქტს და ა.შ.

დავალება. შეადგინეთ ორი კამათელის ერთდროულად გაგორების (ან ერთი კამათელის ორჯერ გაგორების შესაბამისი ხისებრი გრაფი (დენდოგრამა). ჩაწერეთ და დათვალეთ მოსალოდნელი შედეგები (რიცხვთა წყვილები).

შემთხვევითი ამოკრეფა პოპულაციიდან ყუთის მარტივად



ვთქვათ, ყუთში 1-დან M რიცხვამდე გადანომრილი ერთნაირი ბურთულაა. ალაღბედზე სათითაოდ იღებენ n ბურთულას. ყოველი i -ური ამოღების შემდეგ აფიქსირებენ ამოღებული ბურთულის


ნომერს, აღნიშნოთ ეს ნომერი a_i -ით ($i=1, \dots, n$). ყუთში ბურთულები ქმნიან პოპულაციას, რომლის მოცულობაა M პოპულაციის ელემენტების (ობიექტების) რაოდენობას (M -ს) პოპულაციის მოცულობას უწოდებენ. ითვლება, რომ ყუთიდან ცალკეული ბურთულის ამოღება, ალაღბედზე (ანუ შემთხვევით) ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცალკეული ამოღების წინ ბურთულებს კარგად გადაურევენ ერთმანეთში და შემდეგ ალაღბედზე იღებენ ბურთულას. შემდეგ აფიქსირებენ ამოღებული ბურთულის

ნომერს. პირველი ამოღების შედეგად დაფიქსირდება a_1 რიცხვითი ნომერი. a_1 არის ან $1, 2, 3, \dots, M$ -ის ტოლი ($a_1 \in \{1, 2, 3, \dots, M\}$ -ს), შემდეგი ამოღების შედეგად დაფიქსირდება ბურთულის a_2 რიცხვითი ნომერი. თუ რა რიცხვითი სიმრავლიდან შეიძლება იყოს აღებული ეს a_2 რიცხვი, ეს ფაქტი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი წესით ხდება ყუთიდან ყოველი მომდევნო ბურთულის ალაღბედზე ამოღება. ყუთიდან (ანუ M -მოცულობიანი პოპულაციიდან) ალაღბედზე n -ჯერ ბურთულის ამოკრეფის a_1, a_2, \dots, a_n შედეგს ეწოდება მოცემული პოპულაციიდან **შემთხვევითი შერჩევა** ან **შემთხვევითი ამოკრეფა** (როგორც არსებითი სახელი „შენარჩევი“, „ამონაკრეფი“, და არა როგორც „პროცესი“ და „ქმედება“). n არის შემთხვევითი შერჩევის (შემთხვევითი ამონაკრეფის) მოცულობა.

შეიძლება განიხილებოდეს ყუთიდან n ბურთულის ერთდროული შემთხვევითი შერჩევაც.

განასხვავებენ ყუთიდან (პოპულაციიდან) შემთხვევით ამოკრეფას დაბრუნებით და შემთხვევით ამოკრეფას დაბრუნების გარეშე.

შემთხვევითი ამოკრეფა დაბრუნებით



შემთხვევითი ამოკრეფა (როგორც პროცესი) დაბრუნებით ხდება მაშინ, როდესაც ყუთიდან ალაღბედზე ბურთულის ყოველი მომდევნო ამოღების წინ ნომრის დაფიქსირების შემდეგ ამ ბურთულას ისევ ყუთში აბრუნებენ.

ყუთში ბურთულებს კარგად აურევენ ერთმანეთში და შემდეგ ალაღბედზე ამოკრეფის პროცესი ისევ გრძელდება. ამ შემთხვევაში შემთხვევით a_1, a_2, \dots, a_n ამონაკრეფში a_i ($i=1, \dots, n$) შემთხვევითი რიცხვები შეიძლება განმეორდნენ და თითოეული მათგანი $\{1, 2, \dots, M\}$ რიცხვითი სიმრავლიდანაა შემთხვევით არჩეული, ანუ $a_i \in \{1, 2, \dots, M\}$ ($i=1, \dots, n$), სადაც n ნებისმიერი

ნატურალური რიცხვია, ამასთან, ან $n < M$, ან $n = M$ ან $n > M$.

საზოგადოდ, განასხვავებენ დალაგებულ ამონაკრევს და დაულაგებელ ამონაკრევს. დალაგებული ამონაკრევი აღინიშნება (a_1, a_2, \dots, a_n) სიმბოლოთი, ხოლო დაულაგებელი – $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ სიმბოლოთი.

კონკრეტულ შემთხვევით ამონაკრევს შეიძლება შევუსაბამოთ კონკრეტული ელემენტარული ხდომილობა.

❖ დაბრუნებითი დალაგებული შემთხვევითი ამონაკრების შემთხვევაში ყველა შესაძლო n მოცულობიანი შემთხვევითი ამონაკრევი ქმნის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს:

$$\Omega = \{ \omega : \omega = (a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i = 1, 2, \dots, M, i = 1, \dots, n \}.$$


ყველა შესაძლო ელემენტარული ხდომილობათა რაოდენობა, რომელიც აღინიშნება $m(\Omega)$ -ით, ტოლი იქნება M^n -ის ($m(\Omega) = M^n$).

❖ დაბრუნებითი დაულაგებელი ამონაკრევის შემთხვევაში ყველა შესაძლო n მოცულობიანი შემთხვევითი ამონაკრევი ქმნის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს:

$$\Omega = \{ \omega : \omega = [a_1, a_2, \dots, a_n] : a_i = 1, 2, \dots, M, i = 1, \dots, n \}$$

ცნობილია, რომ ყველა შესაძლო ელემენტარული ხდომილობების რაოდენობა $m(\Omega) = C_{m+n-1}^n$ -ის.

შემთხვევითი ამოკრევა დაბრუნების გარეშე



შემთხვევითი ამოკრევა (როგორც პროცესი) დაბრუნების გარეშე ხდება მაშინ, როდესაც ყუთიდან ალაღბედზე ყოველი მომდევნო ბურთულის ამოღების წინ ამოღებულ ბურთულას უკან ყუთში აღარ აბრუნებენ. ამ შემთხვევაში $1 < n \leq M$.

❖ დაბრუნების გარეშე დალაგებული ამოკრევის შემთხვევაში n მოცულობიანი ამონაკრევი ქმნის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს:

$$\Omega = \{\omega: \omega = (a_1, a_2, \dots, a_n): a_i \neq a_j, i \neq j, a_i = 1, 2, \dots, M, i, j = 1, \dots, n\}.$$

ყველა შესაძლო ელემენტარული ხდომილობების რაოდენობა $m(\Omega) = A_M^n$ -ის.

❖ დაბრუნების გარეშე დაულაგებელი ამოკრევის შემთხვევაში n მოცულობიანი ამონაკრევი ქმნის ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეს:

$$\Omega = \{\omega: \omega = [a_1, a_2, \dots, a_n]: a_i \neq a_j, i \neq j, a_i = 1, 2, \dots, M, i, j = 1, \dots, n\}.$$

ყველა შესაძლო ელემენტარული ხდომილობების რაოდენობა $m(\Omega) = C_M^n$ -ის.

დავალება: კამათელის ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ და ხუთჯერ გაგორების შედეგები განიხილეთ ყუთის ზემოთ აღწერილი იმ სქემის სახით, რომელსაც თქვენ თვლით შესაბამისად მიზანშეწონილად და თითოეულ შემთხვევაში გამოთვალეთ ელემენტარული ხდომილობების რაოდენობა (მითითება: $M=6; n=1, 2, 3, 4, 5$).

§3. ალბათობის სტატისტიკური, კლასიკური და გეომეტრიული განსაზღვრა

ერთსა და იმავე პირობებში ჩატარებულ N ცდაში რაიმე A ხდომილობის მოხდენის K რიცხვის ფარდობას ცდათა რიცხვთან, ხდომილობის ფარდობითი სიხშირე ეწოდება, აღინიშნება $W_m(A)$ სიმბოლოთი, ე.ი.

$$W_N(A) = \frac{K}{N};$$

როდესაც ცდათა N რიცხვი საკმაოდ დიდია, A ხდომილობის $W_N(A)$ ფარდობით სიხშირეს დებულობენ A ხდომილობის ალბათობად, რომელსაც აღნიშნავენ $P(A)$ სიმბოლოთი, ე.ი.

$$P(A) \approx \frac{K}{N} \quad (3.1)$$


(3.1) არის ალბათობის სტატისტიკური განსაზღვრა.

თუ Ω ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე შედგება თანაბრად შესაძლებელ ელემენტარულ ხდომილობათა სასრული რაოდენობისაგან, მაშინ A ხდომილობის ($A \subset \Omega$), $P(A)$ ალბათობა განისაზღვრება ფორმულით:

$$P(A) = \frac{m(A)}{n}, \quad (3.2)$$

სადაც $m(A)$ არის A ხდომილობის ხელისშემწეობ ელემენტარულ ხდომილებათა რაოდენობა, ხოლო n - ცდის ყველა შესაძლო ელემენტარულ ხდომილობათა რაოდენობა ($n = m(\Omega)$)

(3.2) არის ალბათობის კლასიკური განსაზღვრა.



ვთქვათ, რაიმე Ω არეში შემთხვევით ვირჩევთ წერტილს. ალბათობა იმისა, რომ წერტილი მოხვდება A არეში, $A \subset \Omega$, გამოითვლება ფორმულით:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad (3.3)$$

სადაც $|A|$ და $|\Omega|$ აღნიშნავენ შესაბამისად A და Ω არეების ზომებს. ისინი რიცხვით ღერძზე მონაკვეთების სიგრძეებია, საკოორდინატო სიბრტყეზე – ფართობებია, ხოლო სივრცეში – მოცულობებია.

(3.3) არის ალბათობის გეომეტრიული განსაზღვრა.

§4. ხდომილობათა ჯამის ალბათობა. საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა

ნებისმიერი ორი A და B ხდომილობის ჯამის ალბათობა გამოითვლება ფორმულით:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) \quad (4.1)$$

თუ A და B ხდომილობები უთავსებადია, მაშინ $P(A \cdot B) = P(\emptyset) = 0$ და $P(A+B) = P(A) + P(B)$.

ერთობლივ დამოუკიდებელი A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობებისათვის მართებული შემდეგი ფორმულა:

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \dots \overline{A_n}) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i}) \quad (4.2)$$

თუ A_1, A_2, \dots, A_n წყვილ-წყვილად უთავსებადი ხდომილობებია, მაშინ

$$P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (4.3)$$

საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა გამოითვლება ფორმულით:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \quad (4.4)$$

§5. პირობითი ალბათობის ფორმულა. ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა

A ხდომილობის პირობითი ალბათობა იმ პირობით, რომ B ხდომილობას ადგილი უკვე ჰქონდა, აღინიშნება $P(A|B)$ ან $P(A \cap B)$ სიმბოლოთი და ეწოდება გამოსახულებას:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}, \text{ თუ } P(B) \neq 0 \quad (5.1)$$

ანალოგიურად განისაზღვრება $P(B|A)$, როცა $P(A) \neq 0$ ცხადია, A და B ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობის გამოსათვლელ ფორმულას ექნება სახე

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) P(A|B) \quad (5.2)$$

B ხდომილობა არაა დამოკიდებული A ხდომილობაზე, თუ $P(B|A) = P(B)$ რაც იმას ნიშნავს, რომ A ხდომილობის მოხდენა ან არმოხდენა გავლენას არ ახდენს ხდომილობის ალბათობაზე. ამ შემთხვევაში არც A ხდომილობაა დამოკიდებული B -ზე და ვწერთ

$$P(A \cdot B) = P(A) P(B) \quad (5.3)$$

თუ A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ დამოკიდებულია აგრეთვე ხდომილობებიც: \overline{A} და B , A და \overline{B} , \overline{A} და \overline{B} .

A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობებს ეწოდებათ ერთობლივად დამოუკიდებელი, თუ ამ სისტემის ნებისმიერი k ხდომილობის ($1 < k \leq n$) თანაკვეთის (ნამრავლის ალბათობა შესაბამისად, მათი ალბათობების ნამრავლის ტოლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ $i_1 < \dots < i_k \leq n$ და $k=2 \dots n$ ნატურალური რიცხვებისათვის სრულდება ტოლობა

$$P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}) \quad (5.4)$$

თუ ეს ფორმულა მართებულია მხოლოდ $k=2$ მნიშვნელობისათვის, მაშინ A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობებს წყვილ-წყვილად დამოუკიდებელი ხდომილობები ეწოდებათ.

ე.ი. A_1, A_2, \dots, A_n წყვილ-წყვილად დამოუკიდებელი ხდომილობებია, თუ ამ სისტემის ხდომილობათა ნებისმიერი წყვილი ურთიერთდამოუკიდებელი ხდომილობაა.

ჩაიწერება:

$$P(A_i \cdot A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j), \quad i \neq j, \quad i = \overline{1, n}; \quad j = \overline{1, n}$$

(5.4)-დან ვღებულობთ შედეგებს:

თუ A_1, A_2, \dots, A_n ერთობლივ დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ ერთობლივ დამოუკიდებელი იქნება აგრეთვე მოცემული სისტემიდან ზოგიერთი ან ყველა ხდომილობის საწინააღმდეგო ხდომილობით შეცვლილ მიღებული სისტემაც.

თუ A_1, A_2, \dots, A_n ერთობლივ დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i) \quad (5.5)$$

A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობების ერთობლივი დამოუკიდებლობიდან გამომდინარეობს მისი ნებისმიერი ქვესისტემის ერთობლივი დამოუკიდებლობა და ცხადია, წყვილ-წყვილად დამოუკიდებლობაც.

საწინააღმდეგო დებულება არ არის მართებული, ანუ თუ A_1, A_2, \dots, A_n წყვილ-წყვილად დამოუკიდებელი ხდომილობებია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ერთობლივ დამოუკიდებლები იქნებიან. ნათქვამის საილუსტრაციოდ, განვიხილოთ *ბერნშტეინის მაგალითი*.

წესიერი ტეტრაედრის სამწახნაგზე აწერია თითო რიცხვი: 1, 2 ან 3, ხოლო მეოთხე წახნაგზე აწერია სამივე ეს რიცხვი ერთად. A_k აღნიშნავს ხდომილობას, რომელიც შეესაბამება იმ ფაქტს, რომ ბრტყელ ზედაპირზე დაგდებული ტეტრაედრი დაეცემა წახნაგზე, რომელსაც აწერია რიცხვი k . $k=1,2,3$. გამოვიკვლიოთ A_1, A_2, A_3 ხდომილობების წყვილ-წყვილად დამოუკიდებლობის და ერთობლივ დამოუკიდებლობის საკითხი.

წესიერი ტეტრაედრი ერთგვაროვანი მასალისგან არის დამზადებული.

ამიტომ $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$,

რადგან ტეტრაედრს აქვს 4 წახნაგი და რიცხვი 1-იანი, 2-იანი და 3-იანი აწერია 2 წახნაგზე. ცხადია აგრეთვე,

რომ: $P(A_1 \cdot A_2) = \frac{1}{4}$, $P(A_1 \cdot A_3) = \frac{1}{4}$, $P(A_2 \cdot A_3) = \frac{1}{4}$, ამიტომ სრულდება პირობა:


$P(A_1 \cdot A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$, $P(A_1 \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$,
 $P(A_2 \cdot A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$. აქედან გამომდინარეობს, რომ A_1, A_2, A_3 ხდომილობები წყვილ-წყვილად დამოუკიდებლები არიან.

ახლა შევამოწმოთ, A_1, A_2, A_3 არიან თუ არა ერთობლივ დამოუკიდებელი ხდომილობები. A_1, A_2, A_3 ხდომილობების ერთობლივ მოხდენას ხელს უწყობს ტეტრაედრის 4 წახნაგიდან მხოლოდ ერთი წახნაგი რიცხვებით: 1,2,3, ამიტომ: $P(A_1, A_2, A_3) = \frac{1}{4}$, მაგრამ:

$$P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

ამრიგად, $P(A_1, A_2, A_3) \neq P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$.

ეს ნიშნავს, რომ ხდომილობები A_1, A_2, A_3 ერთობლივ დამოუკიდებლები არ არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წყვილ-წყვილად დამოუკიდებლები იყვნენ.



§6. სრული ალბათობისა და ბაიესის ფორმულები

თუ H_1, H_2, \dots, H_n ხდომილობები ქმნიან ხდომილობათა სრულ ჯგუფს და $P(H_i) \neq 0, i=1, \dots, n$, მაშინ ნებისმიერი A ხდომილობისათვის, რომელსაც ცდის შედეგად შეიძლება ადგილი ექნეს რომელიმე $H_i (i=1, \dots, n)$ ხდომილობასთან ერთად, სრულდება ტოლობები:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i) \quad (6.1)$$

$$P(H_k | A) = \frac{P(H_k)P(A|H_k)}{\sum_{i=1}^n P(H_i)P(A|H_i)}, \quad k=1, \dots, n \quad (6.2)$$

(6.1) არის სრული ალბათობის ფორმულა,
 (6.2) – ბაიესის ფორმულა.

§7. დამოუკიდებელ ცდათა სქემა

ვთქვათ, ცდას ვატარებთ ერთსა და იმავე პირობებში n -ჯერ და თითოეულ ცდას გააჩნია მხოლოდ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგი: „წარმატება“ (რაიმე ხდომილობის მოხდენა), „მარცხი“ \bar{A} (A ხდომილობის არ-მოხდენა). შემოვიღოთ ხდომილობები $\bar{A}_i = \{i\text{-ურ ცდაში ადგილი აქვს „წარმატებას“}\}$, მაშინ $\bar{A}_i = \{i\text{-ურ ცდაში ადგილი აქვს „მარცხს“}\}$, $i=1, 2, \dots, n$, რომელთა ალბათობები აღვნიშნოთ შესაბამისად $P(A_i)$ და $P(\bar{A}_i)$ -ით.

თუ ყოველ ცდაში „წარმატების“ ალბათობა არის მუდმივი არაუარყოფითი სიდიდე $P(A_i) = p, i=1, \dots, n$ და A_1, A_2, \dots, A_n ხდომილობები ერთობლივად დამოუკიდებლები არიან, მაშინ ვამბობთ, რომ გვაქვს დამოუკიდებელ ცდათა ბერნულის სქემა.

ცხადია:

$$P(\bar{A}_i) = 1 - P(A_i) = 1 - p = q, \quad i=1, \dots, n \quad \text{და} \quad p + q = 1$$

ალბათობა იმისა, რომ n დამოუკიდებელ ცდაში „წარმატებას“ ადგილი ექნება k -ჯერ და არ ექნება ადგილი $(n-k)$ -ჯერ, აღინიშნება $P_n(k)$ -ით და გამოითვლება ბერნულის ფორმულით

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}, k=0,1,\dots,n \quad (7.1)$$

k -ს იმ k_0 მნიშვნელობას, რომლისთვისაც (7.1) ფორმულით გამოთვლილი $P_n(k)$ ალბათობა უდიდესია, ეწოდება A ხდომილობის მოხდენის („წარმატების“), უაღბათესი რიცხვი.

თუ $(n+1)p$ წილადია, მაშინ k_0 გამოითვლება ფორმულით

$$k_0 = [(n+1)p], \quad (7.2)$$

სადაც $[x]$ აღნიშნავს რიცხვის მთელ ნაწილს. თუ სიდიდე $(n+1)p$ მთელია, მაშინ k_0 დებულობს ორ მნიშვნელობას:

$$k_0 = (n+1)p - 1 \quad k_0 = (n+1)p \quad (7.3)$$

როდესაც $0 < p < 1$ n დიდი რიცხვია, ისეთი რომ $np > 10$; მაშინ (7.1) ფორმულით სარგებლობა შრომატევადი ხდება, ამიტომ ამ შემთხვევაში უფრო მოსახერხებელია ვისარგებლოთ შემდეგი მიახლოებითი ფორმულებით:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \phi(x), \quad (7.4)$$

$$\text{სადაც } x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \quad \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (\phi(x) - \text{ლაპლასის}$$

ფუნქციაა).

როდესაც A იშვიათი ხდომილობაა (p მცირე რიცხვია), ხოლო n დიდი რიცხვია ($n \rightarrow \infty$), მაშინ:

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{n!} e^{-\lambda}, \quad (7.5)$$

სადაც $p = p_n \rightarrow 0$, თუ $n \rightarrow \infty$ და $\lambda = np$. $\phi(x)$ ფუნქციისა და (7.5) ფორმულით გამოსახული $P_n(k)$ -ს მნიშვნელობები მოცემულია შესაბამისად დანართის I და III ცხრილებში, ამასთან (7.4) ფორმულით სარგებლობა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ $np > 10$; თუ $np \leq 10$, უკეთეს მიახლოებას იძლევა (7.5) ფორმულა.

(7.4) არის მუავრ-ლაპრასის ლოკალური ზღვრული ფორმულა, ხოლო (7.5)-პუასონის ფორმულა.

აღბათობა იმისა, რომ n ჩატარებულ ცდაში „წარმატებათა“ (სასურველი A ხდომილობის მოხვლათა) k რიცხვი მოთავსებული იქნება $[k_1, k_2]$ შუალედში, გამოითვლება ფორმულით

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k} \quad (7.6)$$

სადაც k_1 და k_2 დადებითი მთელი რიცხვებია.

თუ n დიდი რიცხვია, მაშინ ამ აღბათობის გამოსათვლელად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიახლოებითი ფორმულები:

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0 \left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} \right) - \Phi_0 \left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} \right) \quad (7.7)$$

სადაც

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

ამასთან, $npq > 9$, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ $np \leq 10$

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (7.8)$$

($\Phi_0(x)$ ფუნქციისა და (7.8) ფორმულით განსაზღვრული $\sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ გამოსახულების მნიშვნელობები მოცემულია შესაბამისად II და IV ცხრილებში.

(7.7) არის მუავრ-ლაპლასის ინტერგალური ზღვრული ფორმულა, ხოლო (7.6) და (7.8) მიიღებიან შესაბამისად (7.1) და (7.5) ფორმულებიდან.

§8. უმთხვევითი სიდიდე. უმთხვევითი სიდიდის აღბათობების განაწილების კანონი, განაწილების ფუნქცია და სიმკვრივე. მაბალითები.

Ω ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცეზე განსაზღვრულ $\xi = \xi(\omega)$ ფუნქციას ეწოდება უმთხვევითი სიდიდე, თუ ნებისმიერი x რიცხვისათვის სიმრავლე $A = \{\omega: \xi(\omega) < x\} = \{\xi < x\}$ წარმოადგენს უმთხვევით ხდომილობას.

თუ $A = \{\xi < x\}$ არის შემთხვევითი ხდომილობა, მაშინ შემთხვევით ხდომილობებს წარმოადგენენ აგრეთვე სიმრავლეები:

$$\{\xi \leq x\}, \{\xi > x\}, \{\xi \geq x\}, \{a \leq \xi \leq x\}, \{a \leq \xi < b\},$$

$$\{a < \xi \leq x\}, \{a < \xi < x\},$$

სადაც a და b ($a < b$) ნამდვილი რიცხვებია.

ელემენტარულ ხდომილობათა Ω სივრცეზე განსაზღვრულ ორ ξ და η შემთხვევით სიდიდეს ეწოდება დამოუკიდებელი, თუ ნებისმიერი x და y რიცხვებისათვის ხდომილობები $A = \{\xi < x\}$ და $B = \{\eta < y\}$ დამოუკიდებელია.

$\xi_1 \dots \xi_n$ შემთხვევით სიდიდეებს ერთობლივ დამოუკიდებელი ეწოდებათ, თუ ნებისმიერი $a_1, a_2 \dots a_n$ რიცხვებისათვის ხდომილობები $A_1 = \{\xi < a_1\} \dots A_n = \{\xi < a_n\}$ ერთობლივ დამოუკიდებელია.

$\xi = \xi(\omega)$ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია ეწოდება

$$F_\xi(x) = P\{\omega: \xi(\omega) \leq x\}, \quad (-\infty < x < \infty) \text{ ფუნქციას.}$$

თუ Ω ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე დისკრეტულია, მაშინ სიმრავლე $\{\omega: \xi(\omega) \leq x\}$ ყოველთვის წარმოადგენს შემთხვევით ხდომილობას.

დისკრეტულ ელემენტარულ ხდომილობათა Ω სივრცეზე განსაზღვრულ $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$, შემთხვევით სიდიდეს დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდე ეწოდება.

დისკრეტული $\xi(\omega)$ შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობათა სიმრავლე სასრული ან თვლადი სიმრავლეა:

$X = \{x_1, x_2 \dots x_n\}$ ან $X = \{x_1 < x_2 \dots\} \cdot x_1 x_2 \dots x_n$ რიცხვებს დისკრეტული ξ შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობები ეწოდებათ.

აღბათობა იმისა, რომ ξ შემთხვევითი სიდიდე მიიღებს x_k მნიშვნელობას, ტოლია:

$$P_\xi(x_k) = P\{\omega: \xi(\omega) = x_k\} = P\{\xi = x_k\} = p_k, \quad k=1, 2, \dots \quad (8.1)$$

$$\text{ცხადია } \sum_{i=1}^{\infty} p_k = 1$$

თუ მოცემულია ξ შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო X_k , $k=1, 2, \dots$, მნიშვნელობებისა და მათი შესაბამისი P_k აღბათობების ერთობლიობა, ვიტყვით, რომ მოცემული

გვაქვს ξ დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილება.
 ξ დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილება მოიცემა შემდეგი ცხრილის სახით:

ξ	x_1	x_2	...	x_n	...
P_ξ	p_1	p_2	...	p_n	...

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1,$$

ცხრილის პირველ სტრიქონში ჩაწერილია ξ შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობები, ხოლო მეორე სტრიქონში ამ მნიშვნელობების შესაბამისი ალბათობები.

დისკრეტული განაწილების მახასიათებლები

1. ბერნულის განაწილება (პარამეტრით p).

ξ	0	1
P_ξ	p	$1-p$

$$0 < p < 1$$

2. ბინომიალური განაწილება (პარამეტრებით (n, k, p))

ξ	0	1	2	...	n
P_ξ	p_0	p_1	p_2	...	p_n

$$p_k = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad 0 < p < 1, \quad k=0,1,\dots,n.$$

3. პუასონის განაწილება (პარამეტრით λ)

ξ	0	1	2	...	n	...
P_ξ	p_0	p_1	p_2	...	p_n	...

$$p_k \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad k = 0, 1, \dots$$

შემთხვევით სიდიდეს ეწოდება უწყვეტი, თუ მისი განაწილების ფუნქცია შეიძლება მოცემულ იქნას შემდეგი სახით:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(x) dx, \quad (8.2)$$

სადაც $f_\xi(x)$ არაუარყოფითი ფუნქციაა.

ინტეგრალქვეშა $f_\xi(x)$ ფუნქციას ეწოდება ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე. ამასთან:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x) dx = 1.$$

(8.2) ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ:

$$f_\xi(x) = F_\xi'(x) = \frac{dF_\xi(x)}{dx}$$

უწყვეტი განაწილების მახასიათებელი

1. თანაბარი განაწილება $[a, b]$ ინტერვალზე

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{თუ } x \in [a, b] \\ 0, & \text{თუ } x \notin [a, b] \end{cases} \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

2. მაჩვენებლიანი განაწილება (λ პარამეტრით)

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{თუ } x > 0 \\ 0, & \text{თუ } x \leq 0, (\lambda > 0) \end{cases}$$

3. ნორმალური განაწილება (პარამეტრებით $(-a, \sigma^2)$)

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < a < +\infty, \quad \sigma > 0$$

ნორმალურ განაწილებას პარამეტრებით $(0; 1)$ სტანდარტული ნორმალური განაწილება ეწოდება და მისი განაწილების ფუნქციას აქვს სახე

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

$\Phi(x)$ ფუნქციასა და ლაპლასის $\Phi_0(x)$ (იხ.7.7) ფუნქციას შორის არის შემდეგი კავშირი:

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} + \Phi_0(x)$$

აღბათობა იმისა, ξ რომ შემთხვევითისიდიდე მიიღება მნიშვნელობებს $[a, b]$ ინტერვალდან, გამოითვლება ერთ-ერთი შემდეგი ფორმულით:

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = F_\xi(b) - F_\xi(a) \quad (8.3)$$

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = \int_a^b f_\xi(x) dx \quad (8.4)$$

განაწილების ფუნქციას აქვს შემდეგი თვისებები:

1. $0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$
3. განაწილების ფუნქცია არაკლებადი ფუნქციაა
4. განაწილების ფუნქცია მარცხნიდან უწყვეტია.

§9. ორი შემთხვევითი სიდიდის ერთობლივი განაწილება

განვიხილოთ ორგანზომილებიანი შემთხვევითი სიდიდე (ვექტორი) (ξ, η) , სადაც ξ და η დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებია, რომელთა განაწილებებს აქვს სახე:

ξ	x_1	x_2	...	x_m
P_ξ	p_1	p_2	...	p_m

$$p_i = P_\xi(x_i) = P\{\xi = x_i\}, \quad i=1, \dots, m \quad (9.1)$$

η	y_1	y_2	...	y_n
P_η	q_1	q_2	...	q_n

$$q_j = P_\eta(y_j) = P\{\eta = y_j\}, \quad j=1, \dots, n \quad (9.2)$$

(ξ, η) შემთხვევითი სიდიდის შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლე წარმოადგენს (x_i, y_j) $i=1, \dots, m, j=1, \dots, n$, ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა ერთობლიობას, რომელთა შესაბამისი აღბათობები განიმარტება შემდეგნაირად:

$$p_{ij} = p_{\xi\eta}(x_i, y_j) = P(\{\xi(\omega) = x_i\} \cap \{\eta(\omega) = y_j\}) = P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}$$

$i=1, \dots, m; j=1, \dots, n;$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P_{ij} = 1, \quad (9.3)$$

ორგანზომილებიანი (ξ, η) დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის (ვექტორის) განაწილების კანონი შეიძლება მოცემულ იქნას შემდეგი ცხრილის საშუალებით:

$\xi \backslash \eta$	y_1	y_2	\dots	y_n
x_1	P_{11}	P_{12}	\dots	P_{1n}
x_2	P_{21}	P_{22}	\dots	P_{2n}
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots
x_m	P_{m1}	P_{m2}	\dots	P_{mn}

(9.4)

სადაც P_{ij} ალბათობები აკმაყოფილებენ (9.3) ტოლობას.

თუ ვიცით შემთხვევითი (ξ, η) დისკრეტული ვექტორის (9.4) განაწილების კანონი, მაშინ შეიძლება მისი საშუალებით აღვადგინოთ ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების (9.1) და (9.2) განაწილების კანონები შემდეგი ფორმულების გამოყენებით:

$$p = P_{\xi}(x_i) = \sum_{j=1}^n P_{\xi\eta}(x_i, y_j), i = 1, \dots, m \quad (9.5)$$

$$q_j = P_{\eta}(y_j) = \sum_{i=1}^m P_{\xi\eta}(x_i, y_j), j = 1, \dots, n \quad (9.6)$$

ორგანზომილებიანი (ξ, η) შემთხვევითი ვექტორის, სადაც ξ და η უწყვეტი შემთხვევითი სიდიდეებია, განაწილების ფუნქცია (ანუ ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების ერთობლივი განაწილების ფუნქცია) $F_{\xi\eta}(x, y)$ ნებისმიერი x და y რიცხვებისათვის განისაზღვრება შემდეგნაირად:

$$F_{\xi\eta}(x, y) = P(\{\xi(\omega) < x\} \cap \{\eta(\omega) < y\}) = P\{\xi < x, \eta < y\} \quad (9.7)$$

სარგებლობენ შემდეგი განმარტებითაც:

თუ არსებობს ისეთი არაუარყოფითი $f_{\xi\eta}(x, y)$ ფუნქცია, რომ $F_{\xi\eta}(x, y)$ წარმოადგენს $F_{\xi\eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{\xi\eta}(u, v) du dv$ სახით

მაშინ ორგანზომილებიან (ξ, η) შემთხვევით ვექტორს უწოდებენ უწყვეტს, ხოლო $f_{\xi\eta}(x, y)$ მისი განაწილების სიმკვრივეს

$$\int_{-\infty-\infty}^{+\infty+\infty} f_{\xi\eta}(x, y) dx dy = 1 \quad (9.8)$$

უწყვეტი ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების განაწილების $F_\xi(x)$ და $F_\eta(y)$ სიმკვრივეები $F_{\xi\eta}(x,y)$ -ის საშუალებით გამოითვლება შემდეგი სახით:

$$f_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi\eta}(x, y) dy, f_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi\eta}(x, y) dx \quad (9.9)$$

ξ და η სიდიდეებს ეწოდებათ დამოუკიდებელი, თუ x და y ცვლადების ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის მათი ერთობლივი განაწილების ფუნქცია $F_{\xi\eta}(x,y)$ წარმოადგინება როგორც თითოეული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციათა ნამრავლი

$$F_{\xi\eta}(x, y) = F_\xi(x) \cdot F_\eta(y)$$

თუ (ξ, η) დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი ვექტორია, მაშინ ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების დამოუკიდებლობის პირობას წარმოადგენს ტოლობა

$$P_{ij} = p_i q_j, i=1, 2, \dots, m, j=1, 2, \dots, n \quad (9.10)$$

ხოლო უწყვეტი ტიპის ξ და η შემთხვევითი სიდიდეებისათვის

$$f_{\xi\eta}(x, y) = f_\xi(x) \cdot f_\eta(y) \quad (9.11)$$

§10. შებენიანი სიდიდის ფუნქცია

ვთქვათ, $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$ არის რაიმე შემთხვევითი სიდიდე, ხოლო $\varphi(x)$ - ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე განსაზღვრული ისეთი ფუნქცია, რომ $\eta = \varphi(\xi(\omega))$ აგრეთვე შემთხვევითი სიდიდეა. განვიხილოთ შემთხვევები:

1) არის (9.1) განაწილების კანონით განსაზღვრული დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდე. თუ $\eta = \varphi(\xi)$ შემთხვევითი ფუნქციის შესაძლო მნიშვნელობებია $\varphi_1 = \varphi(x_1) \dots \varphi_m = \varphi(x_m)$ ერთმანეთისაგან განსხვავებულია, მაშინ ხდომილობები $\{\omega: \xi(\omega) = x_i\}$ და $\{\omega: \eta(\omega) = y_i = \varphi(x_i)\}$ ტოლია და

$$p_i = P_\xi(x_i) = P\{\xi = x_i\} = P\{\eta = y_i\} = P_\eta(y_i), i=1 \dots m$$

ამიტომ η -ს განაწილებას აქვს სახე

$$\frac{\eta}{P_\eta} \left| \frac{y_1}{p_1} \dots \frac{y_n}{p_n} \right| \quad (10.1)$$

თუ $\eta = \varphi(\xi)$ შემთხვევითი ფუნქციის $y_1 = \varphi(x_1), \dots, y_n = \varphi(x_n)$ მნიშვნელობებს შორის არის ერთმანეთის ტოლი მნიშვნელობები, მაშინ ამ მნიშვნელობებს η -ს განაწილების კანონში წერენ ერთჯერ და შესაბამის ალბათობად იღებენ ტოლ მნიშვნელობათა შესაბამისი ალბათობის ჯამს.

2) ვთქვათ, ორი $\xi_1 = \xi_1(\omega)$ და $\xi_2 = \xi_2(\omega)$, $\omega \in \Omega$, დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონია შესაბამისად

$$\frac{\xi_1}{P_\xi} \left| \frac{x_1}{p_1} \dots \frac{x_n}{p_n} \right|, \quad p_i = P_{\xi_1}(x_i) = P\{\xi_1 = x_i\}, \quad i=1, \dots, m$$

და

$$\frac{\xi_2}{P_\xi} \left| \frac{y_1}{q_1} \dots \frac{y_n}{q_n} \right|, \quad q_j = P_{\xi_2}(y_j) = P\{\xi_2 = y_j\}, \quad j=1, \dots, n$$

მაშინ ξ_1 და ξ_2 შემთხვევით სიდიდეთა $\xi = \xi(\omega) = \varphi(\xi_1, \xi_2)$ ფუნქციის განაწილების კანონს ექნება სახე

$$\frac{\eta}{P_\eta} \left| \frac{z_{ij}}{p_{ij}} \right| = \frac{\varphi(x_i, y_j)}{P(\xi_1 = x_i, \xi_2 = y_j)}, \quad i=1, \dots, m; \quad j=1, \dots, n \quad (10.2)$$

დისკრეტული ξ_1 და ξ_2 შემთხვევით სიდიდეთა $\eta_1 = \varphi_1(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 + \xi_2$ ჯამის განაწილების კანონს ექნება სახე:

$$\frac{\eta_1}{P_{\eta_1}} \left| \frac{x_i + y_j}{p_{ij}} \right|, \quad p_{ij} = P(\xi_1 = x_i, \xi_2 = y_j) \quad (10.3)$$

დისკრეტული ξ_1 და ξ_2 შემთხვევითი სიდიდეთა $\xi_2 = \varphi_2(\xi_1 \cdot \xi_2) = \xi_1 \cdot \xi_2$ ნამრავლის განაწილების კანონს ექნება სახე:

$$\frac{\eta_2}{P_{\eta_2}} \left| \frac{x_i \cdot y_j}{p_{ij}} \right|, \quad i=1, \dots, m; \quad j=1, \dots, n \quad (10.4)$$

ξ_1 და ξ_2 დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებისათვის (10.3) და (10.4) განაწილებებში (9.10) ფორმულის საფუძველზე სათანადოდ შეიცვლება მხოლოდ p_{ij} ალბათობები p_i და q_j -თი.

ცხადია,

$$\frac{K_{\xi_1} | Kx_1 | \dots | Kx_m}{P_{\xi_1} | p_1 | \dots | p_m} = \frac{\xi_1^k | x_1^k | \dots | x_m^k}{P_{\xi_1} | p_1 | \dots | p_m} \quad (10.5)$$

3) ξ უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეა $f_{\xi}(x)$ განაწილების სიმკვრივით.

თუ $y = f(x)$ მონოტონური, უწყვეტი და დიფერენცირებადი ფუნქციაა, მაშინ $\eta = f(\xi)$ შემთხვევითი ფუნქციის განაწილების უცნობი სიმკვრივე $f_{\eta}(y)$ მოიძებნება შემდეგი ფორმულით:

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}(x) \left| \frac{d\varphi(y)}{dy} \right| = f_{\xi}(\varphi(y)) \left| \frac{d\varphi(y)}{dy} \right| \quad (10.6)$$

სადაც $x = \varphi(y)$ არის $y = \varphi(x)$ -ის შებრუნებული ფუნქცია.

თუ $y = \varphi(x)$ არაა მონოტონური, ანუ შებრუნებული $x = \varphi(y)$ ფუნქცია ცალსახა არაა, რაც ნიშნავს, რომ ერთსა და იმავე y -ს შეესაბამება x -ის რამოდენიმე მნიშვნელობა: $x_1 = \varphi_1(y), \dots, x_n = \varphi_n(y)$, მაშინ ვსარგებლობთ ფორმულით

$$f_{\eta}(y) = \sum_{i=1}^n f_{\xi}(\varphi_i(y) / \varphi'_i(y)) \quad (10.7)$$

§11. შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია

ξ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი აღინიშნება $M(\xi)$ სიმბოლოთი.

დისკრეტული ξ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი ეწოდება რიცხვს

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^n x_k p_k \quad (11.1)$$

თუ შემთხვევითი სიდიდე ღებულობს თვლადი რაოდენობის მნიშვნელობებს, მაშინ

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k \quad (11.2)$$

და მოითხოვება (11.2) მწკრივის აბსოლუტური კრებადობა.

უწყვეტი ξ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი ეწოდება რიცხვს

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx, \quad (11.3)$$

სადაც $f_{\xi}(x)$ არის ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე, ამასთან მოითხოვება, რომ (11.3) ინტერვალში იყოს აბსოლუტურად კრებადი.

თუ გავითვალისწინებთ §10-ს, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ:

$$M(\varphi(\xi)) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) P_{\xi}(x_i),$$

$$M[\varphi(\xi_1, \xi_2)] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(x_i, y_j) P(\xi_1 = x_i, \xi_2 = y_j),$$

სადაც ξ_1, ξ_2 დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებია. ანალოგიურად:

$$M(\varphi(\xi)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f_{\xi}(x) dx,$$

$$M(\varphi(\xi_1, \xi_2)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) f_{\xi_1 \xi_2}(x, y) dx dy,$$

სადაც ξ_1 და ξ_2 უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებია, ხოლო $f_{\xi_1 \xi_2}(x, y)$ - შემთხვევით სიდიდეთა ერთობლივი განაწილების სიმკვრივე.

ξ შემთხვევითი სიდიდის დისპერსია $D(\xi)$ ეწოდება $(\xi - M(\xi))^2$ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკურ ლოდინს

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2.$$

დისპერსია შეიძლება გამოთვლილი იქნას შემდეგი ფორმულით:

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M(\xi)^2 \quad (11.4)$$

ξ დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდისათვის დისპერსია გამოითვლება ფორმულით:

$$D(\xi) = \sum_{k=1}^n (x_k - M(\xi))^2 P_k = \sum_{k=1}^n x_k^2 P_k - \left(\sum_{k=1}^n x_k P_k \right)^2 \quad (11.5)$$

ხოლო უწყვეტისათვის

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(\xi))^2 f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx \right)^2 \quad (11.6)$$

თუ მოცემულია (ξ, η) შემთხვევითი ვექტორის ერთობლივი განაწილება, მაშინ ξ და η შემთხვევით სიდიდეების მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია გამოითვლება შემდეგი წესით:

ა) თუ დისკრეტული (ξ, η) ვექტორის განაწილება მოცემულია (9.4) სახით, მაშინ

$$m_{\xi} = M(\xi) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i P_{ij}, m_{\eta} = M(\eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j P_{ij} \quad (11.7)$$

$$\sigma_{\xi}^2 = D(\xi) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - m_{\xi})^2 P_{ij}, \sigma_{\eta}^2 = D(\eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (y_j - m_{\eta})^2 P_{ij}$$

ბ) თუ უწყვეტ (ξ, η) შემთხვევით ვექტორს გააჩნია განაწილების $f_{\xi\eta}(x, y)$ სიმკვრივე, მაშინ

$$m_{\xi} = M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi\eta}(x, y) dx dy, \quad \sigma_{\eta}^2 = D(\eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{\xi\eta}(x, y) dy, \quad (11.8)$$

$$\sigma_{\xi}^2 = D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - m_{\xi})^2 f_{\xi\eta}(x, y) dx dy,$$

$$\sigma_{\eta}^2 = D(\eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (y - m_{\eta})^2 f_{\xi\eta}(x, y) dx dy,$$

მათემატიკური ლოდინისა და დისპერსიის თვისებები:

1. თუ $c = \text{const}$, მაშინ $M(c) = c$;
2. თუ $c = \text{const}$, მაშინ $M(c\xi) = cM(\xi)$;
3. $M(\xi_1 + \xi_2) = M(\xi_1) + M(\xi_2)$;
4. თუ $c = \text{const}$, მაშინ $D(c) = 0$;
5. თუ $c = \text{const}$, მაშინ $D(c\xi) = c^2 D(\xi)$;
6. თუ ξ_1 და ξ_2 დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია, მაშინ:

$$M(\xi_1 \xi_2) = M(\xi_1) \cdot M(\xi_2);$$

§12. კოვარიაცია და კორელაციის კოეფიციენტი

ორი $\xi = \xi(\omega)$, $\eta = \eta(\omega)$ ($\omega \in \Omega$) შემთხვევითი სიდიდეებისათვის $M[(\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta))]$ გამოსახულებას ეწოდება ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების კოვარიაცია და აღინიშნება $\text{cov}(\xi, \eta)$ სიმბოლოთი.

$$\text{cov}(\xi, \eta) = M[(\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta))] = M(\xi, \eta) - M(\xi)M(\eta)$$

უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებისათვის კოვარიაციის გამოსათვლელ ფორმულას აქვს სახე:

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi, \eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M(\xi))(y - M(\eta)) f_{\xi\eta}(x, y) dx dy = \\ & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{\xi\eta}(x, y) dx dy + M(\xi) \cdot M(\eta), \end{aligned} \quad (12.1)$$

ხოლო დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებისათვის

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi, \eta) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_i - m_\xi)(y_j - m_\eta) p_{ij} = \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j P_{ij} - m_\xi m_\eta \end{aligned} \quad (12.2)$$

სიდიდეს $r_{\xi\eta} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}}$ ეწოდება ξ და η შემთხვევითი სიდიდეების კორელაციის კოეფიციენტი.

კორელაციის კოეფიციენტი გამოხატავს ξ და η შემთხვევით სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების ხარისხს. კერძოდ, რაც უფრო დიდია კორელაციის კოეფიციენტის მოდული, მით უფრო დიდია დამოკიდებულება ξ და η -ს შორის. თუ კორელაციის კოეფიციენტი უდრის ნულს, მაშინ ξ და η შემთხვევით სიდიდეებს არაკორელირებულები ეწოდება.

კორელაციის კოეფიციენტის თვისებები

1. კორელაციის კოეფიციენტის მოდული არ აღემატება ერთს, $|r_{\xi\eta}| \leq 1$.
2. თუ ξ და η დამოუკიდებელი შემთხვევითი სიდიდეებია, მაშინ $r_{\xi\eta} = 0$.
3. თუ ξ და η -ს შორის არსებობს წრფივი დამოკიდებულება, ე.ი. $\xi = a\eta + b$, $a, b = \text{const}$, მაშინ $|r_{\xi\eta}| = 1$.
4. $r_{\xi\eta} = -r_{\eta\xi}$

**§13. დიდ რიცხვთა კანონი. ჩებიშევის უტოლობა.
ჩებიშევის თეორემა, ბერნულის თეორემა**

ჩებიშევის I უტოლობა: თუ ξ შემთხვევით სიდიდეს გააჩნია სასრული მათემატიკური ლოდინი $M(\xi)$, მაშინ ნებისმიერი $\varepsilon > 0$ რიცხვისათვის, მართებულია უტოლობა

$$P(|\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{M|\xi|}{\varepsilon} \quad (13.1)$$

ჩებიშევის II უტოლობა: თუ ξ შემთხვევით სიდიდეს გააჩნია სასრული მათემატიკური ლოდინი $M(\xi)$ და დისპერსია $D(\xi)$, მაშინ ნებისმიერი $\varepsilon > 0$ რიცხვისათვის მართებულია უტოლობა

$$P(|\xi - M(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D|\xi|}{\varepsilon^2} \quad (13.2)$$

(13.1) და (13.2) უტოლობები საშუალებას იძლევიან შევაფასოთ შემთხვევითი სიდიდის გაბნევა.

ჩებიშევის უტოლობების გამოყენებით მტკიცდება თეორემები, რომლებიც ატარებენ დიდ რიცხვთა კანონის სახელს.

დიდ რიცხვთა კანონის ქვეშ გულისხმობენ იმ თეორემებს, რომელთაც აერთიანებთ ცდათა დიდი რიცხვის დროს საშუალო შედეგთა მდგრადობის იდეა.

ჩებიშევის თეორემა. ვთქვათ $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ შემთხვევითი სიდიდეები წყვილ-წყვილად დამოუკიდებელნი არიან და $D(\xi_i) \leq C, i=1, 2, \dots$, სადაც C ნებისმიერი მუდმივია. მაშინ ნებისმიერი $\varepsilon > 0$ რიცხვისათვის მოიძებნება რაგინდ მცირე $\delta > 0$ რიცხვი, ისეთი, რომ საკმაოდ დიდი n რიცხვისათვის შესრულდება პირობა

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(\xi_i)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \delta \quad (13.3)$$

ამ უტოლობაში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $0 < \delta < \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$, სადაც $D(X)$ არის X შემთხვევითი სიდიდის

დისპერსია, $(X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i)$.

ბერნულის თეორემა. ვთქვათ, m არის „წარმატებათა“ რიცხვით, n დამოუკიდებელ ცდაში, ხოლო ყოველ ცდაში „წარმატების“ ალბათობაა p , მაშინ ნებისმიერი $\varepsilon > 0$ რიცხვისათვის მოიძებნება ისეთი $\delta > 0$ რიცხვი, რომ საკმაოდ დიდი n -ებისათვის

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) > 1 - \delta \quad (13.4)$$

(ამასთან შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ $0 < \delta \leq \frac{pq}{n\varepsilon^2}$)

§14. ცენტრალური ზღვარითი თეორემა ერთნაირად განაწილებულ შემთხვევებში

ვთქვათ, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ დამოუკიდებელ ერთნაირად განაწილებულ შემთხვევით სიდიდეთა მიმდევრობაა, სასრული მათემატიკური ლოდინით $M(\xi_i) = m$ და დისპერსიით $D(\xi_i) = \sigma^2 > 0$ მაშინ, როცა $n \rightarrow \infty$, ნორმირებული

$\eta_n = \frac{\sum_{i=1}^n (\xi_i - m)}{\sigma\sqrt{n}}$ ჯამის განაწილების ფუნქცია მიისწრაფვის ნორმალური განაწილების ფუნქციისაკენ პარამეტრებით $(0; 1)$, ე.ი. ნებისმიერი x -სათვის

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\eta_n < x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (14.1)$$

საკმაოდ დიდი n -ებისათვის მართებულია შემდეგი მიახლოებითი ტოლობა:

$$P\{x_1 < \eta_n < x_2\} \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1) \quad (14.2)$$

Φ_0 ფუნქციის მნიშვნელობები გამოითვლება Π ცხრილის საშუალებით (იხ. დამატება). (14.2) ფორმულით შეიძლება გამოვთვალოთ η_n შემთხვევითი სიდიდის $[x_1, x_2]$ ინტერვალში ჩავარდნის ალბათობა.

თავი IV. დასკვნითი სტატისტიკის ელემენტები.

თეორიული მასალა

§1. შერჩევითი მეთოდი. პოლიბონი. ჰისტოგრამა

შერჩევითი მეთოდი არის ისეთი სტატისტიკური მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა დავადგინოთ რაიმე ობიექტთა ერთობლიობის ზოგადი თვისებები ამ ობიექტთა მხოლოდ რაღაც შემთხვევით ამოკრეფილი ნაწილის (რომელსაც *შემთხვევით შერჩევას* უწოდებენ) თვისებების შესწავლის საფუძველზე.

შემთხვევით შერჩევაზე წარმოდგენას იძლევა შემდეგი სქემა: ვთქვათ, ყუთში მოთავსებულია ფირფიტები ნომრებით X_1, X_2, \dots, X_N და ალაღბედზე ვიღებთ n ფირფიტას, რომელთა ნომრებიც აღმოჩნდა x_1, x_2, \dots, x_n .

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (15.1)$$

წარმოადგენს n მოცულობის შერჩევას X_1, X_2, \dots, X_N გენერალური ერთობლიობიდან. (პოპულაციიდან).

(15.1)-ს ეწოდება *შერჩევა დაბრუნებით*, თუ ყოველ ამოღებულ ფირფიტას ყუთში ვაბრუნებთ შემდეგი ფირფიტის ამოღებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი (ე.ი. თუ ამოღებულ ფირფიტას ყუთში არ ვაბრუნებთ) (15.1)-ს ეწოდება *შერჩევა დაბრუნების გარეშე*.

შემთხვევითი შერჩევა და შემთხვევითი ამოკრეფა სინონიმებია (შემდეგში შერჩევა).

ვთქვათ, (15.1) არის შერჩევა დაბრუნებით, მაშინ x_1, x_2, \dots, x_n წარმოადგენენ დამოუკიდებელ, ერთნაირად განაწილებულ შემთხვევით სიდიდეებს; თითოეული მათგანის განაწილების კანონი ემთხვევა იმ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონს, რომელიც ღებულობს მნიშვნელობებს X_1, X_2, \dots, X_N ერთი და იგივე $1/N$ -ის ტოლი ალბათობით. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ x_1, x_2, \dots, x_n წარმოადგენს ξ შემთხვევით სიდიდეზე n დამოუკიდებელი დაკვირვების შედეგს.

თუ (15.1) შერჩევის მნიშვნელობებს დავალაგებთ ზრდის მიხედვით, მივიღებთ ე.წ. *ვარიაციულ მწკრივს*

$$X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)} \quad (X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)})$$

ფუნქციას

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x \leq x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & \text{როცა } x_{(k)} \leq x \leq x_{(k+1)}, k = \overline{1, n-1} \\ 1, & \text{როცა } x > x_{(n)} \end{cases} \quad (15.2)$$

ეწოდება (15.1) შერჩევაზე დაფუძნებული *ემპირიული განაწილების ფუნქცია*.

იმ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია, რომლის განაწილების ფუნქციაც არის $F_n(x)$, გამოითვლებიან ფორმულებით:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k; \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{X})^2; \quad (15.3)$$

\bar{X} -ს ეწოდება შერჩევითი (ემპირიული) საშუალო, ხოლო S^2 -ს შერჩევითი (ემპირიული) დისპერსია.

ვთქვათ, (15.1) შერჩევაში გვაქვს r განსხვავებული მნიშვნელობა ($\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$); ამასთან, ξ_i შერჩევაში გვხვდება n_i -ჯერ ($i = \overline{1, r}, \sum_{i=1}^r n_i = n$); ფარდობას $\frac{n_i}{n}$ ეწოდება ξ_i მნიშვნელობის ფარდობითი სიხშირე და აღინიშნება w_i

სიმბოლოთი. ცხადია, $\sum_{i=1}^r w_i = 1$.

ცხრილს, რომელიც ამყარებს კავშირს შერჩევის ξ_i მნიშვნელობებსა და შესაბამის w_i ფარდობით სიხშირეებს შორის, ეწოდება ξ შემთხვევითი სიდიდის ფარდობით სიხშირეთა სტატისტიკური განაწილება. იგი მოიცემა შემდეგი სახით:

ცხრილი 4.1.

შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობა	ξ_1	ξ_2	...	ξ_r
ფარდობითი სიხშირეები w_{ξ_i}	w_1	w_2	...	w_r

თუ ξ უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეა, მაშინ მიზანშეწონილია მისი სტატისტიკური განაწილება. წარმოვადგინოთ შემდეგი ცხრილის სახით:

ცხრილი 4.2

ინტერვალები	$[y_1, y_2]$	$[y_2, y_3]$...	$[y_{e-1}, y_e]$
ინტერვალის შესაბამისი ფარდობითი სიხშირე	W_1	W_2	...	W_{e-1}

სადაც y_1, y_2, \dots, y_ℓ წარმოადგენს ξ შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობათა სიმრავლის დაყოფის წერტილებს, ხოლო W_i არის $[y_i, y_{i+1}]$ ინტერვალში ჩავარდნილ შერჩევის მნიშვნელობათა ფარდობითი სიხშირე.

თვალსაჩინოებისათვის დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის *სტატისტიკურ განაწილებას* წარმოადგენენ ე.წ. *პოლიგონის* სახით, რისთვისაც საკოორდინატო სიბრტყეზე აღნიშნავენ $(\xi_1, W_1), (\xi_2, W_2), \dots, (\xi_{r-1}, W_r)$ წერტილებს და აერთებენ წრფის მონაკვეთებით, უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეებისათვის კი აგებენ დიაგრამას, რომელსაც *ჰისტოგრამას* უწოდებენ.

ჰისტოგრამის აგებისას $y_i (i=1, \ell)$ დანაყოფებს იღებენ ისე, რომ $y_i - y_{i-1} = h$ ($i = \overline{2, \ell}$) სხვაობა მუდმივი იყოს (h -ს ეწოდება ცხრილის ბიჯი) და აგებენ ფუნქციას $y = \frac{W_i}{h}$, როცა $x \in]y_{i-1}, y_i[$, $i = \overline{2, \ell}$.

**§2. უცნობი პარამეტრისათვის შერჩევაზე დაფუძნებული წერტილოვანი შეფასებები.
კლასიფიკაცია და შეფასებათა მიღების მეთოდები**

ვთქვათ, ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვირივეა $f(x, \theta)$, სადაც θ უცნობი პარამეტრია. უცნობი θ *პარამეტრის შეფასება* ვუწოდოთ ξ შემთხვევით სიდიდეზე $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ დაკვირვებათა ნებისმიერ $\theta_n^* = \theta_n^*(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ფუნქციას. მას *სტატისტიკურ შეფასებასაც*

ეწოდებენ. იგი ეფუძნება დაკვირვების (ცდების) შედეგებს (მონაცემებს ან შერჩევებს).

სტატისტიკურ შეფასებას ეწოდება **წერტილოვანი შეფასება**, თუ იგი განისაზღვრება ერთი რიცხვითი მნიშვნელობით.

ცხადია, ნებისმიერი θ_n^* შეფასება შეუძლება არ იყოს ახლოს შესაფასებელ θ პარამეტრთან. იმისათვის, რომ უცნობი θ პარამეტრის θ_n^* შეფასება იყოს პრაქტიკულად **ღირებულად** („კარგი“) შეფასება, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პირობებს:

- სასურველია, რომ θ_n^* შეფასება არ იძლეოდეს სისტემატურ ცდომილებას, ე.ი. სრულდებოდეს პირობა:

$$M\theta_n^* (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \theta$$

იმ θ_n^* შეფასებას, რომელიც აკმაყოფილებს აღნიშნულ თვისებას, **გადაუადგილებადი, ჩაუნაცვლებელი** შეფასება ეწოდება.

- თუ n -ის ზრდასთან ერთად θ_n^* ალბათობით კრებადია θ -კენ, ე.ი.

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n^* (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \theta) = 1,$$

მაშინ θ_n^* -ს ეწოდება θ პარამეტრის **ძალდებული** შეფასება.

ძალდებულია ნიშნავს, რომ შერჩევის მოცულობის ზრდასთან ერთად შეფასების ხარისხი უმჯობესდება.

- **შემთხვევითი შერჩევის მიხედვით გამოთვლილი წერტილოვანი შეფასება პრაქტიკულად ღირებულად („კარგი“), თუ იგი ჩაუნაცვლებელი, ძალდებული და ეფექტურია.**

თუ \bar{X} და S^2 წარმოადგენენ (15.3) ტოლობებით განსაზღვრულ შერჩევით საშუალოსა და შერჩევით

დისპერსიას, მაშინ \bar{X} და $\frac{n}{n-1}S^2$ წარმოადგენენ ξ შემთხვევითი სიდიდის, შესაბამისად, მათემატიკური ლოდინისა და დისპერსიის ჩაუნაცვლებელ და წერტილოვან შეფასებებს.

შეფასებათა მიღების მეთოდები

1. **მომენტთა მეთოდი.** ვთქვათ, ξ უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეა $f(x, \theta)$ განაწილების სიმკვრივით, სადაც θ უცნობი პარამეტრია. მაშინ $M(\xi)$ მათემატიკური ლოდინი წარმოადგენს θ -ს ფუნქციას

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta)dx = \mu_1(\theta)$$

რადგანაც შერჩევითი საშუალო \bar{x} ღებულობს $M(\xi)$ -თან ახლომდგომ მნიშვნელობას, ამიტომ θ პარამეტრის დასადგენად შეიძლება გამოვიყენოთ განტოლება $\mu_1(\theta) = \bar{X}$ ანალოგიურად გამოიყენება მომენტთა მეთოდი დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდეებისთვისაც.

2. **მაქსიმალური დასაჯერობის მეთოდი.** ვთქვათ, ξ უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდეა განაწილების სიმკვრივით $f(x, \theta)$, სადაც θ უცნობი პარამეტრია, ხოლო x_1, x_2, \dots, x_n – ξ შემთხვევითი სიდიდეზე n დამოუკიდებელი დაკვირვების შედეგი. (x_1, x_2, \dots, x_n) ვექტორის განაწილების სიმკვრივე განისაზღვრება ტოლობით:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) \quad (16.1)$$

ამ ტოლობით განსაზღვრულ θ პარამეტრის $L(x_1, \dots, x_n, \theta)$ ფუნქციას ეწოდება დასაჯერობის ფუნქცია.

θ პარამეტრის იმ $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$ მნიშვნელობას, რომლისთვისაც (16.1) ფუნქცია აღწევს მაქსიმუმს, შერჩევის ყოველი (x_1, x_2, \dots, x_n) მნიშვნელობისათვის, **მაქსიმალური დასაჯერობის შეფასება** ეწოდება.

მაქსიმალური დასაჯერობის მეთოდი ძალაში რჩება მაშინაც, როცა ξ არის დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდე განაწილებით

$$P(\xi = \xi_i) = P_i(\theta), \quad \bar{1}, n.$$

ამ შემთხვევაში დასაჯერობის ფუნქციას აქვს სახე:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n) = P_1^{n_1}(\theta) \cdot P_2^{n_2}(\theta) \cdot \dots \cdot P_N^{n_N}(\theta) \quad (16.2)$$

სადაც $n_k (k = \bar{1}, N)$ არის ξ_i მნიშვნელობის რაოდენობა (x_1, x_2, \dots, x_n) შერჩევაში.

§3. ნდობის ინტერვალი

განაწილების უცნობი θ პარამეტრის მნიშვნელობის დასადგენად, გარდა წერტილოვანი შეფასებებისა, გამოიყენება ე.წ. ნდობის ინტერვალები: მოიცემა არა მხოლოდ ერთი $\theta_n^*(x_1, x_2 \dots x_n)$ რიცხვი, არამედ ინტერვალი $(\underline{\theta}_n, \overline{\theta}_n)$, რომელსაც მოცემული p ალბათობით ეკუთვნის θ პარამეტრის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა

$$P(\underline{\theta}_n < \theta < \overline{\theta}_n) = p \quad (17.1)$$

p რიცხვს ($0 < p < 1$) ეწოდება **ნდობის ალბათობა**: იგი ახასიათებს მიღებული შეფასების **საიმედობას**. რაც უფრო ახლოა p ერთთან, მით უფრო საიმედოა შეფასება (როგორც წესი, ირჩევენ $p=0,9$; $0,95$ ან $0,99$).

$\underline{\theta}_n$ და $\overline{\theta}_n$ -ს ეწოდებათ **ნდობის ინტერვალის საზღვრები**. ისინი წარმოადგენენ შერჩევის ფუნქციებს: $\underline{\theta}_n = \underline{\theta}_n(x_1, x_2 \dots x_n)$, $\overline{\theta}_n = \overline{\theta}_n(x_1, x_2 \dots x_n)$ და ამიტომ წარმოადგენენ შემთხვევით სიდიდეებს.

იმ $(\underline{\theta}_n, \overline{\theta}_n)$ ინტერვალს, შემთხვევითი საზღვრებით

$\underline{\theta}_n = \underline{\theta}_n(x_1, x_2 \dots x_n)$ და $\overline{\theta}_n = \overline{\theta}_n(x_1, x_2 \dots x_n)$, რომელიც θ -ს ყოველი დასაშვები მნიშვნელობისათვის აკმაყოფილებს (17.1)-ს, უცნობი θ პარამეტრის **ნდობის ინტერვალი** ეწოდება.

ნდობის ინტერვალის მახასიათებელი

1. ცნობილი σ^2 დისპერსიის მქონე, ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის m მათემატიკური ლოდინის ნდობის ინტერვალს აქვს სახე:

$$\left(\bar{X} - U_p \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + U_p \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \quad (17.2)$$

სადაც $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ხოლო U_p განისაზღვრება მოცემული p ნდობის ალბათობით მე-5 (V) ცხრილის საშუალებით (იხ. დამატება).

2. უცნობი σ^2 დისპერსიის მქონე, ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის m მათემატიკური ლოდინისათვის ნდობის ინტერვალს აქვს სახე:

$$\left(\bar{X} - t_p \frac{s}{\sqrt{n-1}}, \bar{X} + t_p \frac{s}{\sqrt{n-1}}\right) \quad (17.3)$$

სადაც \bar{X} და S^2 გამოითვლება (15.3) ფორმულებით, ხოლო t_p განისაზღვრება მოცემული P ნდობის ალბათობითა და შერჩევის მოცულობით VI ცხრილის საშუალებით (იხ. დამატება).

განვიხილოთ ξ_1, \dots, ξ_k შემთხვევითი სიდიდეები, რომელთაგან თითოეული განაწილებულია ნორმალურად პარამეტრებით $(0;1)$.

$X^2 = \xi_1^2 + \dots + \xi_k^2$ შემთხვევითი სიდიდის განაწილებას სიმკვრივით

$$P_k(x) = f_{x_k^2}(x) = \frac{x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{k}{2}} \tilde{A}\left(\frac{k}{2}\right)}, x > 0 \quad (17.4)$$

უწოდებენ χ^2 განაწილებას K თავისუფლების ხარისხით ($k=1,2,\dots,n$) $\Gamma(\cdot)$ გამა-ფუნქციაა.

თუ $k=2$, მაშინ მიიღება მაჩვენებლიანი განაწილება ($\lambda = \frac{1}{2}$)

3. ნორმალური განაწილების σ^2 დისპერსიისათვის ნდობის ინტერვალს აქვს სახე:

$$\left(\frac{nS^2}{x_{(1)}^2}, \frac{nS^2}{x_{(2)}^2}\right), \quad (17.4)$$

სადაც n შერჩევის მოცულობაა, S^2 განისაზღვრება (17.4) ფორმულით, ხოლო $x_{(1)}^2$ და $x_{(2)}^2$ შემდეგი განტოლების ფესვებია:

$$\int_0^{x_{(1)}^2} P_{(n-1)}(x) dx = \frac{1-P}{2}; \int_{x_{(2)}^2}^{+\infty} P_{(n-1)}(x) dx = \frac{1-P}{2}, \quad (17.5)$$

სადაც ინტეგრალქვეშა $P_{(n-1)}(x)$ ფუნქცია წარმოადგენს χ^2 განაწილების სიმკვრივეს $n-1$ თავისუფლების ხარისხით.

(17.5) განტოლებები, მოცემული P ნდობის ალბათობისათვის, იხსნება VII ცხრილის საშუალებით (იხ. დამატება). $X^2_{(1)}$ -ის განსაზღვრისას საწყის მონაცემებს წარმოადგენენ $v=n-1$ და $\alpha = \frac{1-P}{2}$, ხოლო $X^2_{(2)}$ -ის გამოთვლისას $v=n-1$ და $\alpha = \frac{1-P}{2}$

§4. ჰიპოთეზათა შემოწმება

ვთქვათ, ξ შემთხვევით სიდიდეს გააჩნია უცნობ θ პარამეტრზე დამოკიდებული $f(x, \theta)$ განაწილების სიმკვრივე.

ნებისმიერ დაშვებას θ უცნობი პარამეტრის მნიშვნელობის შესახებ სტატისტიკური ჰიპოთეზა ეწოდება.

სტატისტიკური ჰიპოთეზის შემოწმების ამოცანა ისმება შემდეგნაირად: ვთქვათ, მოცემულია ξ შემთხვევით სიდიდეზე n დამოუკიდებელი დაკვირვების შედეგი

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (18.1)$$

და გვსურს შევამოწმოთ H_0 ჰიპოთეზა $H_0: \theta = \theta_0$, სადაც θ_0 რაღაც ფიქსირებული რიცხვია. ამისათვის უნდა ავაგოთ რაიმე წესი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ შეთანხმებულია თუ არა (18.1) შერჩევა H_0 ჰიპოთეზასთან. ჰიპოთეზის შემოწმების წესს კრიტერიუმი ეწოდება.

როგორც წესი, კრიტერიუმი იგება კრიტიკული არის საშუალებით:

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ შერჩევის ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლიდან არჩევენ ისეთ U ქვესიმრავლეს, რომ როცა (18.1) შერჩევა ეკუთვნის U სიმრავლეს, მაშინ H_0 ჰიპოთეზა უკუიგდება, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში H_0 ჰიპოთეზა მიიღება. U -ს უწოდებენ კრიტიკულ სიმრავლეს.

კრიტიკული სიმრავლეს არჩევენ ისე, რომ X შერჩევის U სიმრავლეში მოხვედრის ალბათობა, როცა H_0 ჰიპოთეზა მართებულია $P_{H_0}(U) = \int_s P(x, \theta_0) dx$, სადაც $P(x, \theta_0) = f(x_1, \theta_0) f(x_2, \theta_0) \dots f(x_n, \theta_0)$, იყოს რაც შეიძლება მცირე. ცხადია,

* იხ. ქსე. ტ. 2, გვ. 424, სტატიის ავტ. ა. შეროზია, თბ., 1977 წ.

რომ ისეთი სიმრავლე, რომელიც აკმაყოფილებს აღნიშნულ თვისებას შეიძლება შერჩეულ იქნას უამრავი ხერხით. უფრო კონკრეტულად U -ს არჩევა შესაძლებელია, როცა მოცემულია ალტერნატიული ჰიპოთეზა $H_1: \theta = \theta_1$

ყოველ კრიტერიუმს უკავშირდება ორი გვარის შეცდომა: თუ H_0 ჰიპოთეზას უკუვაგდებთ (ე.ი. X შერჩევა ეკუთვნის U კრიტიკულ სიმრავლეს), როცა იგი მართებულია, ამბობენ, რომ გვაქვს პირველი გვარის შეცდომა, ხოლო თუ $x \in U$, ე.ი. H_0 ჰიპოთეზას მივიღებთ, როცა იგი მცდარია (ჭეშმარიტია ალტერნატიული 1 ჰიპოთეზა) - მეორე გვარის შეცდომა.

$$\text{შემოვიღოთ აღნიშვნა } P_i(B) = \int_B P(x, \Theta_i) dx, i = 0, 1,$$

მაშინ კრიტერიუმის პირველი გვარის შეცდომის ალბათობა ტოლია $P_0(U)$ -ის, ხოლო მეორე გვარის შეცდომისა $\beta = P_1(\bar{U})$, სადაც \bar{U} არის U სიმრავლის დამატება: $1 - \beta$ -ს კრიტერიუმის სიმძლავრე ეწოდება.

ჰიპოთეზათა შემოწმების წესი შემდგომში მდგომარეობს:

1) იღებენ მცირე $\alpha > 0$ რიცხვს, რომელსაც კრიტერიუმის მნიშვნელიანობის დონეს უწოდებენ (როგორც წესი, იღებენ $\alpha = 0,05$; $0,01$ ან $0,001$).

2) კრიტიკული არის დასადგენად განიხილავენ პირობას:

$$P_0(U) \leq \alpha \tag{18.2}$$

ცხადია, რაც უფრო მცირეა α , მით უფრო ნაკლებია პირველი გვარის შეცდომის ალბათობა. ყველა იმ U სიმრავლიდან, რომლებიც აკმაყოფილებენ (18.2)-ს, ირჩევენ იმას, რომელიც უზრუნველყოფს მინიმალურ მეორე გვარის შეცდომას, რაც ეთანადება კრიტერიუმის სიმძლავრის მაქსიმუმს.

3) ატარებენ ცდას, რომლის მიხედვითაც იღებენ შერჩევას $x = (x_1, \dots, x_n)$ და პოულობენ კრიტერიუმის ემპირიულ მნიშვნელობას. თუ $x \in U$, მაშინ ძირითად H_0 ჰიპოთეზას უარყოფენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვლიან, რომ H_0 ჰიპოთეზა არ ეწინააღმდეგება ცდის მონაცემებს. ჰიპოთეზის შემოწმების შედეგი აღიწერება შემდეგი სიტყვებით:

H_0 ჰიპოთეზა უარყოფილია (ან შესაბამისად H_0 ჰიპოთეზა მიღებულია) მნიშვნელობის α დონით.

შეთანხმებულობის χ^2 კრიტერიუმი

კრიტერიუმებს, რომლებიც შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონის შესახებ ჰიპოთეზათა გამოსაკვლევად გამოიყენება, შეთანხმებულობის კრიტერიუმები ეწოდებათ.

ვთქვათ, ძირითადი H_0 ჰიპოთეზა იმაში მდგომარეობს, რომ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია F არის მოცემული F_0 ფუნქცია ($H_0: F=F_0$)

დავყოთ რიცხვითი ღერძი z ინტერვალად:

$$(-\infty = a_0, a_1), [a_1, a_2], \dots, [a_{r-1}, a_r = +\infty],$$

სადაც $a_1 < a_2 < \dots < a_{r-1}$. ჭეშმარიტი H_0 ჰიპოთეზისათვის $[a_{i-1}, a_i]$ ინტერვალს ეთანადება ალბათობა $P_i = F_0(a_i) - F_0(a_{i-1})$, $i = \overline{1, r}$.

ვთქვათ, ξ შემთხვევითი სიდიდის n შერჩევითი მნიშვნელობიდან i -ურ $I_i = [a_{i-1}, a_i]$ ინტერვალში ხვდება m_i

$$\text{რაოდენობა } \sum_{i=1}^r m_i = n$$

თუ H_0 ჰიპოთეზა მართებულია, მაშინ I_i ინტერვალში ჩავარდნილი შერჩევის მნიშვნელობათა $\frac{m_i}{n}$ ფარდობითი სიხშირე ახლოს უნდა იყოს P_i ალბათობასთან.

$$\text{სიდიდე } \chi^2 = \sum_{i=1}^r \left(\frac{\frac{n}{P_i} \frac{m_i}{n} - P_i \right)^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(m_i - nP_i)^2}{nP_i} \quad (18.3)$$

ახასიათებს H_0 ჰიპოთეზის ცდის მონაცემებთან (შერჩევასთან) შეთანხმებულობას.

VII ცხრილის საშუალებით (იხ. დამატება) პოულობენ χ^2_α -ს გამოთვლილს მნიშვნელობის დონისა და $v=r-1$ მნიშვნელობისათვის.

თუ სრულდება თანაფარდობა $\chi^2 > \chi^2_\alpha$, მაშინ H_0 ჰიპოთეზას უარყოფენ მნიშვნელობის α დონით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰიპოთეზა იღებენ იგივე α დონით.

შევნიშნოთ, რომ χ^2 კრიტერიუმის გამოყენებაც ხდება ჰიპოთეზათა შემოწმების ზოგადი წესით. ამ შემთხვევაში კრიტერიუმის ემპირიული მნიშვნელობები გამოითვლება (18.3) ფორმულით, ხოლო კრიტიკულ სიმრავლედ აირჩევა ($\chi_a^2 + \infty$) ინტერვალი.

შენიშვნა 1: თითოეულ ინტერვალში შერჩევით მნიშვნელობათა m_i რიცხვი 5-10-ზე მცირე არ უნდა იყოს. თუ ეს პირობა არ სრულდება, რეკომენდებულია ინტერვალების გაერთიანება.

შენიშვნა 2: შეთანხმებულობის χ^2 კრიტერიუმი გამოიყენება არა მარტო იმ შემთხვევაში, როდესაც ξ შემთხვევითი სიდიდის ჰიპოთეზური განაწილების F_0 ფუნქცია მოცემულია, არამედ მაშინაც თუ იგი დამოკიდებულია ℓ უცნობ პარამეტრზე, ე.ი. აქვს სახე $F_0(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_\ell)$ და პარამეტრები $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_\ell$ ფასდებიან შერჩევის საფუძველზე მაქსიმალური დასაჯერობის მეთოდით. თუმცა ამ დროს VII ცხრილიდან X^2 მნიშვნელობა უნდა ვიპოვოთ $v=r-\ell-1$ სიდიდისათვის.

თავი V. სავარჯიშოები ალბათობის თეორიაში მეთოდური მითითებებით

§1. ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. მოქმედებანი ხდომილობებზე

(1-30) ვაგორებთ კამათელს. ააგეთ ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. შემდეგი ხდომილობები ჩაწერეთ ელემენტარულ ხდომილობათა სიმრავლის სახით და იპოვეთ მათი ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობათა რიცხვი.

A={კამათელზე მოვა ლუწი რიცხვი},

B={კამათელზე მოვა კენტი რიცხვი},

C={კამათელზე მოვა რიცხვი, რომელიც არ აღემატება 3-ს},

D={კამათელზე მოვა მარტივი რიცხვი},

E={კამათელზე მოვა რიცხვი, რომელიც იყოფა 3-ზე}.

- | | |
|--|---|
| 1. $A+B; A \cdot C$ | 2. $A \cdot \bar{D}; A-B$ |
| 3. $A+C; A \cdot B$ | 4. $\bar{A} \cdot E; \Omega-D$ |
| 5. $A+D; A \cdot D$ | 6. $B \cdot \bar{E}; D-E$ |
| 7. $A+E; A \cdot E$ | 8. $D \cdot \bar{E}; A-E$ |
| 9. $A+\Omega; A \cdot \Omega$ | 10. $\bar{A} \cdot B; C-B$ |
| 11. $B \cdot \emptyset+; B \cdot \Omega$ | 12. $\bar{A} \cdot B; \Omega-\bar{D}$ |
| 13. $C+\Omega; C \cdot \Omega$ | 14. $\bar{A} \cdot \bar{C}; \Omega-E$ |
| 15. $D+\Omega; D \cdot \emptyset$ | 16. $\bar{A} \cdot \bar{D}; \Omega-B$ |
| 17. $B+\Omega; D \cdot \Omega$ | 18. $\bar{A} \cdot \bar{E}; -B$ |
| 19. $E+\Omega; E \cdot \Omega$ | 20. $\bar{B} \cdot \bar{C}; \Omega-\bar{E}$ |
| 21. $A \cdot A; A$ | 22. $\bar{A} + \bar{B}; \Omega \cdot \bar{A}$ |
| 23. $A \cdot \bar{A}; B$ | 24. $\bar{A} + \bar{C}; \Omega \cdot \bar{B}$ |
| 25. $A \cdot \bar{B}; C$ | 26. $\bar{A} + \bar{D}; \Omega \cdot \bar{C}$ |
| 27. $\bar{A} + B; \bar{E}$ | 28. $\bar{A} + \bar{E}; \Omega \cdot \bar{D}$ |
| 29. $\bar{B} + \bar{D}; D$ | 30. $\bar{B} + \bar{D}; \Omega \cdot \bar{E}$ |

(31-60) დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი A, B და C ხდომილობებისთვის მართებულია შემდეგი დამოკიდებულებანი:

- | | |
|---------------------------|---|
| 31. $A+(A \cdot B)=A$ | 32. $(A+B)-B=A \cdot B$ |
| 33. $A+B=(A-A \cdot B)+B$ | 34. $A \cdot B+B \cdot C=(A+C) \cdot B$ |
| 35. $(A-B)+B=A+B$ | 36. $(A+C)(B+C)=(A \cdot B)+C$ |

- | | |
|---|--|
| 37. $A+B=(A-B)+(B-A)+A\cdot B$ | 38. $(B-C)-(B-A)=A-C$ |
| 39. $A-B=A-(A\cdot B)$ | 40. $A-B=(A+B)-B$ |
| 41. $A\cdot(B-C)=A\cdot B-A\cdot C$ | 42. $(A+B)-C=(A-C)+(B-C)$ |
| 43. $(A-C)\cdot(B-C)=A\cdot B-C$ | 44. $(A-B)-C=A-(B+C)$ |
| 45. $A-(B-C)=(A-B)+(A\cdot C)$ | 46. $(A-B)(C-B)=A(C-B)-B(C-B)$ |
| 47. $A+B+C=A+(B-A\cdot B)+(C-A\cdot C)$ | 48. $(A+B)-A=B\cdot\bar{A}$ |
| 49. $A\cdot\bar{B}\cdot C=A+B$ | 50. $\bar{A}\cdot\bar{B}=\overline{A+B}$ |
| 51. $\bar{A}+\bar{B}=\overline{A\cdot B}$ | 52. $\bar{A}\cdot B\cdot C=A+B$ |
| 53. $(\overline{A+B})\cdot C=\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C$ | 54. $(\overline{A+B})\cdot\bar{C}=\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{C}$ |
| 55. $\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C=(\bar{A}+\bar{B})\cdot C$ | 56. $(\overline{A\cdot B})+C=\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$ |
| 57. $\Omega-\bar{A}=\bar{A}$ | 58. $\emptyset+\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C=(\overline{A+B})\cdot C$ |
| 59. $A+B=A+(B-A\cdot B)$ | 60. $(A\cdot B)+C=(A+C)\cdot(B+C)$ |

§2. ალბათობის კლასიკური, სტატისტიკური და გეომეტრიული განსაზღვრება

1. ყუთიდან, რომელშიც 25 თეთრი და 20 წითელი ბირთვია, შემთხვევით იღებენ ბირთვს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ იგი თეთრია?

2. ვაგორებთ ორ კამათელს (აქ და შემდეგშიც ვგულისხმობთ, რომ კამათლები „წესიერია“). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ კამათლებზე მოსული რიცხვების ჯამი ტოლია 12-ის.

3. მონეტას ვაგდებთ ორჯერ (აქ და შემდეგშიც ვგულისხმობთ, რომ მონეტა „წესიერია“). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორივეჯერ მოვა „ღერბი“.

4. კრებაზე, რომლის მსვლელობაში მონაწილეობას იღებდა 25 მამაკაცი და 5 ქალი, ფარული კენჭისყრით აირჩიეს დელეგატად 5 პიროვნება. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ არჩეულია 5 ქალი?

5. ვაგორებთ ორ კამათელს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ კამათლებზე მოსული რიცხვების სხვაობის აბსოლუტური მნიშვნელობა ტოლია ოთხის.

6. ვაგდებთ ორ მონეტას. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ „ღერბი“ მოვა ერთ მონეტაზე მაინც.

7. 30 დეტალიანი პარტიიდან, რომელშიც 5 დეფექტიანი დეტალია, შემთხვევით იღებენ ერთ დეტალს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულია დეფექტიანი დეტალი?

8. ქარხანა უშვებს 50% უმაღლეს და 45% პირველი ხარისხის ნაწარმს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული ნაწარმი აღმოჩნდება უმაღლესი ხარისხის?

9. ლატარიის 50 ბილეთიდან მომგებიანია ორი ბილეთი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ნაყიდი ბილეთი მომგებიანია.

10. ტელეფონის ნომრის აკრეფისას აბონენტს დაავიწყდა ბოლო ციფრი. მან ალაღბედზე აკრიფა ეს ციფრი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ აკრეფილია საჭირო ციფრი.

11. ტექნიკური კონტროლის განყოფილება ამოწმებს მზა 100 დეტალიან პარტიას, რომელშიც 90 არის პირველი ხარისხის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული პირველივე დეტალი პირველი ხარისხისაა.

12. M და N დასახლებულ პუნქტებს შორის გაჭიმული სატელეფონო ხაზის სიგრძეა 100 კმ. ხაზი გაწყდა რომელიღაც C წერტილში. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მანძილი M-დან C-მდე არ აღემატება 30 კმ-ს.

13. კვადრატზე შემოსახულია R რადიუსიანი წრეწირი. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ წრეში შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება კვადრატის შიგნით?

14. 40 სმ-ის ტოლ რადიუსიან წრეში ჩახახულია კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 10 სმ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ წრეში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება კვადრატის შიგნით.

15. საამქროში აწყობილი 991 ბლოკ-სქემის შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ ვარგისია 923. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული ბლოკ-სქემა ვარგისია.

16. ახალი, ერთნაირი ტიპის ძრავების ტექნიკური გამოცდის შედეგად დადგინდა, რომ ვარგისი ძრავების ფარდობითი სიხშირეა 0,96. იპოვეთ 200 შემთხვევით აღებული ძრავიდან ვარგისი ძრავათა რიცხვი.

17. ყუთში 40 ვატი სიმძლავრის 10 და 100 ვატი სიმძლავრის 50 ნათურაა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ამოღებული ნათურა 40 ვატი სიმძლავრისაა.

18. ტექნიკური კონტროლის განყოფილებამ შემთხვევით აღებული 100 დეტალიდან აღმოაჩინა 5 წუნდებული დეტალი. იპოვეთ წუნდებულ დეტალთა ფარდობითი სიხშირე და არაწუნდებულ დეტალთა ფარდობითი სიხშირე.

19. საწარმოს მიერ გამოშვებული პროდუქციის 99% სტანდარტულია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული ნაწარმი არაა სტანდარტული.

20. ორი კონცენტრირებული წრეწირიდან ერთის რადიუსია R სმ და მეორის - r სმ. ($r < R$). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ დიდ წრეში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება პატარა წრეშიც.

21. სამკუთხედზე შემოხაზულია R რადიუსიანი წრეწირი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ წრეში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება სამკუთხედის შიგნით.

22. საწყობში მიიღეს I საამქროში დამზადებული 7, II საამქროში დამზადებული 8 და III საამქროში დამზადებული 10 ელექტროძრავი. მომხმარებელთან გაგზავნეს შემთხვევით არჩეული ძრავი. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ იგი დამზადებულია I საამქროში.

23. წესიერ სამკუთხედში ჩახაზულია R რადიუსიანი წრეწირი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამკუთხედში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება წრეში.

24. წესიერი სამკუთხედის შიგნით, რომლის გვერდის სიგრძე 30 სმ-ია, ჩახაზულია 2 სმ-ის ტოლ რადიუსიანი წრე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამკუთხედში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება წრის შიგნით.

25. სტუდენტმა 25 საგამოცდო ბილეთიდან ისწავლა 20 ბილეთი. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ მას შეხვდება ნასწავლი ბილეთი, თუ იგი პირველი გავიდა გამოცდაზე (ბილეთის აღება შემთხვევითი წესით ხდება).

26. შემთხვევით ასახელებენ ერთ რიცხვს 1-დან 25-მდე (ჩათვლით). რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ დასახელებულია 5-ის ჯერადი რიცხვი?

27. საწყობში 18 პირველი და 7 მეორე ხარისხის მილია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული მილი მეორე ხარისხისაა.

28. ვაგდებთ სამ მონეტას. იპოვეთ სამივე მონეტაზე „ღერბის“ მოსვლის ალბათობა.

29. 8 სმ-ის ტოლ რადიუსიან წრეში ჩახაზულია კვადრატი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ წრეში შემთხვევით დასმული წერტილი აღმოჩნდება კვადრატის შიგნით.

30. საწყობში ერთად დევს პირველი ხარისხის 20 და მეორე ხარისხის 6 საბურავი. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული საბურავი პირველი ხარისხისაა?

ამოცანები, რომლებიც ამოიხსნებიან კომბინატორიკის გამოყენებით

31. ტელეფონის ნომრის აკრეფის დროს აბონენტს დაავიწყდა ბოლო სამი ციფრი, ახსოვდა მხოლოდ, რომ ციფრები განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. მან შემთხვევით აკრიფა ეს ციფრები. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ აკრეფილია საჭირო ციფრები.

32. ყუთში 15 დეტალია, მათ შორის 10 უმაღლესი ხარისხისაა. ამწყობი შემთხვევით იღებს 3 დეტალს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამივე ამოღებული დეტალი უმაღლესი ხარისხისაა.

33. საამქროში მუშაობს 6 მამაკაცი და 4 ქალი. სამსახურში გამოცხადების განრიგის მიხედვით შემთხვევით აარჩიეს 7 ადამიანი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის 5 ქალია.

34. 20 პერფობარათი დანომრილია 1-დან 20-მდე. შემთხვევით აიღეს ორი ბარათი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულია 1 და 2-ნომრიანი ბარათები.

35. საწყობში 15 კინესკოპია, მათ შორის 10 დამზადებულია თბილისის ქარხანაში. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული 5 კინესკოპიდან 3 აღმოჩნდება თბილისის ქარხანაში დამზადებული.

36. ჯგუფში 12 სტუდენტია, მათ შორის 8 ფრიადოსანია. სიით შემთხვევით აარჩიეს 9 სტუდენტი.

იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ არჩეულ სტუდენტებს შორის 5-ია ფრიადოსანი.

37. ქარხნის მიერ გამოშვებული ერთიდაიგივე მარკის 5 ავტომანქანიდან 3 უმაღლესი ხარისხისაა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით არჩეული 3 მანქანიდან ორი მანქანა უმაღლესი ხარისხისაა.

38. ტელეფონის ნომერი შედგება 6 ციფრისაგან. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ეს ციფრები სხვადასხვაა, თუ ა) ტელეფონის ნომერი შეიძლება 0-ით დაიწყო; ბ) ტელეფონის ნომერი 0-ით არ იწყება.

39. 25 ნათურიდან 5 უმაღლესი ხარისხისაა. შემთხვევით იღებენ 8 ნათურას. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის 4 ნათურაა უმაღლესი.

40. აპარატი 5 ელემენტისაგან შედგება, რომელთაგან 2 გაცვეთილია. აპარატის ჩართვისას შემთხვევით ჩაირთვება 3 ელემენტი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ჩართული იქნება ორი გაცვეთილი ელემენტი.

41. სათამაშო კარტის კომპლექტიდან (36 კარტით) შემთხვევით იღებენ 3 კარტს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებული სამივე კარტი ტუზია.

42. ლატარიის 100 ბილეთიდან მომგებიანია 10. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ნაყიდი 5 ბილეთიდან მოიგებს 3 ბილეთი.

43. „სპორტლოტოს“ (49-დან 6) ტირაჟის მონაწილემ შეავსო ერთი ბილეთი (შემთხვევით გადახაზა 6 ნომერი). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მომგებიანი აღმოჩნდება გადახაზული ოთხი ნომერი.

44. ბავშვი შემთხვევით ალაგებს გვერდიგვერდ 4 კუბიკს, რომლებზედაც აწერია ასოები m, m, a, a. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ მიიღება სიტყვა „მამა“.

45. ყუთში 3 თეთრი და 7 წითელი ფერის ბირთვია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ამოღებული ორი ბირთვი აღმოჩნდება წითელი ფერის.

46. A, B და კიდევ 8 ადამიანი დგას რიგში. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ და B პიროვნება ერთმანეთისგან დაშორებულია 3 ადამიანით.

47. საწყობში ერთიდაიგივე ტიპის 10 ძრავია, რომელთა შორის 2 წუნდებულია. მომხმარებელთან

შემთხვევით აგზავნიან 2 ძრავს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ორივე კარგია.

48. სათამაშო კარტის კომპლექტიდან (52 კარტით) შემთხვევით იღებენ ოთხ კარტს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ოთხივე ათიანია?

49. მაღაზიაში მიღებული 10 წიგნიდან 3 წუნდებულია, მომხმარებელს შემთხვევით მისცეს 3 წიგნი. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის 2 წიგნია წუნდებული?

50. სათამაშო კარტის კომპლექტიდან (52 კარტით) შემთხვევით იღებენ 4 კარტს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ორი ტუზია და ორი ათიანი?

§3. ხლომილობათა ჯამის ალბათობა.

საწინააღმდეგო ხლომილობის ალბათობა. პირობითი ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულა. ნამრავლის ალბათობა. სრული ალბათობისა და ბაიესის ფორმულები

1. ორი მსროლელი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ესვრის სამიზნეს. პირველი მსროლელი სამიზნეს აზიანებს 0,9-ის ტოლი ალბათობით, მეორე - 0,8-ის ტოლი ალბათობით. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ სამიზნე დაზიანდება მხოლოდ ერთი ტყვიით?

2. ელექტრო სქემა შეიცავს 4 ბლოკს. თითოეული ბლოკის გამართული მუშაობის (საიმედობის) ალბათობა შესაბამისად ტოლია 0,6; 0,7; 0,8; 0,9-ის. ბლოკები მწყობრიდან გამოდიან ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. იპოვეთ სქემის საიმედოდ მუშაობის ალბათობა, თუ ბლოკები მიმდევრობითაა ჩართული.

3. წინა ამოცანის პირობებში იპოვეთ სქემის საიმედოდ მუშაობის ალბათობა, თუ ბლოკები პარალელურადაა ჩართული.

4. ორი ქვემეხი ერთდროულად ესვრის სამიზნეს. პირველი ქვემეხისათვის სამიზნის დაზიანების ალბათობაა 0,9, მეორისათვის - 0,8. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამიზნეს დააზიანებს ორივე ქვემეხი.

5. ფეიქარი ემსახურება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მომუშავე სამ ავტომატურ საქსოვ დაზგას.

აღბათობა იმისა, რომ ერთი საათის განმავლობაში ფეიქრის მომსახურება არ დასჭირდება პირველ დაზგას ტოლია 0,8, მეორე დაზგას - 0,9, მესამე დაზგას 0,95. იპოვეთ აღბათობა იმისა, რომ ერთი საათის განმავლობაში ფეიქრის მომსახურება დასჭირდება ერთ დაზგას მაინც.

6. წინა ამოცანის პირობებში იპოვეთ აღბათობა იმისა, რომ ერთი საათის განმავლობაში ფეიქრის მომსახურება არ დასჭირდება არცერთ დაზგას.

7. კამათლის ის წახნაგები, რომლებზედაც აწერია რიცხვები 1, 2, 3, შეღებილია ყვითლად, ხოლო დანარჩენი - თეთრად (რიცხვები 4, 5, 6). იპოვეთ აღბათობა იმისა, რომ კამათელზე მოვა ლუწი ნომერი, თუ ვიცით, რომ კამათელზე მოვა თეთრი ფერი.

8. მაღაზია ღებულობს სამი ქარხნის მიერ დამზადებულ კინესკოპებს. პირველი ქარხანა ამზადებს მთელი პროდუქციის 45%-ს, მეორე - 40%-ს, მესამე - 15%-ს. პირველი ქარხნის პროდუქციის 70% უმაღლესი ხარისხისაა, მეორე - 80%, მესამისა - 90%. რას უდრის აღბათობა იმისა, რომ მაღაზიაში შემთხვევით ნაყიდი კინესკოპი უმაღლესი ხარისხისაა?

9. საბურავების დეფექტების აღმოსაჩენი გამოსაცდელი სტენდი იძლევა 95% გარანტიას. ცდიან საბურავების პარტიას, რომელთაგან თითოეული 0,005-ის ტოლი აღბათობითაა დეფექტური. რას უდრის აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული საბურავი დეფექტურია, თუ სტენდის პასუხი დადებითია (რაც იმას ნიშნავს, რომ სტენდმა აჩვენა დეფექტურობა).

10. ლატარიის 1000 ბილეთიდან 24 ფულადი და 10 ნივთის მომგებიანია. იპოვეთ აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ნაყიდი ორი ბილეთიდან ერთი მაინც იქნება მომგებიანი.

11. საწყობში 20 პირველი და 6 მეორე ხარისხის დეტალია. შემთხვევით ვიღებთ ერთ დეტალს, ვამოწმებთ და უკან ვაბრუნებთ საწყობში. შემდეგ ისევ ვიღებთ შემთხვევით ერთ დეტალს. იპოვეთ აღბათობა იმისა, რომ ორივეჯერ პირველი ხარისხის დეტალია ამოღებული.

12. მუშა ემსახურება სამ ჩარხს, რომლებზედაც ერთიდაიგივე დეტალები მზადდება. პირველი ჩარხისათვის

დეფექტური დეტალის დამზადების ალბათობა ტოლია 0,02-ის, მეორისათვის - 0,03, მესამისათვის - 0,04. პირველ ჩარხზე სამჯერ მეტი დეტალი მზადდება, ვიდრე მეორეზე, ხოლო მეორეზე ორჯერ ნაკლები, ვიდრე მესამეზე. სამივე ჩარხის დეტალები მოწმდება ტექნიკური კონტროლის მიერ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით შემოწმებული ერთი დეტალი აღმოჩნდება დეფექტური.

13. თვითმფრინავს სამჯერ ესვრიან. პირველი სროლის დროს მოხვედრის ალბათობა ტოლია 0,5, მეორე სროლის დროს - 0,6 და მესამის დროს - 0,8-ის. თვითმფრინავი გამოდის მწყობრიდან სამი მოხვედრის შემთხვევაში, მისი მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა ერთი მოხვედრის დროს ტოლია 0,3-ის, ხოლო ორი მოხვედრისას - 0,6. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ თვითმფრინავი გამოვა მწყობრიდან.

14. ერთ ყუთში 2 თეთრი და 4 შავი ბირთვია, მეორეში - 3 თეთრი და 5 შავი, მესამეში 4 თეთრი და 6 შავი. პირველი ყუთიდან მეორეში გადადეს ერთი ბირთვი, მეორედან მესამეშიც ერთი ბირთვი და ბოლოს მესამიდან პირველში ისევ ერთი ბირთვი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ბირთვების შემადგენლობა ყუთებში არ შეიცვლება.

15. პირველი საამქრო ამზადებს დეტალების საერთო რაოდენობის 70%-ს, ხოლო მეორე - 30%-ს. დეტალები მოწმდება ტექნიკური კონტროლის მიერ. პირველი საამქროს პროდუქცია შეიცავს 10% დეფექტურ დეტალს, მეორის - 20%-ს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემოწმებული ერთი დეტალი არ აღმოჩნდება დეფექტური.

16. მომხმარებელს ეგზავნება სამი ქარხნის მიერ დამზადებული პროდუქცია. პირველი ქარხანა უშვებს პროდუქციის 20%-ს, მეორე - 45%-ს, მესამე 34%-ს. პირველი ქარხნის პროდუქცია შეიცავს 3%, მეორე 2% და მესამე 1% - წუნდებულ ნაკეთობებს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მომხმარებლის მიერ შეძენილი ნაკეთობა არის პირველ ქარხანაში დამზადებული, თუ ის აღმოჩნდა წუნდებულად.

17. გვაქვს ათი ერთნაირი ყუთი. ცხრა მათგანში 2 თეთრი და 2 შავი ფერის საგანია, ერთში კი - 5 თეთრი და 1 შავი საგანი. შემთხვევით არჩეული ყუთიდან ვიღებთ ერთ საგანს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ საგანი

ამოღებულია ყუთიდან, რომელშიც 5 თეთრი და 1 შავი ფერის საგანია, თუ იგი აღმოჩნდა თეთრი ფერის.

18. პირველ ჩარხზე უმაღლესი ხარისხის დეტალის დამზადების ალბათობა ტოლია 0,7-ის, მეორეზე - 0,8-ის. გვაქვს ორი პირველ და სამი მეორე ჩარხზე დამზადებული დეტალი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ხუთივე დეტალი უმაღლესი ხარისხისაა.

19. ელექტრონული მოწყობილობა მწყობრიდან გამოდის თუ გაფუჭდა პირველი, მეორე ან მესამე ელემენტიდან ერთ-ერთი. ელემენტების დაზიანების ალბათობები შესაბამისად ტოლია 0,3; 0,2 და 0,2-ის. იპოვეთ ელექტრონული მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა, თუ ელემენტების დაზიანება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია.

20. გათამაშების 100 ბილეთიდან 10 მომგებიანია. იპოვეთ მოგების ალბათობა, თუ გვაქვს 4 ბილეთი.

21. ერთ ყუთში 12, ხოლო მეორეში 10 ნათურაა. ორივე ყუთში თითო წუნდებული ნათურაა. პირველიდან მეორეში გადააქვთ ერთი ნათურა. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მეორე ყუთიდან შემთხვევით ამოღებული ნათურა იქნება წუნდებული.

22. დეტალის გარკვეული მახასიათებელი შეიძლება იცვლებოდეს ექვს სხვადასხვა ინტერვალში შესაბამისი ალბათობებით: 0,09; 0,16; 0,25; 0,25; 0,16 და 0,09. დეტალის ამ მახასიათებელზე დამოკიდებულებით სტანდარტული ნაკეთობის მიღების ალბათობები ტოლია შესაბამისად 0,2; 0,2; 0,4; 0,3; 0,2. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ნაკეთობა იქნება სტანდარტული.

23. ყუთში 15 ტენისის ბურთია, რომელთა შორის 9 ახალია. პირველი თამაშისათვის იღებენ სამ ბურთს და თამაშის შემდეგ ისევ ყუთში აბრუნებენ. მეორე თამაშისათვის იღებენ აგრეთვე სამ ბურთს, იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მეორე თამაშისათვის შემთხვევით აღებული სამივე ბურთი ახალი იქნება.

24. თხუთმეტ საგამოცდო ბილეთში ორი განსხვავებული საკითხია. სტუდენტს შეუძლია პასუხის გაცემა მხოლოდ 25 საკითხზე. იპოვეთ გამოცდის ჩაბარების ალბათობა, თუ ამისათვის საკმარისია პასუხის გაცემა ერ-

თი ბილეთის ორივე საკითხზე, ან ერთი ბილეთის ერთ-ერთ საკითხზე და მეორე ბილეთის გარკვეულ საკითხზე.

25. საავარიო სიტუაციაში ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად შეიძლება ჩაირთოს ორი ხელსაწყო შესაბამისად ალბათობებით: 0,95 და 0,9. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ავარიის შემთხვევაში ჩაირთვება მხოლოდ ერთი ხელსაწყო.

26. ტექნიკური კონტროლის განყოფილება ამოწმებს ორი ტიპის დეტალების სტანდარტულობას. სტანდარტულობის ალბათობები I და II ტიპის დეტალებისათვის შესაბამისად ტოლია 0,7 და 0,8-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ორი შემოწმებული დეტალიდან მხოლოდ ერთი იქნება სტანდარტული.

27. ხელსაწყო შედგება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მომუშავე ორი ელემენტისაგან. ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობები შესაბამისად ტოლია 0,05 და 0,08-ის. იპოვეთ ხელსაწყოს მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა, თუ ამისათვის საკმარისია ერთი ელემენტის მაინც მწყობრიდან გამოსვლა.

28. სამი ასტრონომიური ობსერვატორია ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად აწარმოებს ერთიდაიგივე ფიზიკური სისტემის გაზომვას. გაზომვის შედეგებში შეცდომის ალბათობები თითოეული ობსერვატორიისათვის შესაბამისად ტოლია 0,1; 0,15 და 0,2-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამივე ობსერვატორიაში წარმოებული ერთჯერადი გაზომვის შედეგებიდან ერთში მაინც იქნება შეცდომა.

29. გამოთვლით ლაბორატორიაში n ავტომატური და 4 ნახევრადავტომატური გამომთვლელი მანქანაა. თითოეული ტიპის მანქანის მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა შესაბამისად ტოლია 0,05 და 0,2-ის. სტუდენტი აწარმოებს გამოთვლებს შემთხვევით არჩეულ მანქანაზე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მანქანა არ გამოვა მწყობრიდან.

30. გამომთვლელი მანქანის სამი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მომუშავე ელემენტიდან ორი გამოვიდა მწყობრიდან. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მწყობრიდან გამოვიდა პირველი და მეორე ელემენტი, თუ ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობები შესაბამისად ტოლია 0,2; 0,4 და 0,3-ის.

§4. მეთოდური მითითებები

1. გამოწმებთ ორ ნათურას ვარგისიანობაზე ისე, რომ ვიხილავთ შემდეგ ხდომილობებს: $\omega_{i1} = \{i\text{-ური ნათურა ვარგისია}\}$, $\omega_{i2} = \{\text{გაწყვეტილია } i\text{-ური ნათურის სპირალი}\}$, $\omega_{i3} = \{\text{გატეხილია } i\text{-ური ნათურის კოლბა}\}$, $i=1,2,\dots$
 $A = \{\text{ვარგისია ერთი ნათურა}\}$, $B = \{\text{ვარგისია ერთი ნათურა მაინც}\}$, $C = \{\text{ვარგისია ორივე ნათურა}\}$ და $E = \{\text{უვარგისია ორივე ნათურა (ან სპირალია გაწყვეტილი, ან კოლბაა გატეხილი)}\}$. ავაგოთ ელემენტარულ ხდომილობათა Ω სივრცე; $A, B, C, E, A+B, A \cdot B, B-A$ - ხდომილობები ჩავწეროთ ელემენტარულ ხდომილობათა სიმრავლის სახით და ვიპოვოთ თითოეული მათგანის ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობათა რიცხვი.

ამოხსნა. ელემენტარულ ხდომილობათა Ω სივრცეს ექნება სახე:

$$\Omega = \{(\omega_{11}, \omega_{21}), (\omega_{11}, \omega_{22}), (\omega_{11}, \omega_{23}), (\omega_{12}, \omega_{21}), (\omega_{12}, \omega_{22}), (\omega_{12}, \omega_{23}), (\omega_{13}, \omega_{21}), (\omega_{13}, \omega_{22}), (\omega_{13}, \omega_{23})\}.$$

აღვნიშნოთ $m(\Omega)$ -თი Ω -ს ხელშემწყობ ელემენტარულ ხდომილობათა, ანუ ცდის ყველა შესაძლო ელემენტარულ ხდომილობათა რიცხვი

ანალოგიურად ჩავწეროთ, რომ:

$$A = \{(\omega_{11}, \omega_{22}), (\omega_{11}, \omega_{23}), (\omega_{12}, \omega_{21}), (\omega_{13}, \omega_{21})\}$$

$$m(A) = 4$$

$$B = \{(\omega_{11}, \omega_{21}), (\omega_{11}, \omega_{22}), (\omega_{11}, \omega_{23}), (\omega_{12}, \omega_{21}), (\omega_{13}, \omega_{21})\}$$

$$m(B) = 5$$

$$C = \{(\omega_{11}, \omega_{21})\}, m(C) = 1$$

$$E = \{(\omega_{12}, \omega_{22}), (\omega_{12}, \omega_{23}), (\omega_{13}, \omega_{22}), (\omega_{13}, \omega_{23})\} = \Omega - B = \bar{B},$$

$$m(E) = m(\bar{B}) = 4$$

$$A+B = \{(\omega_{11}, \omega_{21}), (\omega_{11}, \omega_{22}), (\omega_{11}, \omega_{23}), (\omega_{12}, \omega_{21}), (\omega_{13}, \omega_{21})\}$$

$$m(A+B) = 5$$

$$A \cdot B = \{(\omega_{11}, \omega_{22}), (\omega_{11}, \omega_{23}), (\omega_{12}, \omega_{21}), (\omega_{13}, \omega_{21})\}$$

$$m(A \cdot B) = 4$$

$$B - A = \{(\omega_{11}, \omega_{21})\} = C$$

$$m(B - A) = m(c) = 1$$

2. დავამტკიცოთ, რომ ნებისმიერი A , B და C ხდომილობებისათვის $(A \cdot B) + C = (A + C) \cdot (B + C)$

ამოხსნა.

ა) ვთქვათ $\forall \omega \in \Omega$ და $\omega \in (A \cdot B) + C \Rightarrow \omega \in (A \cdot B)$, ან $\omega \in C$, ან $\omega \in (A \cdot B)$ და $\omega \in C \Rightarrow \omega \in A$ და $\omega \in B$, ან $\omega \in C$, ან $\omega \in A$, $\omega \in B$ და $\omega \in C \Rightarrow \omega \in (A + C)$ და $\omega \in (B + C) \Rightarrow \omega \in (A + C) \cdot (B + C)$ ე.ი.

$$(A \cdot B) + C \subset (A + C) \cdot (B + C)$$

ბ) ანალოგიურად $\forall \omega \in (A + C) \cdot (B + C) \Rightarrow \omega \in (A + C)$ და $\omega \in (B + C) \Rightarrow (\omega \in A, \text{ ან } \omega \in C \text{ ან } \omega \in (A \cdot C))$ და $(\omega \in B, \text{ ან } \omega \in C, \text{ ან } \omega \in (B \cdot C)) \Rightarrow \omega \in (A \cdot B)$, ან $\omega \in C$, ან $\omega \in (A \cdot B \cdot C) \Rightarrow \omega \in (A \cdot B) + C$ ე.ი.

$$(A + C) \cdot (B + C) \subset (A \cdot B) + C$$

მიღებული ჩართვებიდან გამომდინარეობს დასამტკიცებელი ტოლობა (ექვივალენტობა).

3. ტექნიკური დათვალიერების დროს 1000 ავტომანქანიდან გაუმართავი აღმოჩნდა 100 მანქანა. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით არჩეული ავტომანქანა გაუმართავია (ხდომილობა A).

ამოხსნა. ვისარგებლოთ ხდომილობის ალბათობის

სტატისტიკური განსაზღვრით $P(A) \approx \frac{N(A)}{N}$, სადაც N ცდების რიცხვია, $N(A)$ – A ხდომილობის სიხშირე. დავწეროთ:

$$P(A) \approx \frac{100}{1000} = 0.1$$

4. საამქროს საწყოში M დეტალია, მათ შორის m არასტანდარტულია. შემთხვევით ვიღებთ r დეტალს, ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულია $k(r)$ არასტანდარტული დეტალი (ხდომილობა A).


ამოხსნა. M დეტალიდან r დეტალის შემთხვევითი ამოღების ყველა შესაძლო შემთხვევა თანაბრად შესაძლებელია და მათი რაოდენობა ტოლია M

ელემენტიდან აღებული m ელემენტიანი ჯგუფებია რიცხვისა $C_M^m = \frac{M!}{m!(M-m)!}$. K არასტანდარტული დეტალი შეიძლება აღებულ იქნას m არასტანდარტული დეტალიდან $C_M^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}$ წესით ამავე დროს დანარჩენი $r-k$ დეტალი უნდა იყოს სტანდარტული, ე.ი. აღებული იქნება $M-m$ სტანდარტული დეტალიდან $C_{M-m}^{r-k} = \frac{(M-m)!}{(r-k)!(M-m-r+k)!}$ წესით. თუ ვისარგებლებთ ალბათობის კლასიკური განსაზღვრით $P(A) = \frac{m(A)}{n}$,

რადგან $n = m(\Omega) = C_M^r$ და $m(A) = C_m^k \cdot C_{M-m}^{r-k}$ მივიღებთ:

$$P(A) = \frac{C_m^k \cdot C_{M-m}^{r-k}}{k!(m-k)!}$$

5. R რადიუსიან წესიერი ექვსკუთხედი



ნახ. 5.1.

წრეში, რომელშიც ჩახაზულია შემთხვევით ვსვამთ წერტილს. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ წერტილი მოხვდება წესიერ ექვსკუთხედში (ხდომილობა A). **ამოხსნა.** ალბათობის გეომეტრიული განსაზღვრის საფუძველზე მივიღებთ:

$$P(A) = \frac{S_{ABCDEF}}{S_{(O;R)\text{წრ}}}} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{2}R^2}{\pi R^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi}$$

6. გიორგიმ შეავსო სპორტლოტოს ერთი ბილეთი (45 ნომრიდან გადახაზა 6). რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ამ გათამაშებაში გიორგი მოიგებს?

ამოხსნა. აღვნიშნოთ ხდომილობები:

$A = \{\text{გიორგი მოიგებს}\}$, $A_i = \{\text{გიორგის მიერ გადახაზული } i \text{ ნომერი დაემთხვევა გათამაშებულიდან } i \text{ ნომერს}\}$ $i=1, 2, \dots, 6$. სპორტლოტოს გათამაშების წესების მიხედვით

ბილეთი იგებს, თუ დაემთხვა გადახაზული 3 ან მეტი ნომერი გათამაშებულიდან შესაბამისი რაოდენობის ნომრებს. ე.ი. $A=A_3+A_4+A_5+A_6$, აქედან გამომდინარე საწინააღმდეგო ხდომილობა $\bar{A}=\{\text{გიორგი ვერ მოიგებს}\}$ ჩაიწერება შემდეგი სახით:

$\bar{A}=A_0+A_1+A_2$, $A_0+A_1+A_2$ უთავსებადი ხდომილობებია. უთავსებად ხდომილობათა ჯამის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულის მიხედვით, დავწერთ

$$P(\bar{A})=P(A_0)+P(A_1)+P(A_2)$$

ვისარგებლოთ ამოცანა 4-ის ამოხსნის სქემით. $M=45$, $m=r=6$, $k=0, 1$ ან 2 .

$$P(A_0) = \frac{C_6^0 C_{39}^6}{C_{45}^6} = 0,377, \quad P(A_1) = \frac{C_6^1 C_{39}^5}{C_{45}^6} = 0,424,$$

$$P(A_2) = \frac{C_6^2 C_{39}^4}{C_{45}^6} = 0,151, \text{ ამიტომ}$$

$$P(\bar{A}) \approx 0,377 + 0,424 + 0,151 = 0,952.$$


მოგების ალბათობა გამოვთვალოთ საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულით

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,952 = 0,048$$

შენიშვნა: საძიებელი ალბათობა შეიძლება გამოვთვალოთ ფორმულით

$$P(A) = P(A_3 + A_4 + A_5 + A_6) = P(A_3) + P(A_4) + P(A_5) + P(A_6)$$

7. ელექტროსქემა შეიცავს პარალელურად შეერთებულ 3 კვანძს (იხ. ნახ.2). თითოეული კვანძის საიმედოდ მუშაობის ალბათობა შესაბამისად ტოლია 0,6; 0,7; 0,8. კანძები მწყობრიდან გამოდიან ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. ვიპოვოთ სქემის საიმედოდ მუშაობის ალბათობა (ხდომილობა A).



ნახ.5.2.

ამოხსნა. აღვნიშნოთ ხდომილობები $i = \{i\text{-ური კვანძი მუშაობს გამართულად}\}$, $i=1, 2, 3$, $\bar{A}_i = \{i\text{-ური კვანძი გამოვა მწყობრიდან}\}$. $\bar{A} = \{\text{სქემა გამართულად არ მუშაობს}\}$. ე.ი. $\bar{A} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$

ამოცანის პირობით $(A_1)=0,6$; $(A_2)=0,7$; $(A_3)=0,8$.

საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულით:

$$P(\bar{A}_1) = 1 - P(A_1) = 0,4;$$

$$P(\bar{A}_2) = 1 - P(A_2) = 0,3;$$

$$P(\bar{A}_3) = 1 - P(A_3) = 0,2.$$

$\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ ხდომილობების ერთობლივ დამოუკიდებლობის გამო დავწერთ:

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) P(\bar{A}_3) = 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,024$$

ამიტომ სქემის საიმედოდ მუშაობის ალბათობა ტოლია $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,024 = 0,976$.

8. ორი მსროლელი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ესვრის ერთდაიგივე სამიზნეს. პირველი მსროლელი სამიზნეს აზიანებს 0,6-ის ტოლი ალბათობით, მეორე - 0,7-ის ტოლი ალბათობით. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ სამიზნეს დააზიანებს ერთი მსროლელი მაინც (ხდომილობა A).

ამოხსნა. შემოვიღოთ ხდომილობები $i = \{\text{სამიზნეს დააზიანებს } i\text{-ური მსროლელი}\}$, $i=1, 2$. ამოცანის პირობით $P(A_1)=0,6$; $P(A_2)=0,7$. ცხადია, $A = A_1 + A_2$, ამიტომ ნებისმიერი ორი ხდომილობის ჯამის ალბათობისა და დამოუკიდებელ ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულების გამოყენებით მივიღებთ:

$$P(A) = P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) P(A_2)$$

$$P(A) = 0,6 + 0,7 - 0,6 \cdot 0,7 = 0,88$$

9. ელექტრომონტორი ემსახურება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მომუშავე სამ ობიექტს. ალბათობა იმისა, რომ ერთი საათის განმავლობაში ერთი მონტორის მომსახურება არ დასჭირდება პირველ ობიექტს ტოლია 0,95-ის, მეორე ობიექტისთვის - 0,9-ის, მესამესათვის - 0,8-ის. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ერთი საათის

განმავლობაში ელექტრომონტორის მომსახურება დასჭირდება ერთ ობიექტს მაინც (ხდომილობა A).

ამოხსნა. აღვნიშნოთ ხდომილობები $A_i = \{\text{ერთი საათის განმავლობაში ელექტრომონტორის მომსახურება არ დასჭირდება } i\text{-ურ ობიექტს}\}$, $i=1,2,3$; ამოცანის პირობებით $P(A_1)=0,95$; $P(A_2)=0,9$; $P(A_3)=0,8$

ცხადია

$$A = \overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}$$

A_1 , A_2 , A_3 ხდომილობების ერთობლივ დამოუკიდებლობის გამო $\overline{A_1}$, $\overline{A_2}$ და $\overline{A_3}$ ხდომილობებიც ერთობლივ დამოუკიდებელია. ვისარგებლოთ ერთობლივი დამოუკიდებელ ხდომილობათა ჯამის ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულით

$$P(A) = P(\overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}) = 1 - P(\overline{\overline{A_1}}) \quad P(\overline{\overline{A_2}}) \quad P(\overline{\overline{A_3}}) = 1 - P(A_1) \quad P(A_2) \quad P(A_3) = 1 - 0,684 = 0,316$$

10. ხარატის მიერ დამზადებული ყოველი 100 დეტალიდან 97 არის ვარგისი და 68 პირველი ხარისხისაა. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული ვარგისი დეტალი პირველი ხარისხისაა.

ამოხსნა. აღვნიშნოთ ხდომილობები: $A = \{\text{შემთხვევით აღებული დეტალი ვარგისია}\}$, $B = \{\text{შემთხვევით აღებული დეტალი პირველი ხარისხისაა}\}$. საძიებელია პირობითი ალბათობა $P(B/A)$. ამოცანის პირობით A და B ხდომილობას ერთდროულად ხელს უწყობს 100 ელემენტარული ხდომილობიდან 68. ალბათობის გამოსათვლელი კლასიკური ფორმულის გამოყენებით დავწერთ:

$$P(A \cdot B) = \frac{m(A \cdot B)}{n} = \frac{68}{100} = 0,68$$

A ხდომილობას ხელს უწყობს 97 ელემენტარული ხდომილობა, ამიტომ $P(A) = \frac{97}{100} = 0,97$ ვისარგებლოთ პირობითი ალბათობის გამოსათვლელი ფორმულით

$$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

ჩვენ შემთხვევაში მივიღებთ

$$P(B/A) = \frac{0.68}{0.97} \approx 0.7$$

11. გვაქვს სამი ერთნაირი ყუთი. პირველ ყუთში 10 თეთრი და 5 შავი ბირთვია. მეორეში - 8 თეთრი და 4 შავი, ხოლო მესამეში ყველა ბირთვი თეთრია. ბავშვი შემთხვევით იღებს ერთ-ერთ ყუთიდან ბირთვს. ვიპოვოთ: 1) ალბათობა იმისა, რომ ამოღებულია თეთრი ფერის ბირთვი (ხდომილობა); 2) ალბათობა იმისა, რომ ბირთვი ამოღებულია პირველი ყუთიდან, თუ ვიცით, რომ იგი თეთრი ფერისაა.

ამოხსნა. აღვნიშნოთ ხდომილობები $H_i = \{\text{ბირთვი ამოღებულია } i\text{-ური ყუთიდან}\}$, $i=1,2,3$; რადგან $H_1+H_2+H_3=\Omega$ და $H_i \cdot H_j = \emptyset$, $i \neq j$, $i=1,2,3$, $j=1,2,3$ ამიტომ H_1, H_2, H_3 - ჰიპოთეზებია. ამოცანის პირობით

$$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}, P(A/H_1) = \frac{10}{10+5} = \frac{2}{5}$$

$$P(A/H_2) = \frac{8}{8+4} = \frac{2}{3}, P(A) = 1,$$

1) სრული ალბათობის ფორმულის გამოყენებით დავწერთ

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A/H_i) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{31}{45}$$

2) ბაიესის ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{\sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A/H_i)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} + 1 \right)} = \frac{6}{31}$$

4.1 ტესტური ამოცანები

1. თუ $P(A)=0,5$, მაშინ $P(\bar{A})$ ტოლია:
ა) 0,1 ბ) 0,3 გ) 0,5 დ) 0,9.
2. თუ $P(\bar{A})=0,75$, მაშინ $P(A)$ ტოლია:
ა) 0,35 ბ) 0,25 გ) 0,05 დ) 0,15
3. A და B უთავსებადი ხდომილობებია, $P(A)=0,1$ და $P(B)=0,5$, მაშინ $P(A+B)$ ტოლია:
ა) 0,5 ბ) 0,05 გ) 0,65 დ) 0,6
4. A და B უთავსებადი ხდომილობებია, $P(A)=0,3$; $P(A+B)=0,7$, მაშინ $P(B)$ ტოლია:
ა) 0,3 ბ) 0,5 გ) 1 დ) 0,4
5. $P(\bar{A})=0,985$, მაშინ $P(A)$ ტოლია:
ა) 0,05 ბ) 0,005 გ) 0,015 დ) 1
6. $P(A+B)=1$, $P(A)=0,9$, $A \cdot B = \emptyset$, მაშინ $P(B)$ ტოლია:
ა) 0,1 ბ) 0,9 გ) 0,8 დ) 0,09
7. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, $P(A)=0,1$, $P(B)=0,5$, მაშინ $P(A \cdot B)$ ტოლია:
ა) 0,5 ბ) 0,05 გ) 0,6 დ) 1
8. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, $P(A)=0,4$; $P(B)=0,5$, მაშინ $P(A+B)$ ტოლია:
ა) 0,9 ბ) 0,2 გ) 0,1 დ) 0,7
9. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, $P(B)=0,3$, $P(A+B)=0,65$, მაშინ $P(A)$ ტოლია:
ა) 0,35 ბ) 0,96 გ) 0,5 დ) 0,15

პითაგორა:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \Rightarrow 0,65 =$$

$$P(A) + 0,3 - 0,3 \cdot P(A) \Rightarrow P(A) = \frac{0,35}{0,7} = 0,5$$

10. A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, $P(B) = 0,4$, $P(A+B) = 0,9$, მაშინ $P(A \cdot B)$ ტოლია:

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{4}{9}$ გ) 0,5 დ) 0,6

მიითითება:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \Rightarrow 0,9 =$$

$$= 0,4 + P(B) - 0,4 \cdot P(B) \Rightarrow 0,6P(B) = 0,5 \Rightarrow P(B) =$$

$$\frac{0,5}{0,6} = \frac{5}{6} \Rightarrow P(A \cdot B) = P(A)P(B) = 0,4 \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{3}$$

11. A და B უთავსებადი ხდომილობებია, $P(A) = P(B) = 0,1$, მაშინ $P(A+B)$ ტოლია:

ა) 0,01 ბ) 0,2 გ) 0,5, დ) 0,19

12. $P(A+B) = 0,2$, $P(A) = P(B) = P$ და $A \cdot B = \emptyset$, მაშინ P ტოლია:

ა) 0,4 ბ) 0,1 გ) 0,8 დ) 0

მიითითება: $2P = 0,2 \Rightarrow P = 0,1$

13. $P(A+B) = 0,36$, $P(A) = P(B) = P$, A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, მაშინ P ტოლია:

ა) 0,18 ბ) 0,1 გ) 0,64, დ) 0,2

მიითითება:

$$P(A+B) = P + P - P \cdot P \Rightarrow 2P + 0,36$$

$$= 0 \Rightarrow \begin{cases} D = 2,56 \\ P = 0,2 \\ P_2 = 1,8 \text{ არ გამოდგება} \end{cases}$$

14. A და B უთავსებადი ხდომილობებია, $P(A) = P(B) = 0,1$, მაშინ $P(A+B)$ ტოლია:

ა) $\frac{1}{5}$, ბ) $\frac{2}{5}$, გ) $\frac{1}{2}$, დ) 0.15.

15. $P(A+B)=\emptyset$, $P(A)=0,4$, $P(B)=0,7$, მაშინ $P(A+B)$ ტოლია:

ა) 0,28 ბ) 1,1 გ) 0,3 დ) პასუხი არ აქვს.

16. ყუთში, რომელშიც 5 მწვანე და 4 თეთრი ბურთულაა, ჩაუმატეს მწვანე ბურთულა. ამის შემდეგ ბურთულები ერთმანეთში აურიეს და ყუთიდან ალაღბედზე ამოიღეს ერთი ბურთულა. ალბათობა იმისა, რომ ეს ბურთულა მწვანეა, ტოლია:

ა) $\frac{5}{9}$ ბ) $\frac{5}{10}$ გ) $\frac{6}{10}$ დ) $\frac{1}{10}$.

17. თუ A და B დამოუკიდებელი ხდომილობებია, $P(A)=0,3$ $P(B)=0,4$, მაშინ:

1) ალბათობა $P(\bar{A} \cdot B)$ ტოლია:

ა) 0,12 ბ) 0,7 გ) 0,28 დ) არ გამოითვლება

2) ალბათობა $P(\bar{A} \cdot \bar{B})$ ტოლია:

ა) 0,12 ბ) 0,28 გ) 0,42 დ) არ გამოითვლება.

18. თუ $P(A)=0,7$, $P(B)=0,4$, $P(\bar{B}|A)=0,3$, მაშინ: $P(A|\bar{B})$ ტოლია:

ა) 0,28 ბ) 0,7 გ) 0,6 დ) 0,35

19. თუ ხდომილობა $B \subset A$, $P(B)=0,3$, $P(A)=0,5$, მაშინ პირობით ალბათობა $P(A|\bar{B})$ ტოლია:

ა) 0,15 ბ) 0,6 გ) 0,8 დ) 0,2

20. თუ $P(B|A)=0,5$, $P(A|B)=0,3$, $P(B)=0,4$, მაშინ $P(A)$ ტოლია:

ა) 0,7 ბ) 0,15 გ) 0,2 დ) 0,24

21. თუ ყუთიდან, რომელშიც 2 თეთრი და 3 მწვანე ერთნაირი ზომის ბურთულაა, ალაღბედზე ვიღებთ ორ

ბურთულას დაბრუნებით, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ამოღებული ბურთულა თეთრი აღმოჩნდენა, ტოლია:

- ა) $\frac{2}{5}$ ბ) $\frac{4}{25}$ გ) $\frac{2}{25}$ დ) $\frac{1}{10}$

22. თუ ყუთიდან, რომელშიც აწყვია 2 თეთრი და 3 მწვანე ერთნაირი ზომის ბურთულა, ალაბედზე ვიდებს ორ ბრთულას დაბრუნების გარეშე, მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ორივე ბურთულა თეთრი აღმოჩნდება, ტოლია:

- ა) $\frac{4}{25}$ ბ) $\frac{2}{5}$ გ) $\frac{1}{10}$ დ) $\frac{2}{25}$

პასუხები:

§2

- | | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. 5/9 | 2. 1/36 | 3. 0,25 | 4. $1/C_{30}^5$ | 5. 1/9 | 6. 0,75 |
| 7. 1/7 | 8. 0,5 | 9. 0,04 | 10. 0,1 | 11. 0,9 | 12. 0,3 |
| 13. $2/\pi$ | 14. $1/16\pi$ | 15. 923/991 | 16. 192 | 17. 1/6 | |
| 18. 1/20; 19/20 | | | | | |
| 19. 0,01 | 20. $(r/R)^2$ | 21. $33/4\pi$ | 22. 7/25 | 23. $\sqrt{3\pi}/9$ | 24. $2\pi/125$ |
| 25. 0,8 | 26. 0,2 | 27. 0,28 | 28. 1/8 | 29. $2/\pi$ | 30. 10/13 |
| 31. 1/720 | 32. 24/91 | 33. 0,5 | 34. 1/190 | 35. $\approx 0,4$ | 36. 14/55 |
| 37. 0,3 | 38. 0,1512 | 39. $\approx 0,023$ | 40. 0,3 | 41. $\approx 0,0006$ | 42. $\approx 0,007$ |
| 43. $\approx 0,001$ | 44. 1/6 | 45. $\approx 0,23$ | 46. 2/15 | 47. $\approx 0,62$ | 48. $\approx 4 \cdot 10^{-6}$ |
| 49. $\approx 0,18$ | 50. $12 \cdot 10^{-5}$ | | | | |

§3

- | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1. 0,26 | 2. 0,3024 | 3. 0,0024 | 4. 0,72 | 5. 0,316 | 6. 0,684 |
| 7. 2/3 | 8. 0,77 | 9. 0,0872 | 10. 0,064 | 11. 0,046 | 12. 0,024 |
| 13. 0,594 | 14. 173/495 | 15. 0,87 | 16. 0,322 | 17. 0,156 | 18. 0,251 |
| 19. 0,328 | 20. 0,348 | 21. 13/132 | 22. 0,332 | 23. 0,089 | 24. 190/203 |
| 25. 0,14 | 26. 0,38 | 27. 0,126 | 28. 0,388 | 29. 0,89 | 30. 14/45 |

ტესტის პასუხები:

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 1. გ | 2. ბ | 3. დ | 4. დ | 5. გ | 6. ა |
| 7. ბ | 8. დ | 9. გ | 10. ა | 11. დ | 12. ბ |
| 13. გ | 14. ა | 15. დ | 16. გ | 17. 1)გ 2)გ | 18. დ |
| 19. ბ | 20. დ | 21. ბ | 22. გ | | |

**§5. დამოუკიდებელ ცდათა მიმდევრობა.
ბერნულის ფორმულა. მუხრ-ლასკასის ლოკალური
და ინტეგრალური ზღვარითი თეორემები. კუასონის
ასიმპტოტური ფორმულა. უალბათესი რიცხვი**

1. მონეტას ვაგდებთ ხუთჯერ (ვგულისხმობთ, რომ მონეტა „წესიერია“). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ბორჯღაღლი(გერბი) მოვა ორზე ნაკლებ შემთხვევაში.

2. კამათელს ვაგდებთ ექვსჯერ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ რიცხვი ხუთი მოვა არაუმეტეს 3 შემთხვევისა.

3. ორი თანაბარი ძალის მოჭადრაკე თამაშობს ჭადრაკს (თითოეულის მოგების ალბათობა ტოლია 0,5-ის). იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ პირველი მოჭადრაკე ოთხი პარტიიდან მოიგებს 3-ს (ყაიმი მხედველობაში არ მიიღება).

4. წინა ამოცანის პირობებში, რომლის ალბათობაა მეტი ოთხი პარტიიდან ორის მოგებისა, თუ ექვსი პარტიიდან სამის?

5. ტექნიკური კონტროლი ამოწმებს 10 დეტალისაგან შემდგარ პარტიას. დეტალის სტანდარტულობის ალბათობა ტოლია 0,75. იპოვეთ სტანდარტული დეტალების უალბათესი რიცხვი.

6. იპოვეთ 19 პერფობარათში სწორად პერფორირებული ბარათების უალბათესი რიცხვი, თუ ბარათის არასწორად პერფორირების ალბათობა ტოლია 0,1-ის.

7. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ოთხ დამოუკიდებელ ცდაში A ხდომილობა მოხდება არანაკლებ სამჯერ, თუ ცალკეულ ცდაში A ხდომილობის მოხდენის ალბათობა ტოლია 0,4-ის.

8. ცალკეულ დამოუკიდებელ ცდაში ხდომილობის მოხდენის ალბათობაა 0,7. იპოვეთ ცდათა n რიცხვი, რომლის დროსაც უალბათესი რიცხვი ტოლი იქნება 20-ის.

9. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ კალათბურთელი 10 სროლიდან კალათში ბურთს მოათავსებს არანაკლებ 9-ჯერ, თუ ყოველ ცალკეულ სროლაში კალათში ბურთის ჩაგდების ალბათობა ტოლია 0,8-ის.

10. ბერნულის სქემაში ხდომილობის ალბათობა ტოლია 0,3-ის. იპოვეთ ცდათა რიცხვი n , რომლის დროსაც უალბათესი რიცხვი ტოლია 30-ის.

11. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 2400 დამოუკიდებელ ცდაში A ხდომილობა მოხდება 1400-ჯერ, თუ ცალკეულ ცდაში $P(A)=0,6$.

12. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 2100 დამოუკიდებელ ცდაში ხდომილობა მოხდება არანაკლებ 1470 და არაუმეტეს 1500-ისა, თუ ცალკეულ ცდაში $P(A)=0,7$.

13. ტექნიკური კონტროლი ამოწმებს 475 დეტალს. დეტალის დეფექტიანობის ალბათობა 0,05-ის ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ დეფექტური აღმოჩნდება არანაკლებ 400 და არაუმეტეს 450 დეტალი.

14. ნაკეთობის 30% უმაღლესი ხარისხისაა. ვამოწმებთ 6 ნაკეთობას. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 4 მათგანია უმაღლესი ხარისხის.

15. საწყობში მიღებული დეტალების 60% უმაღლესი ხარისხისაა. ვიდებთ 10 დეტალს. რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ 3 დეტალია უმაღლესი ხარისხის.

16. ალბათობა იმისა, რომ საამქროში ელექტროენერჯიის დანახარჯი ერთი დღე-ღამის განმავლობაში არ გადააჭარბებს ნორმას ტოლია 0,9-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 5 დღე-ღამიდან ელექტროენერჯიის დანახარჯი არ გადააჭარბებს ნორმას 4 დღე-ღამეში.

17. ყუთში 10 თეთრი და 5 შავი საგანია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ალაღბედზე თუ ამოვიღებთ თანმიმდევრობით 14 საგანს დაბრუნებით, მათ შორის აღმოჩნდება არანაკლებ 12 თეთრი საგანი.

18. ვაჟის დაბადების ალბათობა 0,515-ის ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 10 ახალშობილს შორის 4 გოგო იქნება.

19. მაღაზიაში შევიდა 8 მომხმარებელი. თითოეულისათვის რაიმეს ყიდვის ალბათობა ტოლია 0,3. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამი მათგანი იყიდის.

20. ცალკეულ ცდაში ხდომილობის ალბათობა ტოლია 0,64. რამდენი დამოუკიდებელი ცდა უნდა ჩავატაროთ, რომ უალბათესი რიცხვი ტოლი იყოს 51-ის.

21. არასტანდარტული დეტალის დამზადების ალბათობა ტოლია 0,05-ის. რამდენი დეტალი უნდა იყოს პარტიაში, რომ მასში არასტანდარტული დეტალების უალბათესი რიცხვი 63-ის ტოლი იყოს.

22. 28 ნერგიდან თითოეულს გაზრდის ტოლი ალბათობა გააჩნია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ გაიზრდება 20 ნერგი.

23. საგარანტიო ტელევიზორის კინესკოპის მტყუნების ალბათობა ტოლია 0,12-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 46 ტელევიზორიდან 36 გაუძღვებას საგარანტიო ვადას.

24. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 700 ნაკეთობიდან უმაღლესი ხარისხის ნაკეთობათა რიცხვი არანაკლებ 460 და არაუმეტეს 600 იქნება, თუ ალბათობა იმისა, რომ ნაკეთობა უმაღლესი ხარისხისაა, ტოლია 0,7-ის.

25. „ცაციები“ შეადგენენ საშუალოდ 1%-ს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 200 ადამიანიდან 4 „ცაცია“ იქნება.

26. დეტალის დეფექტურობის ალბათობა ტოლია 0,02. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 100 დეტალიდან არც ერთი დეფექტური არ იქნება.

27. ალბათობა იმისა, რომ 1000 საათის მუშაობის შემდეგ ნათურა არ გადაიწვეება ტოლია 0,2-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ სამი ნათურიდან ერთი მაინც არ გადაიწვეება 1000 საათის მუშაობის შემდეგ.

28. T დროში კონდენსატორის გაფუჭების ალბათობა ტოლია 0,2. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ T დროში 100 კონდენსატორიდან გაფუჭდება არანაკლებ 20.

29. T დროში ტელევიზორის მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა 0,01-ის ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ T დროში 100 ტელევიზორიდან მწყობრიდან გამოვა არანაკლებ 95 ტელევიზორისა.

30. T დროში ხელსაწყოს მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა ტოლია 0,2-ის. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ 100 ხელსაწყოდან მწყობრიდან გამოსული ხელსაწყოების რიცხვი არანაკლებ 14 და არაუმეტეს 26-ია.

5.1. ტესტური ამოცანები

31. თუ A ხდომილობის მოხდენის ალბათობა $p = P(A) = 0,4$ და ტარდება $n = 5$ დამოუკიდებელი ცდა, მაშინ A ხდომილობის მოხდენათა უალბათესი რიცხვი ტოლია:

- ა) 4 ბ) 2 გ) 3 დ) პასუხი არ აქვს

32. თუ A ხდომილობის მოხდენის ალბათობა $p = P(A) = 0,7$ და ტარდება $n = 9$ დამოუკიდებელი ცდა, მაშინ A ხდომილობის მოხდენათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 7 ბ) 6,3 გ) 6 და 7 დ) პასუხი არ აქვს

33. თუ დავაგდებთ იატაკზე მონეტას 4-ჯერ, მაშინ {ბორჯღალი}-ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 4 ბ) 2 გ) 1 დ) პასუხი არ აქვს

34. თუ გავაგორებთ კამათელს 5-ჯერ, მაშინ ხდომილობა $\omega_3 = \{3\}$ -ის მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 1 ბ) 5 გ) 0 და 1 დ) პასუხი არ აქვს

35. მონეტას ვაგდებთ ქვიშაში 4-ჯერ და ხდომილობები $A = \{\text{ბორჯღალი}\}$, $B = \{\text{საფასური}\}$, $C = \{\text{მონეტა დარჩება წიბოზე}\}$ ტოლალბათია, მაშინ ხდომილობა {ბორჯღალი}-ის მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 3 ბ) 1 გ) 0 და 1 დ) პასუხი არ აქვს.

36. თუ გავაგორებთ კამათელს 3-ჯერ, მაშინ ხდომილობა $A = \{\text{მოვა ლუწი ნომერი}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 3 ბ) 0 გ) 1 და 2 დ) პასუხი არ აქვს

37. მცირეკალიბრიანი შაშხანით მიზანში საცდელი სროლებისას მსროლელმა 100-ჯერ ესროლა სამიზნეს და 90-ჯერ მოარტყა მიზანში). თუ მსროლელი 11-ჯერ ესვრის სამიზნეს, მაშინ მიზანში მოხვედრათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 11 ბ) 9 გ) 10 ან 11 დ) 10

38. თუ ყუთიდან, რომელშიც 8 თეთრი და 2 ლურჯი ბურთულაა, ალაღბედზე სათითაოდ დაბრუნებით ამოვიღებთ 3 ბურთულას, მაშინ ხდომილობის – $A =$

წამოღებული ბურთულა ლურჯია, მოხდენის უაღბათესი რიცხვი ტოლია:

ა) 0 ბ) 2 გ) 1 და 3 დ) პასუხი არ აქვს

39. თუ მონეტაზე ხდომილობა $A = \{\text{საფასური}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი $k'_0 = 0$ და $k''_0 = 1$, მაშინ მონეტის დაგდებათა n რიცხვი ტოლია:

ა) 2 ბ) 3 გ) 1 დ) პასუხი არ აქვს.

40. თუ ხდომილობა $B = \{\text{ბორჯღაღი}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია 1-ის, მაშინ მონეტის დაგდებათა n რიცხვი ტოლია:

ა) 2 ბ) 3 გ) პასუხი არ აქვს დ) 1

41. თუ ხდომილობა $A = \{\text{საფასური}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია $k'_0 = 1$ და $k''_0 = 2$, მაშინ მონეტის დაგდებათა რიცხვი ტოლია:

ა) 3 ბ) 2 გ) 4 დ) პასუხი არ აქვს

42. თუ მონეტის n -ჯერ დაგდებისას ხდომილობა $A = \{\text{საფასური}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია: $k'_0 = 2$ და $k''_0 = 4$, მაშინ მონეტის დაგდებათა რიცხვი ტოლია:

ა) 7 ბ) 5 გ) 6 დ) პასუხი არ აქვს

43. თუ კამათელის n -ჯერ გაგორებისას ხდომილობა ω_4 {მოვა 4-იანი}-ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვია, $k'_0 = 3$ და $k''_0 = 5$, მაშინ კამათელის გაგორებათა რიცხვი ტოლია:

ა) 8 ბ) 15 გ) 10 დ) პასუხი არ აქვს

44. თუ კამათელის n -ჯერ გაგორებისას ხდომილობა $\omega_5 = \{\text{მოვა 5-იანი}\}$ -ს მოსვლათა უაღბათესი რიცხვია: $k_0 = 5$, მაშინ კამათელის გაგორებათა რიცხვი ტოლია:

ა) 6 ბ) 25 გ) 30 დ) პასუხი არ აქვს

45. თუ რომელიმე მცენარის თესლის აღმოცენების უნარი უდრის 90%-ს, მაშინ 4 დათესილი თესლიდან აღმოცენებულ მცენარეთა უაღბათესი რიცხვი ტოლი იქნება:
 ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 3 ან 4
46. საწყობში მიღებულია 30 ყუთი მინის ნაკეთობა. აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებულ ყუთში ყველა ნაკეთობა აღმოჩნდება მთელი უდროს 0,9-ს. იმ ყუთების უაღბათესი რიცხვი, რომლებშიც ყველა ნაკეთობა მთელია, არის:
 ა) 9 ბ) 30 გ) 7 დ) 3
47. A ხდომილობის აღბათობა ყოველ ცდაში $p = P(A) = 0,3$. იმისათვის, რომ A ხდომილობის მოხდის უაღბათესი რიცხვი იყოს 60, საჭიროა ჩატარდეს დამოუკიდებელი ცდების შემდეგი რაოდენობა:
 ა) 180 ბ) 200, 201, 202 გ) 1800 დ) 250, 260
48. აღბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული დეტალი წუნდებულია, უდრის 0,1-ს. იმისათვის, რომ ვარგისი დეტალების უაღბათესი რიცხვი იყოს 50, საჭიროა აღებული იყოს დეტალების რაოდენობა:
 ა) 500 ბ) 55 გ) 70 დ) პასუხი არ აქვს
49. ორი ტოლძალოვანი მოთამაშე თამაშობს ჭადრაკს. ყაიმით დამთავრებული პარტია ხელახლა გადათამაშდება. რომელი უფრო აღბათია?
 ა) ერთი მეორეს მოუგებს 4 პარტიიდან 3-ს, თუ
 ბ) 8 პარტიიდან მოუგებს 5-ს?
 თითოეული აღბათობა გამოთვალეთ ცალ-ცალკე.
50. მიზანში ისვრიან 14-ჯერ. თითოეული გასროლისას მიზანში მოხვედრის აღბათობა 0,2-ია. მაშინ მიზანში მოხვედრათა უაღბათესი რიცხვი ტოლია:
 ა) 7 ბ) 28 გ) 2 და 3 დ) 10

51. წინა ამოცანის პირობებში უაღბათესი რიცხვის შესაბამისი ალბათობა ტოლია:

- ა) 0 ბ) 0,25 გ) 0,2 დ) პასუხი არ აქვს

52. კალათბურთელი საჯარიმო ტყორცნისას კალათში ბურთს ათავსებს 0,8-ის ტოლი ალბათობით. რომელი უფრო ალბათია:

- ა) კალათბურთელი 6 საჯარიმოდან ჩააგდებს 4-ს
 ბ) 6 საჯარიმოდან ჩააგდებს 6-ს
 გ) 6 საჯარიმოდან ვერცერთს ვერ ჩააგდებს.

53. წინა ამოცანის პირობებში გამოთვალეთ ა), ბ), გ) შემთხვევების შესაბამისი ალბათობები.

პასუხები:

§4

- | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1. 3/16 | 2. 0,99 | 3. 5/16 | 4. $P_4(2) > P_6(3)$ | 5. 8 | 6. 17; 18 |
| 7. $\approx 0,18$ | 8. $28 \leq n \leq 29$ | 9. 1,8 0,89 | 10. $100 \leq n \leq 102$ | 11. 0,0041 | 12. 0,4236 |
| 13. 0,001 | 14. 0,06 | 15. 0,036 | 16. 0,328 | 17. 0,105 | 18. 0,217 |
| 19. 0,254 | 20. $79 \leq n \leq 80$ | 21. $1259 \leq n \leq 1279$ | 22. 18/29 | 23. 0,972 | 24. 0,993 |
| 25. 0,09 | 26. 0,14 | 27. 0,488 | 28. 0,5 | 29. 0,02 | 30. 0,99 |

ტესტების პასუხები:

- | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31. ბ | 32. ბ | 33. ბ | 34. ბ | 35. ბ | 36. ბ | 37. დ |
| 38. ა | 39. ბ | 40. ა | 41. ა | 42. დ | 43. დ | 44. ბ |
| 45. ბ | 46. ბ | 47. ბ | 48. ბ | 49. ა | 50. ბ | 51. ბ |
| 52. ბ | 53. ა) 0,246; ბ) 0,26; გ) 0,000064. | | | | | |

§6. მეთოდური მითითებები, პასუხები

1. ფიქსირებულ t დროში ოთხმოტორიანი თვითმფრინავის თითოეული მოტორის მწყობრიდან გამოსვლის ალბათობა ერთიდაიგივეა და უდრის 0,1. მოტორები მწყობრიდან გამოდიან ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. ვიპოვოთ:

ა) ალბათობა იმისა, რომ t დროში მწყობრიდან გამოვა თვითმფრინავის 2 მოტორი.

ბ) ალბათობა იმისა, რომ მწყობრიდან გამოსულ მოტორთა რიცხვი მეტია ერთზე.

გ) t დროში მწყობრიდან გამოსული მოტორების უაღბათესი რიცხვი.

ამოხსნა: აღვნიშნოთ ხდომილობა $A = \{\text{თვითმფრინავის მოტორი გამოდის მწყობრიდან } t \text{ დროში}\}$. ამოცანის პირობით

$$P = P(A) = 0,1 \quad q = P(\bar{A}) = 1 - P = 0,9, \quad n = 4$$

ა) ვისარგებლოთ ბერნულის ფორმულით

$$P_n(k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

სადაც $0 < p < 1, 0 \leq k \leq n$ რადგან $k=2$, მივიღებთ:

$$P_4(2) = \frac{4!}{2!2!} (0,1)^2 (0,9)^2 = 0,0486$$

ბ) ზოგადი საძიებელია $P_n(k_1 \leq k \leq k_2)$ – ალბათობა იმისა, რომ n ცდაში A ხდომილობის მოხდენათა რიცხვი k მიიღებს მნიშვნელობას $[k_1, k_2]$ შუალედიდან. ცხადია:

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} P_n(k)$$

რადგან $\lambda = np = 4 \cdot 0,1 = 0,4 < 10$, ამიტომ თუ ვისარგებლებთ პუასონის ასიმპტოტური ფორმულით

$$P_n(K) \approx \frac{\lambda^K}{K!} e^{-\lambda}$$

საძიებელი ალბათობის გამოსათვლელად მივიღებთ გამოსახულებას

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{\lambda}{k!} e^{-\lambda}$$

მაშასადამე

$$P_4(2 \leq k \leq 4) \approx \sum_{k=2}^4 \frac{(0,4)^k}{k!} e^{-0,4} = \sum_{K=0}^4 \frac{(0,4)^K}{k!} e^{-0,4} - \sum_{K=0}^1 \frac{(0,4)^K}{k!} e^{-0,4}$$

ვისარგებლოთ ცხრილი IV-ით (იხ. დამატება). რადგან $m=4$, ან $m=1 \lambda=0,4$, გვექნება:

$$P_4(2 \leq k \leq 4) \approx 0,9999 - 0,9384 = 0,0615$$

შენიშვნა: ჩვენ შემთხვევაში $n=4$ არაა დიდი რიცხვი, ამიტომ საძიებელი ალბათობის გამოსათვლელად შეიძლება ვისარგებლოთ ბერნულის ფორმულითაც. მივიღებთ

$$P_4(2 \leq k \leq 4) = \sum_{K=2}^4 C_4^k P^k q^{n-k} = P_4(2) + P_4(3) + P_4(4) =$$

$$= \frac{4!}{2!2!} (0,1)^2 (0,9)^2 + \frac{4!}{3!1!} (0,1)^3 (0,9) + \frac{4!}{2!0!} (0,1)^4 = 0,0523$$

მაგრამ ეს მეთოდი უფრო შრომატევადია და თანაც როგორც აღვნიშნეთ, რადგან $np < 10$, უკეთეს მიახლოებას გვაძლევს ზემოთ განხილული მეთოდი პუასონის ასიმპტოტური ფორმულის გამოყენებით,

გ) როგორც ცნობილია, t დროში მწყობრიდან გამოსული მოტორების რიცხვის უაღბათესი მნიშვნელობა K_0 იქნება $(n+1)p$ რიცხვის მთელი ნაწილის - $[(n+1)p]$ ტოლი (თუ $(n+1)p$ მთელი რიცხვია, მაშინ გვაქვს ორი უაღბათესი მნიშვნელობა $K_0=(n+1)p-1$ და $K_0=(n+1)p$). ჩვენ შემთხვევაში $(n+1)p=(4+1) \cdot 0,1=0,5$

ამიტომ

$$K_0=[(n+1)p]=[0,5]=0$$

შენიშვნა: ზოგიერთ ამოცანაში უმჯობესია დავწეროთ უტოლობა, რომელსაც აკმაყოფილებს უაღბათესი მნიშვნელობა K_0 . კერძოდ,

$$np - q \leq K_0 \leq np + q$$

2. ავტომატური დაზვის მიერ სტანდარტული დეტალის დამზადების ალბათობა ტოლია 0,9-ის. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ დაზვის მიერ დამზადებული 100 დეტალიდან სტანდარტულია: ა) 93 დეტალი; ბ) არანაკლებ 81 და არაუმეტეს 93 დეტალი.

ამოხსნა: ჩავთვალოთ, რომ ავტომატური დაზვა ცალკეულ დეტალს ამზადებს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. $n=100$ სტანდარტული დეტალის დამზადების (ხდომილობა A) ალბათობა $p=p(A)=0,9$

$$q=P(\bar{A})=1-P=1-0,9=0,1; npq=100 \cdot 0,9 \cdot 0,1=9; np=100 \cdot 0,9=90 > 10$$

ა) რადგან $K=93$, $n=100$ საკმარისად დიდი რიცხვია, ამიტომ საძიებელი $P_n(k)$ ალბათობის გამოთვლა ბერნულის ფორმულით ტექნიკურად რთულდება.

როგორც ვნახეთ $np > 10$, $npq = 9$. მაშასადამე, შეგვიძლია ვისარგებლოთ მუავრ-ლაპლასის ლოკალური ზღვართი ფორმულით:

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \phi(x)$$

სადაც

$$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}},$$

$$0 < p < 1 \text{ და } \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$\phi(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი I-ით (იხ. დამატება). $\Phi(-x) = \phi(x)$, $\phi(x) \approx 0,0001$, როცა $x \geq 4$ ჩვენ შემთხვევაში

$$x = \frac{93 - 90}{\sqrt{9}} = 1,$$

ცხრილი I-ის მიხედვით ვპოულობთ $\phi(1) \approx 0,242$ მაშასადამე,

$$P_{100}(93) \approx \frac{1}{\sqrt{9}} \phi(1) \approx 0,081$$

გ) საძიებელია ალბათობა $P_n(k_1 \leq k \leq k_2)$, $k_1 = 81$, $k_2 = 93$

$np > 10$ ვისარგებლოთ მუავრ-ლაპლასის ინტეგრალური ზღვართი თეორემით, კერძოდ, როცა $0 < p < 1$, საკმაოდ დიდი n -თვის ვწერთ:

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1),$$

სადაც

$$x_{10} = \frac{K_1 - np}{\sqrt{npq}}, x_2 = \frac{K_2 - np}{\sqrt{npq}}, \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

ფუნქციის მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი II-ით (იხ. დანართი).

$$\text{ამასთან } \Phi_0(-X) = -\Phi_0(X)$$

ჩვენ შემთხვევაში

$$x_1 = \frac{81 - 90}{\sqrt{9}} = -3, x_2 = \frac{93 - 90}{\sqrt{9}} = 1$$

ვინაიდან

$$\Phi_0(-3)=-\Phi_0(3)\approx 0,4986 \text{ და } \Phi_0(1)\approx 0,3413$$

ამიტომ

$$P_{10}(81\leq k\leq 93)\approx 0,3413+0,4986=0,8399$$

3. ქარხანაში არასტანდარტული ნაწარმის დამზადების ალბათობა ტოლია 0,004. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ დამზადებული 1000 ნაწარმიდან არასტანდარტული აღმოჩნდება 10.

ამოხსნა: აღვნიშნოთ ხდომილობა $A=\{\text{ქარხნის მიერ დამზადებული ნაწარმი არასტანდარტულია}\}$, ამოცანის პირობის თანახმად

$$P=P(A)=0,004, q=P(\bar{A})=1-P=1-0,004=0,996$$

$n=1000$ საკმარისად დიდი, ხოლო $P=0,004$ საკმარისად მცირე რიცხვია, ამასთან

$$\lambda=nP=1000\cdot 0,004=4 < 10, npq=1000\cdot 0,004\cdot 0,996=3,984 < 9$$

ამიტომ შეგვიძლია ვისარგებლოთ პუასონის ასიმეტრიული ფორმულით

$$Pn(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

ცხრილი III-ის გამოყენებით (იხ. დამატება) $k=10$ და $\lambda=4$

$$P_{1000}(10)\approx 0,00529.$$

§7. დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კანონი, მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია

(1-30) ვიპოვოთ დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის

ა) მათემატიკური ლოდინი; ბ) დისპერსია, საშუალო კვადრატული გადახრა; გ) $P\{-1\leq \xi < 5\}$, თუ ξ -ს განაწილების კანონს აქვს სახე:

1.

ξ	-5	0	3	4	5
P_ξ	0.2	0.1	0.3	0.2	P

2.

ξ	-1	0	2	5
P_ξ	0.5	P	0.1	0.1

3.

ξ	-10	-2	3	5
P_ξ	P	0.2	0.4	0.1

4.

ξ	0	3	5	10
P_ξ	0.1	0.2	0.3	P

5.

ξ	-10	-4	1	2
P_ξ	0.1	0.1	0.2	P

6.

ξ	-1	1	4	5
P_ξ	0.2	0.1	P	0.3

7.

ξ	10	11	12
P_ξ	0.4	0.1	P

8.

ξ	5	5.1	6.5
P_ξ	P	0.4	0.2

9.

ξ	1	2.5	5
P_ξ	0.1	P	0.3

10.

ξ	6	6.5	10
P_ξ	0.3	P	0.5

11.

ξ	-10	-8.5	0
P_ξ	0.3	P	0.4

12.

ξ	15	20	25
P_ξ	0.4	P	0.4

13

ξ	-12	-11	12
P_ξ	0.4	P	0.3

14

ξ	-15	-12	1
P_ξ	P	0.7	0.2

15

ξ	-1.5	1.5	2.5
P_ξ	0.1	0.2	P

16

ξ	-1	-0.5	1	5
P_ξ	0.1	0.2	0.3	P

17

ξ	-4	-2.5	0	1.5
P_ξ	0.2	0.1	0.3	P

18

ξ	-3.5	3	25
P_ξ	P	0.4	0.3

19

20

ξ	-2.5	-2	3	5
P_ξ	0.1	0.2	0.4	P

21

ξ	25	30	35
P_ξ	P	0.2	0.4

22

ξ	-1.7	0	2	3
P_ξ	0.1	P	0.5	0.1

23

ξ	1.8	1.9	2	3	4
P_ξ	P	0.1	0.1	0.3	0.2

24

ξ	-0.5	-0.1	0	9
P_ξ	P	0.1	0.3	0.4

25

ξ	-15	-10	-5	-1
P_ξ	0.4	P	0.1	0.3

26

ξ	25	25.1	26	27
P_ξ	0.1	0.2	P	0.5

27

ξ	13	17	19	20
P_ξ	P	0.4	0.2	0.1

28

ξ	-2.5	5	11	21
P_ξ	P	0.1	0.3	0.2

29

ξ	0.1	0.15	0.16	0.17
P_ξ	0.1	0.2	P	0.3

30

ξ	-30	-20	10	11
P_ξ	P	0.5	0.1	0.1

ξ	5	10	15	20	25
P_ξ	0.1	0.1	0.1	0.1	P

§8. უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია, განაწილების სიმკვრივე, მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია

(1-20) იპოვეთ უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის
 ა) განაწილების სიმკვრივე და პარამეტრი; ბ) მათემატიკური ლოდინი; გ) დისპერსია; დ) მოცემულ ინტერვალში მოხვედრის ალბათობა, თუ ξ -ის განაწილების ფუნქციას აქვს სახე:

$$1. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 0 \\ \alpha x^2, & \text{ཅུ་གྱི་ } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > 1 \end{cases}$$

$$P\left(\frac{1}{2} < \xi < 1\right)$$

$$2. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 1 \\ \alpha(x^2 - x), & \text{ཅུ་གྱི་ } 1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > 2 \end{cases}$$

$$P\left(\frac{1}{2} < \xi < 1\frac{1}{2}\right)$$

$$3. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 1 \\ \alpha x^3, & \text{ཅུ་གྱི་ } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > 1 \end{cases}$$

$$P\left(0 < \xi < \frac{1}{2}\right)$$

$$4. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 0 \\ \alpha(x^2 + 2x), & \text{ཅུ་གྱི་ } 0 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$P\left(0 < \xi < \frac{1}{4}\right)$$

$$5. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 2 \\ ax - 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } 2 \leq x \leq 4 \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > 4 \end{cases}$$

$$P\left(3 < \xi < 3\frac{1}{2}\right)$$

$$6. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{ཅུ་གྱི་ } x \leq 0 \\ ax^2, & \text{ཅུ་གྱི་ } 0 < x \leq 3 \\ 1, & \text{ཅུ་གྱི་ } x > 3 \end{cases}$$

$$P(1 < \xi < 2)$$

$$7. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ်ၤ } x \leq 0 \\ ax^2, & \text{တၢ်ၤ } 0 < x \leq 2 \\ 1, & \text{တၢ်ၤ } x > 2 \end{cases}$$

$$P(1 < \xi < 2)$$

$$8. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ်ၤ } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a \cos x, & \text{တၢ်ၤ } x \in]-\frac{\pi}{2}, 0] \\ 1, & \text{တၢ်ၤ } x > 0 \end{cases}$$

$$P(-\frac{\pi}{6} < \xi < 0)$$

$$9. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ်ၤ } x \leq 0 \\ a \sin x, & \text{တၢ်ၤ } 0 < x \leq \frac{\pi}{6} \\ 1, & \text{တၢ်ၤ } x > \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$P(0 < \xi < \frac{\pi}{8})$$

$$10. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ်ၤ } x \leq \frac{3}{4}\pi \\ a \cos 2x, & \text{တၢ်ၤ } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi \\ 1, & \text{တၢ်ၤ } x > \pi \end{cases}$$

$$P(\frac{3}{4}\pi < \xi < \pi)$$

$$11. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ်ၤ } x \leq -1 \\ a(x+1), & \text{တၢ်ၤ } -1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{တၢ်ၤ } x > 2 \end{cases}$$

$$P(0 \leq \xi \leq 1)$$

$$12. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq \frac{1}{2} \\ ax^2, & \text{တၢ် } \frac{1}{2} < x \leq 1 \\ 1, & \text{တၢ် } x > 1 \end{cases}$$

$$P(0.5 \leq \xi \leq 0.9)$$

$$13. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq 0 \\ ax^2, & \text{တၢ် } 0 < x \leq 2 \\ 1, & \text{တၢ် } x > 2 \end{cases}$$

$$P(0 < \xi \leq 1)$$

$$14. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq 2 \\ a(2x-3), & \text{တၢ် } 2 < x \leq 4 \\ 1, & \text{တၢ် } x > 4 \end{cases}$$

$$P(2 \leq \xi < 3)$$

$$15. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a \sin x, & \text{တၢ် } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{တၢ် } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$P(0 \leq \xi \leq \frac{\pi}{6})$$

$$16. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq 0 \\ ax, & \text{တၢ် } 0 < x \leq 4 \\ 1, & \text{တၢ် } x > 4 \end{cases}$$

$$P\{0 < \xi \leq 3\}$$

$$17. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq 0 \\ ax, & \text{တၢ် } 0 < x \leq 4 \\ 1, & \text{တၢ် } x > 4 \end{cases}$$

$$P\{1 \leq \xi \leq 3\}$$

$$18. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x \leq 0 \\ a \sin x, & \text{თუ } 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{თუ } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$P\{0 < \xi \leq \frac{\pi}{2}\}$$

$$19. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x \leq 0 \\ a \sin 2x, & \text{თუ } 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 1, & \text{თუ } x > \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$P\{\frac{\pi}{8} < x < \frac{\pi}{4}\}$$

$$20. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x \leq \frac{\pi}{6} \\ a \cos 3x, & \text{თუ } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3} \\ 1, & \text{თუ } x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$P\{\frac{\pi}{6} < \xi \leq \frac{\pi}{2}\}$$

(21-30) იპოვეთ უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის: ა) განაწილების ფუნქცია, განაწილების უცნობი პარამეტრი a , ბ) მათემატიკური ლოდინი, დისპერსია, გ) მოცემულ ინტერვალში მოხვედრის ალბათობა, თუ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივეს აქვს სახე:

$$21. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x \leq -2 \\ a/2, & \text{თუ } -2 < x \leq 2 \\ 0, & \text{თუ } x > 2 \end{cases}$$

$$P\{0 < \xi \leq 2\}$$

$$22. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x < \frac{1}{3} \\ 3a, & \text{တၢ် } \frac{1}{3} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{တၢ် } x > 1 \end{cases}$$

$$P\{\frac{1}{2} < x \leq 1\}$$

$$23. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x < 4 \\ ax, & \text{တၢ် } 4 \leq x \leq 4.5 \\ 0, & \text{တၢ် } x > 4.5 \end{cases}$$

$$P\{4.3 \leq \xi \leq 4.5\}$$

$$24. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x \leq 1 \\ 2ax, & \text{တၢ် } 1 < x \leq \sqrt{2} \\ 0, & \text{တၢ် } x > \sqrt{2} \end{cases}$$

$$P\{1 < x < 1.1\}$$

$$25. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x < -1 \\ a(x+1), & \text{တၢ် } -1 \leq x \leq 0 \\ 0, & \text{တၢ် } x > 0 \end{cases}$$

$$P\{-\frac{1}{2} < \xi \leq 0\}$$

$$26. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x < 0 \\ 3ax^2, & \text{တၢ် } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{တၢ် } x > 1 \end{cases}$$

$$P\{0 \leq x \leq \frac{1}{2}\}$$

$$27. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{တၢ် } x < 0 \\ 2ax, & \text{တၢ် } 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0, & \text{တၢ် } x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$P\{0 \leq \xi \leq 1\}$$

$$28. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x < 21 \\ a, & \text{თუ } 21 \leq x \leq 22 \\ 0, & \text{თუ } x > 22 \end{cases}$$

$$P\{21 \leq x \leq 21.5\}$$

$$29. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x > \frac{1}{8} \\ 8a, & \text{თუ } \frac{1}{8} \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{თუ } x \geq 1 \end{cases}$$

$$P\{\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{1}{4}\}$$

$$30. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{თუ } x < 0 \\ ax^3, & \text{თუ } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{თუ } x > 2 \end{cases}$$

$$P\{1 \leq x \leq 2\}$$

§9. თანაბარი, მაჩვენებლიანი და ნორმალური განაწილების კანონი

1. ჯ შემთხვევითი სიდიდე თანაბრადაა განაწილებული [5;6] შუალედში. დაწერეთ ჯ-ს განაწილების სიმკვრივე, იპოვეთ ჯ-ს განაწილების ფუნქცია, მათემატიკური ლოდინი და საშუალო კვადრატული გადახრა.

2. გამზომი ხელსაწყო სკალის დანაყოფის ფასია 0,2. ხელსაწყო მაჩვენებელი მრგვალდება უახლოეს მთელ დანაყოფამდე. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ათვისას დაშვებულია შეცდომა (ცდომილობა), რომელიც არ აღემატება 0,004-ს.

3. წინა ამოცანის პირობებში იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ათვისას დაშვებული ცდომილობა აღემატება 0,05-ს.

4. ელექტროსაათის წუთების ისარი გადაადგილდება ნახტომებით ყოველი წუთის ბოლოს. იპოვეთ ალბათობა

იმისა, რომ მოცემულ მომენტში საათი აჩვენებს დროს, რომელიც ჭეშმარიტი დროისაგან განსხვავდება არა უმეტეს 20 წამისა.

5. იპოვეთ $[2;8[$ ინტერვალში თანაბრად განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია, დისპერსია და საშუალო კვადრატული გადახრა.

6. ქარხანა ამზადებს ერთი სახის მილებს. მილის დიამეტრი იზომება მიახლოებით $[9; 9,5]$ შუალედში, ამასთან ჩავთვალოთ მილის დიამეტრი ξ შემთხვევით სიდიდედ, რომელიც თანაბრადაა განაწილებული $[9; 9,5]$ შუალედში. დაწერეთ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია, გამოთვალეთ $M(\xi)$ და $D(\xi)$.

7. $[5-b, 5+b[$ ინტერვალში თანაბარი კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდისათვის დაწერეთ განაწილების სიმკვრივე და გამოთვალეთ მათემატიკური ლოდინი და საშუალო კვადრატული გადახრა.

8. იპოვეთ $[-9;5[$ შუალედში თანაბრად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე და $[-10;5]$ ინტერვალში მოხვედრის ალბათობა.

9. დაწერეთ მაჩვენებლიანი კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე, განაწილების ფუნქცია, როცა პარამეტრი $\lambda=5$ და გამოთვალეთ ამ შემთხვევითი სიდიდის $[0,1;1]$ ინტერვალში მოხვედრის ალბათობა.

10. დაწერეთ მაჩვენებლიანი კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე და გამოთვალეთ $M(\xi)$ და $D(\xi)$, თუ განაწილების პარამეტრი $\lambda=6$.

11. მაჩვენებლიანი კანონი განაწილებული უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევაში სიდიდის განაწილების სიმკვრივეს აქვს სახე

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x < 0 \\ 0,04e^{-0,04x}, & \text{როცა } x \geq 0 \end{cases}$$

იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ξ შემთხვევითი სიდიდე მიიღებს მნიშვნელობას $(1;2)$ ინტერვალიდან და გამოთვალეთ საშუალო კვადრატული გადახრა.

12. მაჩვენებლიანი კანონით განაწილებული უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციას აქვს სახე

$$f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.6x}, & \text{როცა } x \geq 0 \\ 0, & \text{როცა } x < 0 \end{cases}$$

იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ξ მიიღებს მნიშვნელობას $[2;5[$ ინტერვალიდან და დაწერეთ განაწილების სიმკვრივე.

13. იპოვეთ დისპერსია და საშუალო კვადრატული გადახრა მაჩვენებლიანი კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდისათვის, თუ მისი განაწილების სიმკვრივეს აქვს სახე

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x < 0 \\ 10e^{-10x}, & \text{როცა } x \geq 0 \end{cases}$$

14. ჩაწერეთ ნორმალური კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივისა და განაწილების ფუნქციის ანალიზური სახე, ააგეთ შესაბამისი გრაფიკები, თუ ξ -ს განაწილების პარამეტრებია:

$$a = M(\xi) = 3, \quad \sigma = \sqrt{D(\xi)} = 2$$

15. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a = M(\xi) = 10$ და $\sigma = \sqrt{D(\xi)} = 2$. იპოვეთ $P\{12 < \xi < 14\}$

16. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a = M(\xi) = 20$, $\sigma = \sqrt{D(\xi)} = 5$. იპოვეთ $P\{15 < \xi < 25\}$

17. გაზომვის შედეგების შეცდომები განაწილებულია ნორმალური კანონით პარამეტრებით $a = 0$ მმ და $\sigma = 20$ მმ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ გაზომვის შეცდომის აბსოლუტური სიდიდე ნაკლები იქნება 10 მმ-ზე.

18. ნორმალური კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივეს აქვს სახე:

$$f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{50}}$$

იპოვეთ ξ -ის განაწილების ფუნქცია, მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია.

19. ავტომატი ამზადებს დეტალებს. იზომება დეტალის სიგრძე ξ , რომელიც განაწილებულია ნორმალური კანონით 50მმ-ის ტოლი მათემატიკური ლოდინით (საპროექტო სიგრძე). ფაქტიურად დამზადებული დეტალების სიგრძეები არანაკლებია 32მმ-ზე და არ აღემატება 67მმ-ს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული დეტალის სიგრძე მეტია 55მმ-ზე.

20. წინა ამოცანის პირობებში იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით აღებული დეტალის სიგრძე ნაკლებია 40მმ-ზე.

21. რაღაც ნივთიერების აწონვის დროს დაშვებული შემთხვევითი შეცდომები (ცდომილება) ξ განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=20$ გ. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ აწონის დროს დაშვებული შეცდომების აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აღემატება 10გ-ს.

22. ტექნიკური კონტროლის განყოფილება ამოწმებს ქარხანაში დამზადებული ერთიდაიგივე სახის ნაწარმის ξ სიგრძეს, ითვლება, რომ იგი განაწილებულია ნორმალური კანონით $\mu=0,4$ მმ-ის ტოლი საშუალო კვადრატული გადახრით. ნაწარმი ვარგისია, თუ მისი სიგრძის გაზომვის შედეგის საპროექტო ზომისაგან გადახრის აბსოლუტური მნიშვნელობა ნაკლებია 0,7მმ-ზე. იპოვეთ რამდენია ვარგისი 150 ნაწარმში.

23. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით $a=M(\xi)=0$, $\sigma^2=D(\xi)=1$ პარამეტრებით. დაწერეთ ξ -ს განაწილების ფუნქციის ანალიზური სახე, ააგეთ შესაბამისი გრაფიკები და იპოვეთ $P\{|\xi|<2\}$

24. ნორმალური კანონით განაწილებული ξ შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია შესაბამისად ტოლია 10 და 4-ის. იპოვეთ $\{12<\xi<14\}$

25. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a=M(\xi)=30$ და

$\sigma^2=D(\xi)=400$. იპოვეთ $P\left\{\left|\frac{\xi-a}{\sigma}\right|<\delta\right\}$, თუ $\delta=5$.

26. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის მათემატიკური ლოდინი 0-ია. ამ შემთხვევითი სიდიდის $]-1;1[$ ინტერვალში მოხვედრის

აღბათობა ტოლია 0,5-ის. იპოვეთ შემთხვევითი სიდიდის საშუალო კვადრატული გადახრა - σ .

მითითება: ისარგებლეთ (7.7) ფორმულით და ცხრილი II-ით.

27. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a=M(\xi)=20$ და $\sigma^2=D(\xi)=100$. იპოვეთ $P\{|\xi-a|<\delta\}$ თუ $\delta=3$

28. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a=M(\xi)=30$ და $\sigma^2=D(\xi)=100$. იპოვეთ $P\{10<\xi<50\}$

29. ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია ნორმალური კანონით, რომლის პარამეტრებია $a=M(\xi)=7$ და $\sigma^2=D(\xi)=49$. დაწერეთ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივისა და განაწილების ფუნქციის ანალიზური სახე. ააგეთ შესაბამისი გრაფიკები.

30. წინა ამოცანის პირობები გამოთვალეთ $P\{-10<\xi<10\}$

დისკრეტული განაწილების თეორიული

მაბალითები

31. მონეტას აგდებენ ბრტყელ ზედაპირზე ერთხელ. დაწერეთ ხდომილობა $A = \{\text{ბორჯღაღალი}\}$ -ის მოხდენათა X რიცხვის განაწილების კანონი, იპოვეთ განაწილების რიცხვითი მახასიათებლები: მათემატიკური ლოდინი, დისპერსია, სტანდარტული გადახრა, შეადგინეთ შესაბამისი განაწილების ფუნქცია.

32. საინფორმაციო არხზე ინფორმაცია გადაიცემა 0 ან 1 სიმბოლოს გამოყენებით ყოველ ბიტ ინფორმაციაში. 0-ის გადაცემის ალბათობა 0,4-ის ტოლია. იპოვეთ 0-ის გადაცემათა X რიცხვის განაწილების კანონი, შესაბამისი მათემატიკური ლოდინი, დისპერსია, სტანდარტული გადახრა და განაწილების ფუნქცია, თუ გადაიცა 1 ბიტი ინფორმაცია.

33. მიზანში ისვრიან ერთხელ. მოხვედრის ალბათობა უდრის 0,3-ს იპოვეთ მიზანში მოხვედრათა X რიცხვის განაწილების კანონი, იპოვეთ $M(x)$, $D(x)$, σ_x და განაწილების $F(x)$ ფუნქცია.

34. დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდე ღებულობს მნიშვნელობებს $x_1=3$, $x_2=5$, $x_3=8$, შესაბამისი ალბათობებით $P_1=0,4$; $P_2=0,15$; და $P_3=P$, დაწერეთ X შ.ს.-ის განაწილების კანონი და ააგეთ შესაბამისი განაწილების ფუნქცია.

35. (დისკრეტული თანაბარი განაწილების მაგალითი) X შემთხვევითი სიდიდე არის კამათელის გაგორებისას მოსული ქულა. დაწერეთ ამ შ.ს.-ის სიდიდის განაწილების კანონი. იპოვეთ შესაბამისი რიცხვითი მახასიათებლები $M(x)$, $D(x)$, σ_x

36. თითოეული ბიტი ინფორმაცია გადაიცემა 0 ან 1 სიმბოლოს გამოყენებით თანაბარი ალბათობით. გადაცემულია 3 ბიტი ინფორმაცია. დაწერეთ 1-იანის გადაცემათა რიცხვის განაწილების კანონი. იპოვეთ შესაბამისი რიცხვითი მახასიათებლები $(M(x), D(x), \sigma_x)$, ააგეთ შესაბამისი განაწილების ფუნქცია.

37. მსროლელი მიზანში ისვრის 3-ჯერ. ყოველი გასროლისას მიზანში მოხვედრის ალბათობა უდრის 0,4-ს. ყოველი მოხვედრის შემთხვევაში მსროლელს 5 ქულა ეწერება, შეადგინეთ მსროლელის მიერ მიღებული X ქულის განაწილების კანონი. იპოვეთ შესაბამისი განაწილების ფუნქცია და განაწილების რიცხვითი მახასიათებლები $(M(x), D(x), \sigma_x)$.

38. მონეტას აგდებენ ბრტყელ ზედაპირზე 4-ჯერ. დაწერეთ {საფასურის} მოსვლათა X რიცხვის განაწილების კანონი, იპოვეთ შესაბამისი რიცხვითი მახასიათებლები, ააგეთ განაწილების ფუნქცია.

39. მსროლელი, რომელსაც 3 ვაზნა აქვს, ესვრის მიზანში პირველ მოხვედრამდე. ყოველ გასროლისას მოხვედრის (ხდომილობა A) ალბათობა 0,8-ის ტოლია. იპოვეთ დახარჯული ვაზნების განაწილების კანონი და შესაბამისი რიცხვითი მახასიათებლები.

§10. მეთოდური მითითებები

1. ვიპოვოთ დისკრეტული ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის ა) მათემატიკური ლოდინი; ბ) დისპერსია და საშუ-

აღო კვადრატული გადახრა, თუ ξ -ს განაწილების კანონს აქვს სახე

ξ	-1	2
P_ξ	P	0.6

ამოხსნა: როგორც ცნობილია დისკრეტული განაწილების კანონის შესაბამისი ალბათობების ჯამი ტოლია ერთის, ე.ი.

$$P+0,6=1 \quad P=0,4$$

ა) ვისარგებლოთ დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინის გამოსათვლელი ფორმულით

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i P_i$$

რის შედეგადაც მივიღებთ

$$M(\xi) = -1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,6 = 0,8$$

გ) დისპერსიის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ ფორმულით

$$D(\xi) = M(\xi^2) - [M(\xi)]^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 P_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i P_i \right)^2$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენს შემთხვევაში $M(\xi) = 0,8$, მივიღებთ:

$$D(\xi) = 1 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,6 - (0,8)^2 = 2,16$$

საშუალო კვადრატული გადახრა აღვნიშნოთ σ_ξ -თი. ცნობილია, რომ

$$\sigma_\xi = \sqrt{D(\xi)}, \text{ ე.ი.}$$

$$\sigma_\xi = \sqrt{2,16} \approx 1,47$$

2. უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქციას აქვს სახე:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x \leq 0 \\ ax^3, & \text{როცა } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{როცა } x > 1 \end{cases}$$

ვიპოვოთ: ა) ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივე $f(x)$ და a პარამეტრი. ბ) მათემატიკური ლოდინი, დისპერსია და საშუალო კვადრატული გადახრა. გ) ალბათობა იმისა, რომ ξ შემთხვევითი სიდიდე მიიღებს მნიშვნელობებს $[0; \frac{1}{2}]$ შუალედიდან.

ამოხსნა: ა) როგორც ცნობილია $f(x) = F'(x)$, ამიტომ გვექნება:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x \leq 0 \\ 3ax^2, & \text{როცა } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{როცა } x > 1 \end{cases}$$

პარამეტრის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ პირობით

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1, \text{ მივიღებთ}$$

$$\int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 3ax^2 dx + \int_1^{+\infty} 0 dx = 1,$$

მაშასადამე

$$a = 1$$

ე.ი

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x \leq 0 \\ 3x^2, & \text{როცა } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{როცა } x > 1 \end{cases}$$

ბ) შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ ფორმულით:

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx,$$

მივიღებთ:

$$M(\xi) = 3 \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{3}{4},$$

ხოლო დისპერსია გამოვთვალოთ ფორმულით:

$$D(\xi) = M(\xi^2) - [M(\xi)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx \right)^2,$$

რის შედეგადაც მივიღებთ:

$$D(\xi) = 3 \int_0^1 x^4 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} x^5 \Big|_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80},$$

საშუალო კვადრატული გადახრა σ_ξ ტოლი იქნება:

$$\sigma_\xi = \sqrt{\frac{3}{80}} \approx 0.2,$$

გ) საძიებელია ალბათობა $P\{0 \leq \xi \leq \frac{1}{2}\}$

როგორც ცნობილია ალბათობა იმისა, რომ ξ შემთხვევითი სიდიდე მიიღებს მნიშვნელობას $[a, b]$ შუალედიდან, გამოითვლება ფორმულით

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = F(b) - F(a)$$

ან

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$$

ვისარგებლოთ ერთ-ერთი მათგანით, მივიღებთ:

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 0 = \frac{1}{8}$$

3. ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვრივეს აქვს სახე:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x < 0 \\ \cos x, & \text{როცა } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{როცა } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

ვიპოვოთ ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების ფუნქცია.

ამოხსნა

რადგან $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, ამიტომ:

როცა $x < 0$, მაშინ

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0,$$

როცა $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, მაშინ

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^x \cos t dt = \sin t \Big|_0^x = \sin x,$$

როცა $x > \frac{\pi}{2}$, მაშინ

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 0dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^x 0dt = 1.$$

მაშასადამე

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x < 0 \\ \sin x, & \text{როცა } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{როცა } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

4. ამპერმეტრის სკალას დანაყოფის ფასია 0,1 ამპ. გაზომვის შედეგი მრგვალდება უახლოეს მთელ დანაყოფამდე. ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ათვლისას დაშვებული ცდომილება აღემატება 0,02 ამპ-ს.

ამოხსნა: ანათვალის დამრგვალებით გამოწვეული ცდომილება შეიძლება განვიხილოთ როგორც შემთხვევითი სიდიდე ξ , რომელიც განაწილებულია თანაბრად 0,1-ის ტოლი სიგრძის ინტერვალში. (ანუ ξ მოთავსებულია ინტერვალში ორ მეზობელ მთელ დანაყოფს შორის).

ამიტომ ξ -ს განაწილების სიმკვრივე $f(x) = \frac{1}{b-a}$, $b-a$ არის იმ ინტერვალის სიგრძე, სადაც მოთავსებულია ξ და $f(x) = 0$ ამ ინტერვალის გარეთ ჩვენ შემთხვევაში $f(x) = \frac{1}{0.1} = 10$.

ცხადია, რომ ანათვალის ცდომილობა გადააჭარბებს 0,02 ამპ-ს თუ იგი მოთავსებული იქნება $[0,03; 0,08[$ ინტერვალში. ზემოთ განხილული ამოცანა 2-ის გ) პირობის ანალოგიურად გამოვითვლით:

$$P\{0.02 < \xi < 0.08\} = \int_{0.02}^{0.08} 10dx = 0.6$$

5. უწყვეტი ტიპის ξ შემთხვევითი სიდიდის განაწილების სიმკვირივეს აქვს სახე

$$f(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & \text{როცა } x \geq 0 \\ 0, & \text{როცა } x < 0 \end{cases}$$

ვიპოვოთ ალბათობა იმისა, რომ ξ მიიღებს მნიშვნელობას $]0,13; 0,7[$ ინტერვალიდან.

ამოხსნა: როგორც ვხედავთ ξ შემთხვევითი სიდიდე განაწილებულია მაჩვენებლიანი განაწილების კანონით, ამიტომ საძიებელი ალბათობის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ ფორმულით:

$$P\{\alpha \leq \xi \leq \beta\} = e^{-\lambda\alpha} - e^{-\lambda\beta},$$

ჩვენ შემთხვევაში $\lambda=3$; $\alpha=0,13$; $\beta=0,7$. ამიტომ მივიღებთ

$$P\{0.13 < \xi < 0.7\} = e^{-3 \cdot 0.13} - e^{-3 \cdot 0.7} = e^{-0.39} - e^{-2.1},$$

ვისარგებლოთ e^{-x} ფუნქციის მნიშვნელობათა ცხრილებით, რის შედეგადაც მივიღებთ, რომ:

$$P\{0.13 < \xi < 0.7\} = 0.671 - 0.122 = 0.555$$

6. ავტომატი ამზადებს ბურთულებს. ბურთულა ვარგისია, თუ მისი დიამეტრის საპროექტო ზომიდან ξ გადახრის აბსოლუტური მნიშვნელობა $0,7$ მმ-ზე ნაკლებია. ξ განაწილებულია ნორმალურად $a=0$ მმ-ის ტოლი მათემატიკური ლოდინითა და $\sigma=0,4$ მმ-ის ტოლი საშუალო კვადრატული გადახრით. რამდენი ვარგისი ბურთულაა დამზადებული ავტომატის მიერ 100 ბურთულიდან?

ამოხსნა: ξ შემთხვევითი სიდიდე აღნიშნავს ბურთულის დიამეტრის საპროექტო ზომიდან გადახრას, ξ განაწილებულია ნორმალური განაწილების კანონით და $M(\xi)=a=0$. ვისარგებლოთ ფორმულით:

$$P(|\xi - a| < \delta) = 2\Phi_0\left(\frac{\delta}{\sigma}\right),$$

სადაც $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ ლაპლასის ფუნქცია და მისი მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილი II-ით (იხ. დამატება).

ჩვენ შემთხვევაში $\delta=0,7$, $\sigma=0,4$, $a=0$, რის გამოც მივიღებთ

$$P\{|\xi| < 0.7\} = 2\Phi_0\left(\frac{0.7}{0.4}\right) = 2\Phi(1.75)$$

ცხრილი II-დან ვპოულობთ $\Phi_0(1,75)\approx 0,4599$. ამიტომ

$$P\{|\xi| < 0.7\} = 2 \cdot 0.4599 = 0.92$$

პასუხები

§5

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. 0,2; 1,7; 13,01; 3,6 | 2. 0,3; 0,2; 3,36; 1,8 |
| 3. 0,1; -2,3; 31,61; 5,6 | 4. 0,4; 6,1; 12,09; 3,5 |
| 5. 0,6; 0; 14,2; 3,3 | 6. 0,4; 3; 5,2; 2,3 |
| 7. 0,5; 11,1; 0,89; 0,94 | 8. 0,4; 5,31; 28,9; 5,3 |
| 9. 0,6; 3,1; 1,74; 1,3 | 10. 0,2; 8,1; 3,64; 1,9 |
| 11. 0,3; -5,55; 20,9; 4,3 | 12. 0,2; 20; 20; 4,2 |
| 13. 0,3; -4,5; 116,45; 10,8 | 14. 0,1; -9,7; 29,41; 5,4 |
| 15. 0,7; 1,9; 1,14; 1,2 | 16. 0,4; 2,1; 6,04; 2,49 |
| 17. 0,4; -0,45; 4,56; 2,1 | 18. 0,3; 8,65; 120; 11 |
| 19. 0,3; 2,05; 12,3; 3,5 | 20. 0,4; 30; 21; 4,6 |
| 21. 0,3; 1,13; 1,91; 1,4 | 22. 0,3; 2,63; 0,64; 0,8 |
| 23. 0,2; 2,59; 25,7; 5,07 | 24. 0,2; 08,8; 35,4; 5,9 |
| 25. 0,2; 16,22; 424,1; 20,8 | 26. 0,3; 16,5; 6,25; 2,5 |
| 27. 0,4; 7; 80,5; 9 | 28. 0,4; 0,16; 0,169; 0,4 |
| 29. 0,3; -16,9; 183,1; 13,5 | 30. 0,6; 20; 50; 7,07 |

§6

- | | |
|---|---|
| 1. $1; \frac{2}{3}; \frac{1}{6}; \frac{3}{4}$ | 2. $1; \frac{9}{2}; \frac{13}{2}; \frac{3}{4}$ |
| 3. $\frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{23}{240}; \frac{1}{24}$ | 4. $\frac{9}{7}; \frac{11}{63}; 0,33; \frac{81}{112}$ |
| 5. $0,5; 3; \frac{1}{3}; 0,25$ | 6. $\frac{1}{9}; 2; 0,5; \frac{1}{3}$ |
| 7. $0,25; \frac{4}{3}; \frac{2}{9}; 0,75$ | 8. $1; -1; \pi+1; \frac{2-\sqrt{3}}{2}$ |

9. $2; \frac{\pi + 6\sqrt{3} - 12}{6}; \frac{2}{3}\pi + 4\sqrt{3} - 5; 2\sin\frac{\pi}{8};$
10. $-1; \pi - \frac{1}{2}; 3\pi^2 - \frac{11}{4}; 1$ 11. $\frac{1}{3}; 0,5; 0,75; \frac{1}{3}$
12. $\frac{4}{3}; \frac{7}{9}; \frac{71}{216}; 1$ 13. $0,25; \frac{4}{3}; 2; 0,25$
14. $\frac{1}{4}; 3; \frac{1}{3}; \frac{3}{4}$ 15. $0,5; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi^2 - 4}{4}; 0,25$
16. $0,25; 2; \frac{4}{3}; 0,75$ 17. $0,25; 2; \frac{4}{3}; 0,5$
18. $1; \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{8} - 1; 1$ 19. $1; \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}; \frac{\pi^2 - 4\pi - 12}{16}; 1$
20. $-1; \frac{\pi - 1}{3}; \frac{\pi - 3}{9}; 1$ 21. $0,5; 0; \frac{4}{3}; 0,5$
22. $0,5; \frac{2}{3}; \frac{1}{27}; 1$ 23. $\frac{8}{17}; \frac{217}{51}; 1,5; 0,45$
24. $1; 1,2; 0,66$ 25. $\frac{3}{2}; -\frac{5}{12}; \frac{189}{576}; \frac{3}{4}$
26. $1; \frac{3}{4}; \frac{95}{32}; \frac{1}{8}$ 27. $2; \frac{\sqrt{2}}{3}; \frac{1}{36}; 1$
28. $1; \frac{43}{2}; \frac{1}{12}; \frac{1}{2}$ 29. $\frac{1}{7}; \frac{9}{16}; \frac{49}{768}; \frac{1}{7}$
30. $\frac{1}{4}; \frac{8}{5}; \frac{368}{25}; \frac{15}{16}$

**თავი VI. სავარჯიშოები მათემატიკურ
სტატისტიკაში.
დასკვნითი სტატისტიკა**

**§1. შემთხვევითი ამოკრეფა კოპულაციიდან.
ვარიაციული მწკრივი. ემპირიული განაწილების
კანონი. ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა და
პოლიგონი. ემპირიული განაწილების ფუნქცია.
ემპირიული საშუალო და დისპერსია.
ნდობის ინტერვალი**

1. მოცემულია შემდეგი ამონაკრეფი გენერალური ერთობლიობიდან:

5, 3, 7, 10, 5, 5, 2, 10, 7, 2, 7, 7, 4, 2, 4

ჩაწერეთ იგი ვარიაციული მწკრივის სახით, შეადგინეთ ემპირიული განაწილების კანონი. ააგეთ სიხშირეთა პოლიგონი და ემპირიული განაწილების ფუნქცია.

2. მოცემულია ξ შემთხვევით სიდიდეზე დაკვირვების შედეგები

-3; 5; 5; 4; 1; 2; -3; -2; 2; 2; -1; 5; 0; 0; 2

შეადგინეთ ვარიაციული მწკრივი, ემპირიული განაწილება, ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ააგეთ ფარდობით სიხშირეთა პოლიგონი.

3. ააგეთ ξ შემთხვევითი სიდიდის შემდეგი ემპირიული განაწილების ფარდობითი სიხშირეების ჰისტოგრამა, თუ ამოკრეფითი ერთობლიობის მოცულობა $n=100$.

ცხრილი 6.1.

ინტერვალის №	ინტერვალის საზღვრები (h=5)	ინტერვალში მოხვედრილი ξ -ს მნიშვნელობების სიხშირე
i	$x_i \sim x_{i+1}$	n_i
1	5-10	4
2	10-15	6
3	15-20	16
4	20-25	36
5	25-30	24
6	30-35	10
7	35-40	4

იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი.

4. მონახეთ ამოკრეფითი ერთობლიობის ისეთი მინიმალური მოცულობა, რომლისთვისაც 0,99-ის ტოლი საიმედოობის ალბათობით გენერალური ერთობლიობის a მათემატიკური ლოდინის ემპირიული საშუალო შეფასების სიზუსტე $\delta=0,33$, თუ ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობის დისპერსია ტოლია 1,44.

5. ააგეთ შემდეგი ემპირიული განაწილების ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა, თუ ამოკრეფითი ერთობლიობის მოცულობა $n=55$.

ცხრილი 6.2.

ინტერვალის №	ინტერვალის საზღვრები ($h=2$)	ინტერვალში მოხვედრილი ამოკრეფითი ერთობლიობის სიხშირე
i	$X_i \sim X_{i+1}$	n_i
1	10-12	2
2	12-14	4
3	14-16	8
4	16-18	12
5	18-20	16
6	20-22	10
7	22-24	3

იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი.

6. ააგეთ შემდეგი ემპირიული განაწილების ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა, თუ ამოკრეფითი ერთობლიობის მოცულობა $n=100$.

ცხრილი 6.3.

ინტერვალის №	ინტერვალის საზღვრები ($h=2$)	ინტერვალში მოხვედრილი ამოკრეფითი ერთობლიობის სიხშირე
i	$X_i \sim X_{i+1}$	n_i
1	0-2	20
2	2-4	30
3	4-6	50

იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი.

7. გაზომეს შემთხვევით არჩეული 100 სტუდენტის სიმაღლე, შედეგები წარმოდგენილია შემდეგი ცხრილით:

ცხრილი 6.7.

სიმაღლე (სმ-ში)	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182
აღნიშნული სიმაღლის სტუდენტთა რიცხვი	10	14	26	28	12	8	2

იპოვეთ გამოკვლეულ სტუდენტთა ემპირიული საშუალო და ემპირიული დისპერსია.

მითითება: X_i ვარიანტად ჩათვალეთ ინტერვალის შუა წერტილი.

8. წარმოებს რაღაც ფიზიკური სიდიდის ხუთი დამოუკიდებელი გაზომვა, გაზომვის შედეგები მოცემულია ცხრილით

ცხრილი 6.4.

გაზომვის ნომერი	1	2	3	4	5
გაზომვის შედეგი X_i	2781	2836	2807	2763	2858

იპოვეთ გაზომვის ცდომილობის ემპირიული დისპერსია, თუ გასაზომი სიდიდის ჭეშმარიტ მნიშვნელობად მიჩნეულია 2800.

9. გადაწერეთ ამოცანა 8-ის პირობები და იპოვეთ ემპირიული საშუალო, ემპირიული დისპერსია და შესწორებული ემპირიული დისპერსია, თუ გასაზომი სიდიდის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა ცნობილი არაა.

10. მოცემულია ξ შემთხვევით სიდიდეზე რვა დამოუკიდებელი დაკვირვების შედეგი 90, 0; 93,1; 95,0; 95,0; 96,0; 100,0; 101,0; 106,0. იპოვეთ ემპირიული საშუალო და ემპირიული დისპერსია.

11. იპოვეთ ამოკრეფითი ერთობლიობის ისეთი მინიმალური მოცულობა, რომლისთვისაც საიმედოობის 0,925-ის ტოლი ალბათობით გენერალური ერთობლიობის ამათემატიკური ლოდინის ემპირიული საშუალო შეფასების

სიზუსტე $\delta=0,2$, თუკი ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობის დისპერსია $\sigma^2=2,25$.

12. ფიზიკური სიდიდის ოთხჯერ გაზომვის შედეგად მიღებულია: 8, 9, 11, 12; ხელსაწყოს სისტემატური ცდომილობები არა აქვს. იპოვეთ გაზომვათა შედეგების ემპირიული საშუალო, ემპირიული დისპერსია და შესწორებული ემპირიული დისპერსია.

13. გენერალური ერთობლიობიდან $n=50$ -ის ტოლი მოცულობიანი შემდეგი ამოკრეფითი ერთობლიობის სიხშირეთა ემპირიული განაწილების მიხედვით იპოვეთ ემპირიული დისპერსია

ცხრილი 6.5.

x_i	18.4	18.9	19.3	19.6
n_i	5	10	20	5

14. გენერალური ერთობლიობიდან $n=100$ ტოლი მოცულობიანი შემდეგი ამოკრეფითი ერთობლიობის სიხშირეთა განაწილების მიხედვით იპოვეთ ემპირიული დისპერსია.

ცხრილი 6.6.

x_i	2502	2804	2903	3028
n_i	8	30	60	2

15. რაიმე ფიზიკური სიდიდის ერთიდაიგივე ხელსაწყოთი ხუთჯერ გაზომვის შედეგად (სისტემატური შეცდომები გამორიცხებულია) მიიღეს (მმ-ში) 92; 94; 103; 105; 106. დაწერეთ ემპირიული განაწილების კანონი, გამოთვალეთ ემპირიული საშუალო და შესწორებული ემპირიული დისპერსია.

16. იპოვეთ ნორმალური კანონით განაწილებული ξ გენერალური ერთობლიობის უცნობი a მათემატიკური ლოდინის ემპირიული საშუალოთი შეფასების ნდობის ინტერვალი $P=0,99$ საიმედობის ალბათობით, თუ გენერალური ერთობლიობის დისპერსია $\sigma^2=16$ ამოკრეფითი საშუალო $\bar{x}=10,2$ და ამოკრეფის მოცულობა $n=16$.

17. იპოვეთ ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობის ნდობის უცნობი a მათემატიკური ლოდინის ემპირიული საშუალოთი შეფასების ნდობის ინტერვალი $P=0,99$ - საიმედობის აღბათობით, თუ მოცემულია გენერალური ერთობლიობის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=5$, ემპირიული საშუალო $\bar{x}=16,8$ და ამოკრეფითი ერთობლიობის მოცულობა $n=25$.

18. დიდ რაოდენობიანი ნათურების პარტიიდან წარმოებს $n=100$ ნათურიანი ამოკრეფა გადაწვამდე ნათების ხანგრძლივობის დროის დასადგენად. ეს დრო შემთხვევითი სიდიდეა და განაწილებულია ნორმალური განაწილების კანონით, რომლის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=40$ სთ, ემპირიული საშუალო, ანუ ნათურის გადაწვამდე ნათების საშუალო დრო $\bar{X}=1000$ სთ. იპოვეთ გენერალური ერთობლიობის მათემატიკური ლოდინისათვის (გადაწვამდე ნათების საშუალო დროისათვის) ნდობის ინტერვალი საიმედობის $P=0,95$ -ის ტოლი აღბათობით.

19. ავტომატი ამზადებს ლილვაკებს. ლილვაკის დიამეტრის ზომა შემთხვევითი სიდიდეა და იგი განაწილებულია ნორმალური განაწილების კანონით, რომლის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=2$ მმ-ს. $n=100$ მოცულობიანი ამოკრეფითი ერთობლიობის მიხედვით გამოთვალეს ლილვაკის დიამეტრის ამოკრეფითი საშუალო მნიშვნელობა \bar{X} . იპოვეთ $P=0,95$ -ის ტოლი საიმედობის აღბათობით იმ შეფასების δ სიზუსტე, რომლითაც ამოკრეფითი საშუალო აფასებს დამზადებული ლილვაკების დიამეტრების a მათემატიკურ ლოდინს.

20. ლილვაკების პარტიიდან წარმოებს $n=100$ მოცულობიანი ამოკრეფა დიამეტრის გაზომვის მიზნით. ემპირიული მონაცემებით დიამეტრის საშუალო ზომა $\bar{x}=15$ მმ-ს. ლილვაკის დიამეტრის ზომა არის ნორმალური კანონით განაწილებული შემთხვევითი სიდიდე, რომლის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=2$ მმ, ხოლო მათემატიკური

ლოდინი a უცნობია. იპოვეთ ნდობის ინტერვალი a პარამეტრისათვის საიმედობის $P=0,95$ ალბათობით.

21. ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობიდან წარმოებს $n=12$ მოცულობითი ამოკრეფა, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი ემპირიული განაწილების კანონით

ცხრილი 6.7.

x_i	-0.5	0.4	-0.2	0	0.2	0.6	0.8	1	1.2	1.5
n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1

საიმედობის 0,95-ის ტოლი ალბათობით ააგეთ ნდობის ინტერვალი გენერალური ერთობლიობის უცნობი a მათემატიკური ლოდინისათვის.

22. წარმოებს 9 დამოუკიდებელი დაკვირვება ნორმალური კანონით განაწილებული შემთხვევით სიდიდეზე. ესპირიული საშუალო $\bar{X} = 30,1$ და შესწორებული ემპირიული დისპერსია $S^2 = 36$. საიმედობის $P=0,99$ ალბათობით ააგეთ ნდობის ინტერვალი ξ შემთხვევითი სიდიდის a მათემატიკური ლოდინისათვის.

23. ნორმალური კანონით განაწილებული ფიზიკური სიდიდის 16-ჯერ დამოუკიდებელი გაზომვის შედეგად გამოთვლილია განაზომთა ემპირიული საშუალო $\bar{x} = 42,8$ და შესწორებული ემპირიული დისპერსია $\frac{n}{n-1} S^2 = 64$. $P=0,999$ -ის ტოლი ალბათობით შეაფასეთ გასაზომი ფიზიკური სიდიდის ჭეშმარიტი a მნიშვნელობა (ანუ ააგეთ ნდობის ინტერვალი გენერალური ერთობლიობის a მათემატიკური ლოდინისათვის).

24. ააგეთ სიხშირეთა ჰისტოგრამა და ემპირიული განაწილების ფუნქციის გრაფიკი, თუ მოცემულია გენერალური ერთობლიობიდან $n=100$ მოცულობითი ამოკრეფის შემდეგი ემპირიული განაწილება.

ცხრილი 6.8.

ინტერვალის №	ინტერვალის საზღვრები	ინტერვალში მოხვედრილი ამოკრეფითი ერთობლიობის სიხშირე
i	$x_i \sim x_{i+1}$	n_i
1	1-5	10
2	5-9	20
3	9-13	40
4	13-17	12
5	17-21	10
6	21-25	8

25. ააგეთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი და ემპირიული განაწილების ფუნქციის გრაფიკი შემდეგი ემპირიული განაწილებისათვის:

ცხრილი 6.9.

x_i	4	7	9	12
n_i	6	5	11	18

26. ξ შემთხვევით სიდიდეზე დამოუკიდებელი დაკვირვების შედეგებია: -0,1; 0; -0,1; 2; 0,5; -1; 0; 1,5; 2; 2. შეადგინეთ ვარიაციული მწკრივი, ემპირიული განაწილების კანონი, იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია, ააგეთ სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი და ემპირიული განაწილების ფუნქციის გრაფიკი.

27. გამოთვალეთ ემპირიული დისპერსია და შესწორებული ემპირიული დისპერსია თუ მოცემულია გენერალური ერთობლიობიდან $n=10$ მოცულობიანი ამონაკრეფის ემპირიული განაწილება.

ცხრილი 6.10.

x_i	0.01	0.05	0.09
n_i	2	3	5

28. მოცემულია ξ შემთხვევით სიდიდეზე დაკვირვების შედეგები: 1,2,-1,-1,1,2,0,0,-2,3,-1,1,3,-3,2. ჩაწერეთ იგი ვარიაციული მწკრივის სახით. შეადგინეთ ემპირიული განაწილების კანონი. იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია.

29. მოცემულია ξ შემთხვევითი სიდიდებზე დაკვირვების შედეგები: 5,6,5,6,4,5,4,4,4,3. ჩაწერეთ იგი ვარიაციული მწკრივის სახით, შეადგინეთ ემპირიული განაწილების კანონი, ააგეთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი.

30. მოცემულია ემპირიული განაწილების კანონი
ცხრილი 6.11

x_i	0	1	3	5
n_i	3	5	5	2

იპოვეთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი. ააგეთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი.

§2. მეთოდური მითითებები

1. ჯგუფში 25 სტუდენტია. ჟურნალიდან სიის მიხედვით ამოწერეს მოცემული სემესტრის განმავლობაში თითოეული სტუდენტის მიერ უმაღლეს მათემატიკაში გაცდენილ მეცადინეობათა რაოდენობა შემდეგი სახით:

2; 5; 0; 1; 6; 3; 0; 1; 5; 4; 0; 3; 3; 2; 1; 4; 0; 0; 2; 3; 6; 0; 3; 0; 1

ა) შეადგინეთ შესაბამისი შემთხვევითი სიდიდის ემპირიული (სტატისტიკური) განაწილება.

ბ) ავაგოთ ფარდობით სიხშირეთა განაწილების პოლიგონი.

გ) დავეოთ $[0,6]$ შუალედი ხუთ ტოლ ნაწილად, შევადგინოთ ემპირიული განაწილება და ავაგოთ ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამა.

დ) ვიპოვოთ გენერალური ერთობლიობის მათემატიკური ღოდინისა და დისპერსიის გადაუადგილებადი და ძალდებული წერტილოვანი ემპირიული შეფასებები.

ე) ვიპოვოთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია და ავაგოთ მისი გრაფიკი.

ამოხსნა: სტუდენტის მიერ გაცდენილ მეცადინეობათა რაოდენობა შემთხვევითი სიდიდეა, აღვნიშნოთ იგი ξ -თი.


ა) ამოკრეფის მოცულობა $n=25$ ამოცანის მონაცემების მიხედვით ამოვწერთ შემდეგ ვარიაციულ მწკრივს 0,1,2,3,4,5,6, შესაბამისი სიხშირეებით 7,4,3,5,2,2,2. ემპირიულ (სტატისტიკურ) განაწილებას ექნება სახე:

ცხრილი 6.12.

x_i	0	1	2	3	4	5	6
$y_i = \frac{n_i}{n}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{2}{25}$

ბ) ფარდობით სიხშირეთა პოლიგონის ასაგებად ξ_0 საკოორდინატო სიბრტყეზე ავიღოთ $(0; \frac{7}{25})$, $(1; \frac{4}{25})$, $(2; \frac{3}{25})$, $(3; \frac{1}{5})$, $(4; \frac{2}{25})$, $(5; \frac{2}{25})$, $(6; \frac{2}{25})$

წერტილები და შევაერთოთ წრფის მონაკვეთებით (იხ.ნახ.3)




ნახ. 6.1.

გ) რადგან $h = \frac{|6-0|}{5} = 1,2$, ამიტომ მივიღებთ შემდეგ ემპირიულ განაწილებას

ცხრილი 6.13.

ინტერვალები I	$[0;1,2[$	$[1,2;2,4[$	$[2,4;3,6[$	$[3,6;4,8[$	$[4,8;6[$
შესაბამისი ფარდობითი სიხშირეები $\frac{m_i}{n}$	$\frac{11}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{4}{25}$
$\frac{m_i}{nh}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{3}{30} = \frac{1}{10}$	$\frac{5}{30} = \frac{1}{6}$	$\frac{2}{30} = \frac{1}{15}$	$\frac{4}{30} = \frac{2}{15}$

ფარდობით სიხშირეთა ჰისტოგრამას ექნება სახე (იხ. ნახ. 6.2).



ნახ.6.2.

დ) როგორც ცნობილია გენერალური ერთობლიობის მათემატიკური ლოდინის გადაუადგილებლად და ძალდებულ შეფასებას წარმოადგენს ემპირიული საშუალო \bar{X} , რომელიც გამოითვლება ფორმულით:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^K x_i n_i$$

სადაც $\sum_{i=1}^K n_i = n = 25$, $k=7$ მივიღებთ, რომ

$$\bar{X} = 0 \cdot \frac{7}{25} + 1 \cdot \frac{4}{25} + 2 \cdot \frac{3}{25} + \frac{3 \cdot 5}{25} + 4 \cdot \frac{2}{25} + 5 \cdot \frac{2}{25} + 6 \cdot \frac{2}{25} = 2.2$$

ემპირიული დისპერსიის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ ფორმულით:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^K (x_i - \bar{X}) n_i$$

ჩვენ შემთხვევაში გვექნება:

$$S^2 = \frac{1}{25} (0 - 2.2)^2 \cdot 7 + (1 - 2.2)^2 \cdot 4 + (2 - 2.2)^2 \cdot 3 + (3 - 2.2)^2 \cdot 5 + (4 - 2.2)^2 \cdot 2 + (5 - 2.2)^2 \cdot 2 + (6 - 2.2)^2 \cdot 2 = 3.76$$

მაგრამ გენერალური ერთობლიობის დისპერსიის გადაუადგილებლად და ძალდებულ შეფასებას წარმოადგენს არა ემპირიული დისპერსია, არამედ შესწორებული ემპირიული დისპერსია.

$$S^2 = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{25}{24} \cdot 3.76 \approx 3.918$$


ე) აღვნიშნოთ ემპირიული განაწილების ფუნქცია $F_n(x)$ -ით. ვისარგებლოთ ფორმულით:

$$\hat{F}_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x < x_1 \\ \frac{m}{n}, & \text{როცა } x_m \leq x \leq x_{m+1} \\ 1, & \text{როცა } x > x_n, m = \overline{1, k-1} \end{cases}$$

რადგან ჩვენ შემთხვევაში ამოკრეფის მოცულობა $n=25$ $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=3$, $x_4=4$, $x_5=5$, $x_7=6$, ამიტომ ემპირიული განაწილების მიხედვით მივიღებთ:

$$\hat{F}_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{როცა } x \leq 0 \\ \frac{7}{25}, & \text{როცა } 1 < x \leq 1 \\ \frac{11}{25}, & \text{როცა } 1 < x \leq 2 \\ \frac{14}{25}, & \text{როცა } 2 < x \leq 3 \\ \frac{19}{25}, & \text{როცა } 3 < x \leq 4 \\ \frac{21}{25}, & \text{როცა } 4 < x \leq 5 \\ \frac{23}{25}, & \text{როცა } 5 < x \leq 6 \\ 1, & \text{როცა } x > 6 \end{cases}$$

ამ ფუნქციის გრაფიკს ექნება შემდეგი სახე (იხ. ნახ. 6.3.)



ნახ.6.3

2. გენერალური ერთობლიობა განისაზღვრება ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდით, რომლის მათემატიკური ლოდინი a უცნობია, ხოლო საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=5$. გვაქვს $n=25$ -ის ტოლი მოცულობიანი ამოკრეფა ξ გენერალური ერთობლიობიდან. ემპირიული საშუალო $\bar{X}=14$. ვიპოვოთ 95%-იანი, ანუ $P=0,95$ საიმედობის ალბათობის შესაბამისი ნდობის ინტერვალის გენერალური ერთობლიობის უცნობი მათემატიკური ლოდინისათვის.

ამოხსნა: ცნობილი σ^2 დისპერსიის მქონე, ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის a მათემატიკური ლოდინისათვის ნდობის ინტერვალს აქვს სახე:

$$\bar{X} - U_p \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + U_p \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ვისარგებლოთ ცხრილი V-ით (იხ.დამატება), მოცემული $P=0,95$ -თვის ვპოულობთ $U_p=1,96$, ამიტომ მივიღებთ:

$$14 - 1.96 \frac{5}{\sqrt{25}} < a < 14 + 1.96 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}}$$

ამრიგად, უცნობი a მათემატიკური ლოდინისათვის ნდობის ინტერვალი საიმედობის $P=0,95$ -ის ტოლი ალბათობით იქნება

$$12,4 < a < 15,96$$

3. წარმოებს n მოცულობიანი ამოკრეფა ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობიდან, რომლის საშუალო კვადრატული გადახრა $\sigma=1,2$. ემპირიული საშუალოს გამოყენებით საიმედობის $=0,98$ ალბათობით აგებულია ნდობის ინტერვალი გენერალური ერთობლიობის უცნობი a მათემატიკური ლოდინისათვის. ვიპოვოთ ამონაკრეფის მინიმალური მოცულობა, თუ შეფასების სიზუსტე $=0,3$.

ამოხსნა: ნდობის ინტერვალის ჩანაწერში სიზუსტე

$\delta = U_p \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, საიდანაც ვპოულობთ, რომ $n = \frac{U_p^2 \sigma^2}{\delta^2}$, ცხრილი V-ის მიხედვით (იხ. დამატება) საიმედობის მოცემული $P=0,98$ ალბათობის მიხედვით ვიპოვოთ $U_p=2,326$. ჩვენ შემთხვევაში $\sigma=1,2$; $\delta=0,3$, ამიტომ საბოლოოდ მივიღებთ

$$n = \left(\frac{2.326 \cdot 1.2}{0.3} \right)^2 = 87$$

4. მოცემულია $n=10$ მოცულობიანი შემდეგი ამონაკრები ნორმალური კანონით განაწილებული გენერალური ერთობლიობიდან

1; -1; -2; 3; 4; 2; 5; 3; 2; 4

ვიპოვოთ $P=0,95$ საიმედობის ტოლი ალბათობის შესაბამისი ნდობის ინტერვალი გენერალური ერთობლიობის მათემატიკური ლოდინისათვის.

ამოხსნა: ამოკრეფითი ერთობლიობა დავაღაგოთ ვარიაციული მწკრივის სახით შესაბამისი სიხშირეებით და ფარდობითი სიხშირეებით. მივიღებთ ემპირიული განაწილების კანონს.

ცხრილი 6.14.

ვარიანტი x_i	-2	1	2	3	4	5
სიხშირე n_i	2	1	2	2	2	1
ფარდობითი სიხშირე n_i/n	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$

$$i = \overline{1,6}$$

$$n=10$$

$$\sum_{i=1}^6 \frac{n_i}{n} = \frac{4}{5} + \frac{2}{10} = 1$$

გამოთვლით ემპირიული საშუალო ფორმულით

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i$$

მივიღებთ

$$\bar{X} = \frac{1}{10} ((-2) \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1) = 2$$

ემპირიული დისპერსიის გამოსათვლელად ვისარგებლოთ ფორმულით

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{X})^2 n_i,$$

რის შედეგადაც მივიღებთ:

$$S^2 = \frac{1}{10} [(-2-2)^2 + (1-2)^2 \cdot 1 + (2-2)^2 \cdot 2 + (3-2)^2 \cdot 2 + (4-2)^2 \cdot 2 + (5-2)^2 \cdot 1] = 5.184$$

$$S \approx 2.28.$$

როგორც ცნობილია უცნობი 2 დისპერსიის მქონე, ნორმალურად განაწილებული შემთხვევითი სიდიდის ა მათემატიკური ლოდინისათვის ნდობის ინტერვალს აქვს სახე

$$\bar{X} - t_p \frac{S}{\sqrt{n-1}} < a < \bar{X} + t_p \frac{S}{\sqrt{n-1}}$$

რადგან საიმედოობის ალბათობა $P=0,95$, ცხრილი VI-ის დახმარებით (იხ. დამატება) $n-1=9$ მნიშვნელობისათვის ვიპოვოთ $t_p=2,262$, ამიტომ საძიებელი ნდობის ინტერვალს ექნება სახე:

$$2 - 2.262 \cdot \frac{2.28}{3} < a < 2 + 2.262 \cdot \frac{2.28}{3}$$

ანუ

$$0,28 < a < 3,71$$

პანშენი:

§8

4. $n=86$; 7. 166; 8. 1287,8; 9. 2809; 1206,8; 1508,5;
10. 97,0; 24,8; 11. 178; 12. 10; 2,5; 3,3; 13. 0,5916; 14. 12603;
15. 100; 42,5; 16. $7,63 < a < 12,77$; 17. $14,23 < a < 19,37$; 18. $992,16 < a < 1007,84$;
19. 0,392მმ; 20. $14,608მმ < a < 15,392მმ$; 21. $-0,04 < a < 0,88$; 22. $23,38 < a < 36,82$;
23. $34,66 < a < 50,94$; 27. 0,00765; 0,0085.

დანართი 1

ცხრილი I

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

ფუნქციის მნიშვნელობათა ცხრილი

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.3989	8989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0.1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0.2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0.3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3797
0.4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0.5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0.6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0.7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0.8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0.9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1.0	0.2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1.1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1.2	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1.4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1.5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1.6	1109	109	1074	1057	1040	1023	0006	0989	0973	0957
1.7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1.8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1.9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2.0	0.0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2.1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2.2	0355	0347	0334	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2.3	0289	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2.4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2.5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2.6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2.7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2.8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2.9	0060	0058	0056	0058	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3.0	0.0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3.1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3.2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3.3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3.4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3.5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3.6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3.7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3.8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3.9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad \text{ფუნქციის მნიშვნელობათა ცხრილი}$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.00000	00899	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0.1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0.2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0.3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	44058	14431	14803	15173
0.4	15542	15910	16276	16640	17003	17363	17724	18082	18439	18793
0.5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0.6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0.7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0.8	28814	29103	29389	29673	29955	20234	30511	30785	31057	31327
0.9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1.0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35542	35769	35993	36214
1.1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1.2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1.3	40320	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1.4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1.5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1.6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1.7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1.8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1.9	47126	47193	47256	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2.0	47725	47778	47831	47682	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2.1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2.2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2.3	48928	48956	48683	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2.4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2.5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2.6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2.7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49721	49728	49736
2.8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2.9	49813	49819	49825	4831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
3.0	0.49865		3.1	49903	3.2	49931	3.3	49952	3.4	49965
3.5	49977		3.6	49984	3.7	49993	3.8	49993	3.9	49995
4.0	499968									
4.5	499997									
5.0	49999997									

$$\frac{\lambda^k}{K!} e^{-\lambda} \text{ ფუნქციის მნიშვნელობები}$$

(პუასონის განაწილება)

$\lambda \backslash K$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
0	0.90484	0.81873	0.74082	0.67032	0.60653
1	0.09048	0.16375	0.22225	0.26813	0.30327
2	0.00452	0.01638	0.03334	0.05363	0.07582
3	0.00015	0.00109	0.00333	0.00715	0.01264
4		0.00006	0.00025	0.00072	0.00158
5			0.00002	0.00006	0.00016
6					0.00001
$\lambda \backslash K$	0.6	0.7	0.8	0.9	
0	0.54881	0.49659	0.44933	0.40657	
1	0.32929	0.34761	0.35946	0.36591	
2	0.09879	0.12166	0.14379	0.16466	
3	0.01976	0.02839	0.03834	0.04940	
4	0.00296	0.00497	0.00767	0.01112	
5	0.00036	0.00070	0.00123	0.00200	
6	0.00004	0.00006	0.00016	0.00030	
7		0.00001	0.00002	0.00004	
$\lambda \backslash K$	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
0	0.36788	0.12534	0.04879	0.01832	0.00674
1	0.36788	0.27067	0.14936	0.07326	0.03369
2	0.18994	0.27067	0.22404	0.14653	0.08422
3	0.06131	0.18045	0.22404	0.19537	0.19537
4	0.01533	0.09022	0.16803	0.12537	0.17547
5	0.000307	0.03609	0.10082	0.15629	0.17547
6	0.00051	0.01203	0.05041	0.10419	0.14622
7	0.00007	0.00344	0.02160	0.05954	0.10445
8	0.00001	0.00086	0.00810	0.02977	0.06528
9		0.00019	0.00270	0.01323	0.03627
10		0.00004	0.00081	0.00529	0.01813
11		0.00001	0.00022	0.00193	0.00824
12			0.00006	0.00064	0.00343
13			0.00001	0.00020	0.00132
14				0.00006	0.00047
15				0.00002	0.00016
16					0.00005
17					0.00001

$$\sum_{k=0}^m \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

ფუნქციის მნიშვნელობათა ცხრილი

ცხრილი IV

$\lambda \backslash m$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0	0.904837	0.818731	0.730818	0.670320	0.606531	0.548812
1	0.995321	0.982477	0.963063	0.938448	0.909796	0.878099
2	0.999845	0.998852	0.996400	0.992074	0.985612	0.976885
3	0.999996	0.999943	0.999734	0.999224	0.998248	0.996642
4	1.000000	0.999998	0.999984	0.999939	0.999825	0.999606
5	1.000000	1.000000	0.999996	0.999996	0.999986	0.999962
6	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.999999	0.999997
7	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
$\lambda \backslash m$	0.7	0.9	0.9	1.0	2.0	3.0
0	0.496585	0.449329	0.406570	0.357879	0.135335	0.049787
1	0.844195	0.808792	0.772483	0.735759	0.406006	0.199148
2	0.965858	0.952577	0.937144	0.919699	0.676677	0.423190
3	0.994246	0.990920	0.986542	0.981012	0.857124	0.647232
4	0.999214	0.998589	0.997657	0.996340	0.947348	0.815263
5	0.999909	0.999816	0.999658	0.999406	0.983437	0.916082
6	0.999990	0.999980	0.999958	0.999917	0.995467	0.966491
7	0.999998	0.999999	0.999997	0.999990	0.998904	0.988095
8	1.000000	1.000000	1.000000	0.999999	0.999763	0.996196
9				1.000000	0.999954	0.998997
10					0.999992	0.999707
11					0.999999	0.999928
12					1.000000	0.999983
13						0.999996
14						0.999999
15						1.000000
$\lambda \backslash m$	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
0	0.018316	0.006738	0.002479	0.000912	0.000335	0.000123
1	0.091579	0.040428	0.017352	0.007295	0.004019	0.001234
2	0.238105	0.124652	0.061970	0.29636	0.013754	0.006232
3	0.466472	0.265026	0.151205	0.081765	0.042380	0.021228
4	0.628839	0.440493	0.285058	0.172991	0.099632	0.054963
5	0.785132	0.613960	0.445681	0.300708	0.191236	0.115690
6	0.889326	0.762183	0.606304	0.449711	0.313374	0.206780
7	0.948866	0.866628	0.743981	0.598714	0.452961	0.323896
8	0.978636	0.931806	0.847239	0.729091	0.592548	0.455652
9	0.991867	0.968172	0.916077	0.830496	0.716625	0.587840
10	0.997159	0.986305	0.957380	0.901479	0.815887	0.705988
11	0.999084	0.994547	0.979909	0.946660	0.888077	0.803003
12	0.999726	0.997081	0.991173	0.973000	0.936206	0.875773
13	0.999923	0.999202	0.996372	0.987188	0.965820	0.925149
14	0.999979	0.999774	0.998600	0.994282	0.982744	0.958533
15	0.999994	0.999931	0.999491	0.997593	0.991770	0.977964

16	0.999998s	0.999980	0.999825	0.999041	0.906283	0.988894
k \ a	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
17	0.999999	0.999994	0.999943	0.999637	0.998407	0.994680
18	0.999999	0.999998	0.999982	0.999869	0.999351	0.997573
19	0.999999	0.999999	0.999994	0.999955	0.999748	0.998943
20	1.000000	0.999999	0.999998	0.999985	0.999907	0.999560
21		1.000000	0.999999	0.999995	0.999967	0.999824
22			0.999999	0.999998	0.999989	0.999932
23			1.000000	0.999999	0.999997	0.999974
24				0.999999	0.999999	0.999990
25				1.000000	0.999999	0.999996
26					1.000000	0.999998
27						0.999999
28						1.000000

U_p-ის მნიშვნელობაში 2Φ(U_p)=p

ცხრილი V

ρ	0.9	0.95	0.98	0.99	0.998
U _p	1.645	1.960	2.326	2.576	3.09

ცხრილი VI

t_p-ის მნიშვნელობები. $2 \int_0^{t_p} f_{n-1}(x) dx = P$, სადაც f_{n-1}(x) არის სტუდენტის განაწილი

ლების სიმკვრივე თავისუფლების ხარისხით

n-1 \ ρ	0.9	0.98	0.98	0.99
5	2.085	2.576	3.365	4.032
6	3.943	2.447	3.143	3.707
7	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.812	2.228	2.764	3.169
12	3.782	2.179	2.681	3.055
14	1.761	2.145	2.624	2.977
16	1.746	2.120	2.583	2.921
18	7.734	2.101	2.552	2.878
20	1.725	2.086	2.528	2.845
22	1.717	2.074	2.508	2.819
30	1.697	2.042	2.457	2.750
	1.645	1.960	2.326	2.576

ცხრილი VII

χ^2_{α} -ის მნიშვნელობები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას, $\int_{N_{\alpha}^2}^{+\infty} f_{\nu}(x)dx = \alpha$ სა-

დაც $f_{\nu}(x)$ არის ხო-კვადრატ განაწილების სიმკვრივე თავისუფლების

ხარისხით ν

	0.99	0.98	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50
1	0.000	0.001	0.04	0.016	0.064	0.148	0.455
2	0.020	0.040	0.103	0.211	0.446	0.713	1.386
3	0.115	0.185	0.352	0.584	1.005	1.424	2.37
4	0.297	0.429	0.711	1.064	1.649	2.20	3.36
5	0.554	0.752	1.145	1.610	2.34	3.00	4.35
6	0.872	1.134	1.635	2.20	3.07	3.63	5.35
7	1.239	1.564	2.17	2.83	3.82	4.67	6.35
8	1.646	2.03	2.73	3.49	4.69	5.53	7.34
9	2.09	2.53	3.32	4.17	5.38	6.39	8.34
10	2.56	3.06	3.94	4.86	6.18	7.27	9.34
11	3.05	3.61	4.58	5.58	6.99	8.15	10.34
12	3.57	4.18	5.23	6.30	7.81	9.03	11.34
13	4.11	4.76	5.89	7.04	8.63	9.93	12.34
14	4.66	5.37	6.57	7.79	9.47	10.82	13.34
15	5.23	5.98	7.26	8.55	10.31	11.72	14.34
16	5.81	6.61	7.86	9.31	11.15	12.62	15.34
17	6.41	7.26	8.67	10.08	12.00	13.53	16.34
18	7.02	7.91	9.39	10.86	12.86	14.44	17.34
19	7.63	8.57	10.11	11.65	13.72	15.35	18.34
20	8.26	9.24	10.85	12.44	14.58	16.27	19.34
21	8.90	9.92	11.59	13.24	15.44	17.18	20.3
22	9.54	10.60	12.34	14.04	16.31	18.10	21.3
23	10.20	11.29	13.09	14.85	17.19	19.02	22.3
24	10.86	11.90	13.85	15.66	18.06	19.94	23.3
25	11.52	12.70	14.61	16.47	18.94	20.9	24.3
26	12.20	13.41	15.38	17.29	19.82	21.8	25.3
27	12.88	14.12	16.15	18.11	20.7	22.7	26.3
28	13.56	14.085	16.93	18.94	21.6	23.6	27.3
29	14.26	15.57	17.71	19.77	22.5	24.6	28.3
30	14.95	16.31	18.49	20.6	23.4	25.5	29.3

გაგრძელება ცხრილი VII

	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	1.074	1.642	2.71	3.84	5.47	6.64	10.83
2	2.41	0.22	4.60	5.99	7.82	9.21	13.82
3	3.66	4.64	6.25	7.82	9.84	11.34	16.27
4	4.88	5.99	7.78	9.49	11.67	13.28	18.46
5	6.06	7.29	9.24	11.07	13.39	15.09	20.5
6	7.23	8.56	10.64	12.59	15.03	16.81	22.5
7	8.38	9.80	12.02	14.07	16.62	18.48	24.3
8	9.52	11.03	13.36	15.51	18.17	20.1	26.1
9	10.66	12.24	14.68	19.92	19.68	21.7	27.9
10	11.78	13.44	15.99	18.31	21.2	23.2	29.6
11	12.90	14.63	17.28	19.68	22.6	24.7	31.3
12	14.01	15.81	18.55	21.0	24.1	26.2	32.9
13	15.12	16.98	19.81	22.4	25.5	27.7	34.6
14	16.22	18.15	21.1	23.7	26.9	29.1	36.1
15	17.32	19.31	22.3	25.0	28.3	30.6	37.7
16	18.42	20.5	23.5	26.3	29.6	32.0	39.3
17	19.51	21.6	24.8	27.6	31.0	33.4	40.8
18	20.06	28.6	26.0	28.9	32.3	34.8	42.3
19	21.7	23.9	27.2	30.1	33.7	36.2	43.8
20	22.8	25.0	28.4	31.4	35.0	37.6	45.8
21	23.9	26.2	29.6	32.7	36.3	38.9	46.8
22	24.9	27.3	38.0	33.9	37.7	40.3	48.3
23	26.0	28.4	32.0	35.2	39.0	41.6	49.7
24	27.1	29.6	33.2	36.4	40.3	43.0	51.2
25	28.2	30.7	34.4	37.7	41.7	44.3	52.6
26	29.2	31.8	35.6	38.9	42.9	45.6	54.1
27	30.3	32.9	36.7	40.1	44.1	47.1	55.5
28	31.4	34.0	37.9	41.3	45.4	48.3	56.9
29	32.5	35.1	39.1	42.6	46.7	49.6	58.3
30	33.5	36.2	40.3	43.8	48.0	50.9	59.7

დანართი II.

განათლების მიღებისათვის მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯების კითხვარი

განათლების მიღებისათვის მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯების გამოკვლევა

სააღწერო უბანი----- ინტერვიუერი -----
(გვარი, სახელი) (ხელმოწერა)
(თარიღი)

ინტერვიუერის შენიშვნები და კომენტარები -----

ზედამხედველი -----
(გვარი, სახელი) (ხელმოწერა) (შემოწმების
თარიღი)

ზედამხედველის შენიშვნები და კომენტარები -----

კორექტორის შენიშვნები და კომენტარები -----

წინამდებარე კითხვარის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის მიერ განათლების (შესაბამისი ცენზის, დიპლომის) მიღებისათვის და სასწავლო ნივთების შესაძენად გაწეული ხარჯების გამოკვლევა.

თქვენი პასუხები გამოყენებული იქნება მხოლოდ განზოგადებული სტატისტიკური შეფასებების მისაღებად.

ინტერვიუერს: გთხოვთ, გამოკითხოთ ოჯახის უფროსი ან ის პირი, რომელიც ოჯახის უფროსთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებებს და ინფორმირებულია შინამეურნეობის როგორც ეკონომიკურ, ასევე ოჯახის წევრთა განათლებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ.

რესპონდენტს პირველ რიგში გააცანით შესავალი და ზოგადად აუხსენით გამოკვლევის მიზნები, შემდეგ კი - ჩვენი კითხვარის ზოგადი სტრუქტურა მისი ძირითადი ნაწილების მიხედვით:

1. სკოლამდელი აღზრდა-განათლების ხარჯები;

2. ღაწყებით, არასრულ საშუალო, საშუალო სკოლაში, ბიმნაზიაში ან სკოლა-ლიცეუმში სწავლის ხარჯები;
3. მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელთა სწავლის ხარჯები;
4. კოლეჯში, ტექნიკუმში, სპეციალურ სასწავლებლებში სწავლის ხარჯები;
5. კერძო მასწავლებელთან, რეპეტიტორთან მომზადების ხარჯები;
6. უმაღლესი განათლების ხარჯები;
7. კვალიფიკაციის კურსების ხარჯები;
8. საზღვარგარეთ განათლების ხარჯები;

ზოგადი მონაცემები

ინტერვიუშეს: მომდევნო ცხრილის 1-ლ სვეტში შეიტანეთ ოჯახის ყველა წევრის სახელი და სხვა მონაცემები.

მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში ოჯახის თითოეული წევრის შესახებ ცხრილის ბოლოში მოცემული კოდების გამოყენებით შეიტანეთ მონაცემები იღებდა თუ არა იგი განათლებას რაიმე ფორმით 2000 წელს.

მაგალითად, თუ ოჯახის წევრი გამოკითხვის მომენტში არის უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი, საშუალო სკოლა დაამთავრა წელს და დამატებით ემზადებოდა მასწავლებელთან, მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტებში უნდა ჩაუწეროთ კოდები: 2, 5, 6. ხოლო მას, ვინც 2000 წელს პირველი იანვრიდან კლდეში დასახელებული არც ერთი ფორმით განათლებას არ იღებდა, მე-4 სვეტში ჩაუწერეთ კოდი 9.

	სახელი	სქესი: 1 = მდედრობითი 2 = მამრობითი	ასაკი=შესრულებული წლები	იღებდა თუ არა 2000 წელს რაიმე ფორმით განათლებას? (იხ. კოდები)		
				4	5	6
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

განათლების მიღების ფორმების კოდები

- | | |
|---|--|
| 1. სკოლამდელი აღზრდა საბავშვო ბაღში (ბაგაში) ან დაქირავებულ აღზრდელთან; | 6. უმაღლეს სასწავლებელში ან ასპირანტურაში; |
| 2. დაწყებით, არასრული საშუალო, საშუალო სკოლაში, გიმნაზიაში ან სკოლა-ლიცეუმში; | 7. კვალიფიკაციის კურსებზე; |
| 3. უმაღლესი სასწავლებლის მოსამზადებელ განყოფილებაში; | 8. საზღვარგარეთ განათლება; |
| 4. კოლეჯში, ტექნიკუმში, სპეციალურ სასწავლებელში; | 9. სხვა
(ჩაწერეთ)----- |
| 5. კერძო მასწავლებელთან, რეპეტიტორთან; | 10. არა |

ინტერვიუს: ახლა უნდა გამოიკითხოთ ოჯახის წევრების ხარჯები მათ შორის პირველი კითხვის პასუხებში მითითებული განათლების ყველა ფორმის მიხედვით. მომდევნო 1-8 ნაწილების ცხრილებში უნდა იქნას შეტანილი მონაცემები წინა ცხრილის, მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტების პასუხების მიხედვით.

ხარჯების ყველა მაჩვენებელი, გარდა მე-8 ნაწილისა, უნდა შეიტანოთ ლარებში. იმ შემთხვევაში, თუ რესპონდენტმა თანხა დაასახელა სხვა ვალუტაში, უნდა გადაიყვანოთ იგი ლარებში.

ნაწილი 1. ბავშვების სკოლამდელი აღზრდა-განათლების ხარჯები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ბლოკზე მშობლები იძლევიან ინფორმაციას ბავშვების სკოლამდელი აღზრდა-განათლების ხარჯების შესახებ.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 1.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში √ და გადადით **ნაწილი 2-ზე** □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
1	რომელ საბავშვო ბაღში ან აღმზრდელთან დაგყავთ (დაგყავდათ) ბავშვი?	კოდი:	კოდი:	კოდი:
	<p>კოდეზი</p> <p>1. სახელმწიფო საბავშვო ბაღში (ბაგაში)</p> <p>2. კერძო საბავშვო ბაღში (ბაგაში)</p>	<p>3. დაგყავს აღმზრდელთან სახლში</p> <p>4. აღმზრდელი დაქირავებულია ოჯახში</p>		
2.	რამდენი ლარია გადასახდელი ბავშვის ბაღში (ბაგაში) ან აღმზრდელთან ყოფნისათვის საშუალოდ ერთ თვეში? (თუ არაფერი, ჩაწერეთ 0)	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერ-დეკემბერში		
3.	სულ რამდენი გადაიხადეთ? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში ბავშვი არ დაგყავდათ, უჯრაში ჩაწერეთ X)	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერში		
4.	რამდენ ლარს ხარჯავდით სხვა ხარჯების (საჩუქრების, სხვადასხვა მოსაკრებლების და ა.შ.) სახით?	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერში		
5.	ხომ არ დააფინანსა ბავშვის აღზრდა ნაწილობრივ მანძი:	კოდი:	კოდი:	კოდი:
	<p>1. კერძო პირმა?</p> <p>2. კერძო ფირმამ?</p> <p>3. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ?</p> <p>4.</p> <p>სახელმწიფომ?</p> <p>5. სხვამ?</p> <p>6. არა, არავის დაუფინანსებია.</p> <p>⇒ ნააწ2</p>			
6.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს დაფინანსება?			

ნაწილი 2. სკოლაში, გიმნაზიაში, სკოლა-ლიცეუმში სწავლის ხარჯები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია ამ ტიპის სასწავლებელთა მოსწავლეებზე.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 2

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი აღნიშნეთ უჯრაში √ და გადადით **ნაწილი 3-ზე** □.

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
7	<p>რომელ სკოლაში, გიმნაზიაში, სკოლა-ლიცეუმში სწავლობდით ან სწავლობთ ამჟამად?</p> <p>კოდები</p> <p>1. სახელმწიფო უფასო 3. კერძო</p> <p>2. სახელმწიფო ფასიანი 4. სხვა (დაასახე- ლეთ)</p>	კოდი:	კოდი:	კოდი:
<p>რამდენი ლარი იყო გადასახდელი სკოლაში სწავლისათვის 2000 წლის დასაწყისიდან (იანვარ-ივნისში და სექტემბერში) (თუ არაფერი, ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X)?</p>				
8	სკოლის (სასწავლებლის) გადასახადი (სწავლის ქირა) საშუალოდ ერთ თვეში	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერ-დეკემბერში		
9	სასწავლო სექციებში, წრეებში მეცადინეობისათვის საშუალოდ ერთ თვეში	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერ-დეკემბერში		

რამდენი ლარი გადაიხადეთ სკოლაში სწავლისათვის 2000 წლის ანგარიშში (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, უჯრაში ჩაწერეთ X)?

10.	სკოლის (სასწავლებლის) გადასახადი (სწავლის ქირა)	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
11	სასწავლო სექციებში, წრეებში მეცადინეობისათვის	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
12	სასწავლო ნივთების (წიგნების, რვეულების) შესაძენად, სულ	იანვარ-ივნისში			
		აგვისტო-სექტემბერში			
13	სხვა, მათ შორის არარეგულარული ხარჯები, სულ	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
14.	სწავლის დროს (საგნების ჩაბარების, მომდევნო კლასში გადაყვანის ან სხვა მიზეზით) ხომ არ დაგჭირდათ არაოფიციალური ხარჯების გაწევა? 1. დიახ. 2. არა. ⇒ ნააწ. 16				
15.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს ხარჯები?				
16	ხომ არ დააფინანსა თქვენი სწავლება ნაწილობრივ მაინც: 1. კერძო პირმა? 4. სახელმწიფომ? 2. კერძო ფირმამ? 5. სხვამ? 3. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ? 6. არა, არავის დაუფინანსებია. ⇒ ნააწ.18	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
17.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს დაფინანსება?				
18	თუ ნატურით (რაიმე ნივთის, პროდუქტის, სხვადასხვა საქონლის მიცემით ან სამსახურის გაწევით) იხდით სწავლის საფასურის ნაწილს მაინც, ან აკეთებთ ამას მასწავლებლის პატივსაცემად, გთხოვთ შეაფასოთ, მიახლოებით რა ღირებულებისაა (ლარებში) ეს საქონელი და მომსახურება?				

ნაწილი 3. მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელთა ხარჯები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია უმაღლესი სასწავლებლის მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელთა ხარჯების შესახებ.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 3.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში √ და გადადით **მე-4 ნაწილზე** □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ)				
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ)				
19	ფასიანია თუ არა მოსამზადებელი განყოფილება, სადაც სწავლობდით ან სწავლობთ ამჟამად? 1. დიახ. 2. არა.	კოდი:	კოდი:	კოდი:

თუ 20-23 სტრიქონების მიხედვით არაფერია გადასახდელი (გადახდილი) ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, უჯრაში ჩაწერეთ X)

20.	რამდენი ლარი იყო გადასახდელი მოსამზადებელ განყოფილებაში სწავლისათვის? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0)	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
21.	აქედან რამდენი ლარი გადაიხადეთ სწავლისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
22	რამდენი ლარი გადაიხადეთ სასწავლო ნივთების (წიგნების, რვეულების...) შესაძენად? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0)	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			

23	რამდენი ლარი გადაიხადეთ სხვა, მათ შორის, არარეგულარული ხარჯების სახით? (თუ არაფერი, ჩაწერეთ 0)	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
24	24. ხომ არ დააფინანსა თქვენი სწავლება ნაწილობრივ მაინც: 1. კერძო პირმა? 4. სახელმწიფომ? 2. კერძო ფირმამ? 5. სხვამ? 3. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ? 6. არა, არავის დაუფინანსებია. ⇒ ნააწ.26	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
25	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს დაფინანსება?				
26	თუ ნატურით (რაიმე ნივთის, პროდუქტის, სხვადსხვა საქონლის მიცემით ან სამსახურის გაწევით) იხდით სწავლების საფასურის ნაწილს მაინც, გთხოვთ შეაფასოთ, მიახლოებით რა ღირებულებისაა (ლარებში) ეს საქონელი და მომსახურება?				

ნაწილი 4. კოლეჯში, ტექნიკუმში, სპეციალურ სასწავლებლებში სწავლის ხარჯები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია კოლეჯების, ტექნიკუმების, ან სპეციალური სასწავლებლების მოსწავლეების, სტუდენტებისათვის

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 4.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში √ და გადადით მე-5 ნაწილზე □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ)				
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
27.	რომელ კოლეჯში, ტექნიკუმი, სპეციალურ სასწავლებელში სწავლობდით ან სწავლობთ ამჟამად? (პასუხის კოდი ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში) 1. სახელმწიფო უფასო 2. სახელმწიფო ფასიანი 3. კერძო 4. სხვა (დაასახელეთ)	კოდი:	კოდი:	კოდი:

რამდენი ლარი იყო გადასახდელი სასწავლებელში 2000 წლის დასაწყისიდან? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X)

28	სწავლისათვის (სწავლის ქირა)?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
29	სასწავლო სექციებში, წრეებში მეცადინეობისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			

რამდენი ლარი გადაიხადეთ კოლეჯში, ტექნიკუმში, სპეციალურ სასწავლებელში? (იანვარ-ივნისში და სექტემბერში) (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X)

30.	სწავლისათვის? (სწავლის ქირა)?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
31.	სასწავლო ნივთების (წიგნების, რვეულების...) შესაძენად?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
32.	სასწავლო სექციებში, წრეებში მეცადინეობისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
33.	სხვა, მათ შორის არარე-	იანვარ-ივნისში			

	გულარული ხარჯები?	სექტემბერ- დეკემბერში			
34.	სასწავლებელში ჩარიცხვისათვის, სწავლის დროს (საგნების ჩაბარების, სპეციალობის შეცვლის ან სხვა მიზეზით) ხომ არ დაგჭირდათ არაოფიციალური ხარჯების გაწევა? 1. დიახ. 2. არა. ⇒ 36		კოდი:	კოდი:	კოდი:
35.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენდა ეს ხარჯები?				
36.	ხომ არ დააფინანსა თქვენი სწავლება ნაწილობრივ მაინც: 1. კერძო პირმა? 4. სახელმწიფომ? 2. კერძო ფირმამ? 5. სხვამ? 3. საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ? 6. არა, არავის დაუფინანსებია. ⇒ 38		კოდი:	კოდი:	კოდი:
37.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს დაფინანსება?				
38.	თუ ნატურით (რაიმე ნივთის, პროდუქტის, სხვადასხვა საქონლის მიცემით ან სამსახურის გაწევით) იხდით სწავლების საფასურის ნაწილს მაინც, ან აკეთებთ ამას მასწავლებლის პატივსაცემად, გთხოვთ შეაფასოთ, მიახლოებით რა ღირებულებისაა (ლარებში) ეს საქონელი და მომსახურება?				

ნაწილი 5. კერძო მასწავლებელთან, რეპეტიტორთან მომზადება

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია კერძო მასწავლებელთან, რეპეტიტორთან მომზადების ხარჯების შესახებ.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 5.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში \sqrt და გადადით

ნაწილი 6-ზე □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაწილეობიდან (ხაწვრეთ უჯრაში)			
რესპონდენტის სახელი (ხაწვრეთ უჯრაში)			
39 რომელ საგნებში ემზადებ(ოდ)ით?	ხაწვრეთ კოდები		
1. მათემატიკა;	4. გეოგრაფია;		
2. ფიზიკა;	5. ქართული;		
3. ისტორია;	6. უცხო ენები;		
	7. სხვა		
	(დასახელება)		

რამდენი ლარი იყო გადასახდელი მომზადებისათვის 2000 წლის ანგარიშში? (თუ არაფერი ხაწვრეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ხაწვრეთ X) (საგნის რიგითობა აიღეთ 39-ე კითხვიდან)

40.	პირველ საგანში	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
41.	მეორე საგანში	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
42.	დანარჩენ საგნებში, ერთად	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			

რამდენი ლარი გადაიხადეთ მომზადებისათვის 2000 წლის ანგარიშში (თუ არაფერი ხაწვრეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ხაწვრეთ X) (საგნების რიგითობა აიღეთ 39-ე კითხვიდან)

43.	პირველ საგანში	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
44	მეორე საგანში	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-			

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში $\sqrt{\text{და გადადით}}$

მე-7 ნაწილზე □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ)				
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ შესაბამის უჯრაში)				
51.	რომელ უმაღლეს სასწავლებელში ან ასპირანტურაში სწავლობთ ამჟამად კოლეგი 1. სახელმწიფო უფასო 2. სახელმწიფო ფასიანი 3. კერძო ფასიანი 4. სხვა (დაასახელოთ)	კოდი:	კოდი:	კოდი:

რამდენი ლარი იყო გადასახდელი სასწავლებელში 2000 წლის დასაწყისიდან? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X)

52	სწავლისათვის გადასახადი (სწავლის ქირა)?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
53	სასწავლო სექციებში, ლაბორატორიაში მეცადინეობისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			

რამდენი ლარი იყო გადასახდელი სასწავლებელში 2000 წლის დასაწყისიდან? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X)

54	სწავლისათვის გადასახადი (სწავლის ქირა)?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			
55	სასწავლო სექციებში, ლაბორატორიაში მეცადინეობისათვის, მეორად ფაკულტეტზე სწავლისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ-დეკემბერში			

56	სასწავლო ნივთების (წიგნების, რვეულების...) შესაძენად?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ- დეკემბერში			
57	სხვა, მათ შორის არარეგულირებული ხარჯები?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ- დეკემბერში			
58	58. სასწავლებელში ჩარიცხვისათვის ხომ არ დაგჭირდათ არაოფიციალური ხარჯების გაწევა? 1. დიახ. 2. არა.	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
59	შწავლის დროს ხომ არ დაგჭირდათ რაიმე არაოფიციალურ ხარჯების (საგნების ჩაბარების, სპეციალობის შეცვლის ან სხვა მიზეზით) გაწევა? 1. დიახ; 2. არა ⇒ 61	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
60	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს ეს ხარჯები 2000 წლის იანვრიდან?				
61.	ხომ არ დააფინანსა თქვენი სწავლება ნაწილობრივ მაინც: 1. კერძო პირმა? 4. სახელმწიფომ? 2. კერძო ფირმამ? 5. სხვამ? 3. საზოგადოებრივმა 6. არა, არავის ორგანიზაციამ? დაუფინანსებია. ⇒63	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
62.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს დაფინანსება?				
63.	თუ ნატურით (რაიმე ნივთის, პროდუქტის, სხვადასხვა საქონლის მიცემით ან სამსახურის გაწევით) იხდით სწავლების საფასურის ნაწილს მაინც, გთხოვთ შეაფასოთ, მიახლოებით რა ღი- რებულებისაა (ლარებში) ეს საქონელი და მომ- სახურება?				

ნაწილი 7. კვალიფიკაციის (ახალი კვალიფიკაციის მიღების ან ამაღლების) კურსები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია ოჯახის იმ წევრების ხარჯების შესახებ, რომელნიც 2000 წლის დასაწყისიდან სწავლობდნენ კვალიფიკაციის მიღების ან ამაღლების რომელიმე (უცხო ენის, კომპიუტერების, საბუღალტრო და ა.შ.) კურსებზე.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 7.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში √ და გადადით **მე-8 ნაწილზე** □

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (<i>ჩაწერეთ</i>)				
რესპონდენტის სახელი (<i>ჩაწერეთ</i>)				
64	რომელ კურსებზე სწავლობდით ან სწავლობთ ამჟამად? კოდები: 1. უცხო ენის 2. კომპიუტერების 3. საბუღალტრო 4. სხვა (დაასახე- ლეთ)	კოდი:	კოდი:	კოდი:
65	რამდენი ლარი იყო გადასახდელი კურსებზე სწავლისათვის? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X).	იანვარ-ივნისში		
		სექტემბერ-დეკემბერში		

რამდენი ლარი იყო გადაიხადეთ კურსებზე სწავლისათვის? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით,

შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X).

66.	კურსებზე სწავლისათვის?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
67	სასწავლო ნივთების (წიგნების, რეკულებების...) შესაძენად?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
68	სხვა, მათ შორის, არარეგულარული ხარჯები?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
69	სწავლის დროს რაიმე მიზეზით ხომ არ დაგჭირდათ არაოფიციალური ხარჯების გაწევა? 1. დიახ. 2. არა. ⇒ 71	კოდი:	კოდი:	კოდი:	
70.	დაახლოებით რამდენ ლარს შეადგენს მიმდინარე წელს ეს ხარჯები?				
71	თუ ნატურით (რაიმე ნივთის, პროდუქტის, სხვადასხვა საქონლის მიცემით ან სამსახურის გაწევით) იხდით სწავლების საფასურის ნაწილს მაინც, გთხოვთ შეაფასოთ, მიახლოებით რა ღირებულებისაა (ლარებში) ეს საქონელი და მომსახურება?				

ნაწილი 8. საზღვარგარეთ ბანათლების ხარჯები

ინტერვიუერს: კითხვების ამ ნაწილში უნდა შემოიტანოთ ინფორმაცია საზღვარგარეთ განათლების ხარჯების შესახებ.

გადმოწერეთ პირველი კითხვიდან რესპონდენტთა ის ნომრები და სახელები, რომელთა პასუხების მიხედვით ცხრილის მე-4, მე-5 ან მე-6 სვეტებში შეტანილია კოდი 8.

თუ ოჯახში არ არის ასეთი რესპონდენტი, აღნიშნეთ უჯრაში და გადადით 81-ე კითხვაზე

რესპონდენტის ნომერი ზოგადი მონაცემებიდან (ჩაწერეთ)					
რესპონდენტის სახელი (ჩაწერეთ)					
72.	რომელ ქვეყანაში სწავლობთ ამჟამად? კოდები 1. რუსეთი 2. აშშ 3. გერმანია	4. ევროპის სხვა ქვეყანა (გერმანიის გარდა) 5. სხვა (დაასახელეთ)	კოდი:	კოდი:	კოდი:
73	რამდენი აშშ დოლარი იყო გადასახდელი 2000 წლის დასაწყისიდან? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X).	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერ- დეკემბერში			

რამდენი აშშ დოლარი გადაიხადეთ 2000 წლის დასაწყისიდან? (თუ არაფერი ჩაწერეთ 0, თუ მითითებული პერიოდებიდან რომელიმეში არ სწავლობდით, შესაბამის უჯრაში ჩაწერეთ X).

74	სწავლისათვის გადასახადი (სწავლის ქირა)?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
75	სასწავლო ნივთების (წიგნების, რვეულების...) შესაძენად?	იანვარ-ივნისში			
		სექტემბერში			
76	სტუდენტის (მოსწავლის) მიმდინარე ხარჯებისათვის	იანვარ-ივნისში			
		აგვისტო- სექტემბერში			

შარპის ფურცელი

გამოკვლევის უბანი -----

ინტერვიუერი ----- ზედამხედველი -----

ინტერვიუერს: თქვენი გამოსაკვლევი იმ მისამართებიდან, რომლებიდანაც რაიმე მიზეზით ვერ იქნა მიღებული ინტერვიუ, თითოეულ მათგანზე ცალ-ცალკე მე-3 გრაფაში უნდა მოგვცეთ პასუხის ვერ მიღების მიზეზი. მე-4 გრაფაში კი უნდა შეიტანოთ ამ ოჯახების გამოსაკვლევ ტერიტორიაზე მცხოვრებ სხვა ოჯახებთან შედარებით მატერიალური მდგომარეობის თქვენი თვალსაზრისით შეფასება. პასუხები შეიტანეთ თანდართული ვარიანტების მიხედვით.

რესპონდენტის შინ არ დახვედრის შემთხვევაში ამ მისამართს განმეორებით თქვენ სულ მცირე ორჯერ მაინც უნდა მიაკითხოთ და მხოლოდ შემდეგ შეიტანოთ ამ ფორმაში უარის შესაბამისი მიზეზი.

თუ სახლი ხანგრძლივი დროითაა დაკეტილი, შეეცადოთ მისი მეზობლების მეშვეობით გაიგოთ ერთ წელზე მეტი თუ ნაკლები ხნით არიან წასული.

№	შინამეურნეობის №	ინტერვიუს არჩატარების მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამისი კოდი ან კომენტარი)	შინამეურნეობის მატერიალური მდგომარეობა
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

ინტერვიუს ჩაშტარებლობის კოდეზი:

სახლში ცხოვრობენ, მებრამ:

1. უარი განაცხადეს ინტერვიუზე
2. შინ არავინ დაგხვდა
3. ხარჯების შესახებ ინფორმირებული წვერი შინ არ დაგხვდა
4. დროებით წასული არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საქართველოს სხვა კუთხეში
5. დროებით წასული არიან (რამდენიმე კვირით, თვით ან სეზონურად) საზღვარგარეთ
6. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში)

სახლში არავინ ცხოვრობს:

7. მობინადრეები გადავიდნენ საცხოვრებლად სხვა ადგილზე, სხვა კუთხეში, საქართველოს ფარგლებში
8. მობინადრეები წავიდნენ საცხოვრებლად საზღვარგარეთ
9. მობინადრე გარდაიცვალა
10. სხვა მიზეზი (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში)

მისამართზე არ (აღარ არის) საცხოვრებელი:

11. არარსებული მისამართი
12. ბინა (სახლი) დანგრეულია, ან ავარიულობის გამო საცხოვრებლად აღარ გამოიყენება
13. ბინა (სახლი) არ გამოიყენება საცხოვრებლად (გადაკეთდა სხვა დანიშნულების ობიექტად)
14. სხვა მიზეზი: (ჩაწერეთ შესაბამის სტრიქონში)

შინამეურნეობის მატერიალური მფლობელობის კოდეზი:

1. ძალიან მაღალი
2. მაღალი
3. საშუალო
4. დაბალი
5. ძალიან დაბალი
6. მიძნელებული პასუხის გაცემა

**დანართი III. განათლების დაწესებულებების საქმიანობის
გამოკვლევის კითხვარი
საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი**

დაწესებულებების სტატისტიკური საინფორმაციო (რვანიშნა) კოდი		საწარმოს სრული დასახელება, მისამართი	
ტერიტორიის კოდი			
საკუთრების ფორმა		(დაასახელეთ)	
ორგანიზაციულ- სამართლებრივი ფორმა		(დაასახელეთ)	
პირითადი საქმიანობა სეკ (NACE)-001-97-ის მიხედვით		(დაასახელეთ)	
მიღებული სტატისტიკური მონაცემების საიდუმლოება დაცულია „სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალით. თქვენი საწარმოს მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ნაერთი სტატისტიკური გაანგარიშებებისათვის			

**განათლების დაწესებულებების საქმიანობის
გამოკვლევა**

2000 წლის იანვარ-სექტემბრის შედეგების მიხედვით

წარმოადგენენ შერჩევით გამოკვლევის სიაში მოხვედრილი განათლების დაწესებულებები, განურჩევლად საკუთრებისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა.	სტატისტიკური ფორმა №1-განათლება (განათლების დაწესებულებებისათვის)
---	---

I. დასაქმება და კონტინგენტი

კაცი

მაჩვენებლების დასახელება	სტრი- ქონი	დაწესებულ ბაში სულ
1	2	3
მოსწავლეთა (სტუდენტთა, აღსაზრდელთა)	10	

რაოდენობა 2000 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით		
მოსწავლეთა (სტუდენტთა, აღსაზრდელთა) რაოდენობა 2000 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით	11	
მომუშავეთა საშუალო სიითი რაოდენობა, სულ	12	
შემთავსებელთა საშუალო რაოდენობა, სულ	13	
მომუშავეთა რაოდენობა, რომელთაც დაერიცხათ ხელფასი	14	

II. შემოსავლები და ხარჯები

ა) შემოსავალი (საოპერაციო შემოსავლები)		
სწავლის გადასახადი (მთლიანი ან თანაგადახდის ის ნაწილი, რომელიც მოსწავლეს (მოსწავლის ოჯახს) ერიცხება გადასახდელად)	20	
დარიცხული დაფინანსება სახელმწიფოს (ცენტრალური ან ტერიტორიული (ადგილობრივი) ბიუჯეტის) რესურსებიდან	21	
მათ შორის: სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის დარიცხული დაფინანსება	22	
კაპიტალური ხარჯების დაფინანსება	23	
შემოსავლები სხვა წყაროებიდან, შემოწირულობები	24	
შემოსავლები ქონების იჯარით გაცემიდან, დღგ-ს გარეშე	25	
მთლიანი პროდუქცია არაძირითადი საქმიანობიდან (რეალიზაციისა და მზა პროდუქციის მარაგების ცვლილების ჯამი), დღგ-ს და აქციზის გარეშე	26	
სხვა საოპერაციო შემოსავლები (დაასახელეთ)	27	
ბ) მომსახურების, სამართო და აღმინისტრაციული ხარჯები (საოპერაციო ხარჯები)		
ნედლეულისა და მასალების ხარჯი	30	
სათბობისა და ენერჯის ხარჯი	31	
გარე ორგანიზაციების ან ფიზიკური პირების მიერ	32	

კომუნალური, კავშირგაბმულობის, სატრანსპორტო, რეკლამის, მარკეტინგული კვლევის, სარემონტო და ა.შ. გაწეული მომსახურების მოცულობა		
საიჯარო ქირა	33	
შრომის ანაზღაურება, სოციალური ანარიცხების გარეშე	34	
სოციალური ანარიცხები	35	
სტიპენდიები	36	
ექსპლოატაციაში მყოფ ძირითად კაპიტალზე დარიცხული ამორტიზაცია (ცვეთა)	37	
სხვა საოპერაციო ხარჯები (დაასახელო)	38	
ბ) სხვა შემოსავლები (არასაოპერაციო შემოსავლები)		
ძირითადი კაპიტალის ობიექტის გაყიდვიდან დარიცხული შემოსავალი	40	
სხვა არასაოპერაციო შემოსავლები (დაასახელო)	41	
გ) სხვა ხარჯები (არასაოპერაციო ხარჯები)		
ძირითადი და საბრუნავი კაპიტალის გასვლის (ჩამოწერის, რეალიზაციის) შედეგად მიღებული ზარალი	50	
სხვა არასაოპერაციო ხარჯები	51	
დ) გადასახადები (დარიცხული)		
დღგ	60	
ლიცენზიის ადების ხარჯები	61	
წარმოების ხარჯებში შესული გადასახადები (ქონების, სამეწარმეო, საგზაო და სხვა)	62	
მოგების გადასახადი	63	
III. დაბანდობები ძირითად კაპიტალში		
ლარებში		
შენობა-ნაგებობები (მათი კაპიტალური რემონტის ხარჯების ჩათვლით)	70	
მანქანა-დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები, ავეჯი, კომპიუტერები და სხვა ორგტექნიკა (მათი კაპიტალური რემონტის ხარჯების ჩათვლით)	71	
სხვა (გთხოვთ დაასახელო)	72	

IV. ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები

ლარებში

ა) აქტივები		1.1.2000	1.10.2000
		მდგომარეობით	მდგომარეობით
ნაღდი ფული და დეპოზიტები	80		
მოთხოვნები ცენტრალური ან ტერიტორიული (ადგილობრივი) ბიუჯეტისადმი	81		
მოთხოვნები გაწეული კომერციული მომსახურებიდან (კონტინგენტის დაგაღიანება სასწავლებლისადმი)	82		
სხვა ფინანსური აქტივები	83		

ბ) ვალდებულებები

დაგაღიანება მომსახურე პერსონალის მიმართ (გაუცემელი ხელფასების და სხვა სარგოების სახით)	90		
სასწავლებლის მიერ კონტინგენტისაგან მიღებული ან სხვა ავანსები	91		
სხვა ფინანსური ვალდებულებები	92		

დაწესებულების ხელმძღვანელი ----- ტელეფონის № -----
(სახელი, გვარი)

შემსრულებელი ----- 2000 წელი
(სახელი, გვარი)

მოკლე მითითებები

სტატისტიკური ფორმა „№1 განათლების“ შევსებისათვის

1. წინამდებარე ფორმა შეივსება მიმდინარე - 2000 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემების საფუძველზე.
2. ფორმას ავსებენ შერჩევითი წესით სტატისტიკურ დაკვირვებას დაქვემდებარებული (ნებისმიერი საკუთრებისა და დაფინანსების წყაროს მქონე) საბავშვო ბაღები, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები, კოლეჯები, ტექნიკუმები, სპეციალური და უმაღლესი სასწავლებლები, აგრეთვე განათლების სფეროს სხვა დაწესებულებები.
3. ფორმის I განყოფილებაში უნდა შეიტანოთ დაწესებულებაში მომუშავეთა და მოსწავლეთა (სტუდენტთა, აღსაზრდელთა) კონტიგენტზე მონაცემები.
4. ფორმის II განყოფილების შემოსავლების ნაწილში ნაჩვენები იქნება მიმდინარე წლის ცხრა თვეში შესაბამისი დაწესებულებების შემოსავლების სხვადასხვა წყაროები, მათ შორის:
5. 20-ე სტრიქონზე ნაჩვენები უნდა იქნას მოსწავლეთა (სტუდენტთა) სწავლისათვის გადასახდელად დარიცხული თანხა პირველი იანვრიდან პირველ ოქტომბრამდე. გაანგარიშება უნდა მოხდეს 1999-2000 სასწავლო წლის მეორე ნახევრის გადასახადზე 2000-2001 სასწავლო წლის პირველი ნახევრის გადასახადიდან სექტემბრის თვის წილად დარიცხული გადასახადის დამატებით.
6. 21-ე სტრიქონზე შეიტანება სახელმწიფო (ცენტრალური ან ადგილობრივი) ბიუჯეტიდან დარიცხული დაფინანსება, საიდანაც 22-ე და 23-ე სტრიქონებზე ცალკე უნდა იქნას გამოყოფილი სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და კაპიტალური ხარჯების (ტექნიკის, ინვენტარის, ავეჯის შეძენის, რემონტის, მშენებლობის და ა.შ.) დაფინანსება.
7. 24-ე სტრიქონზე შეიტანება მშობლებიდან ან სხვადასხვა წყაროებიდან შემოწირულობების სახით ფაქტიურად მიღებული შემოსავლები, გახანგრძლივებული სწავლების, ფასიანი წრეების დარიცხული შემოსავლები.
8. 25-ე სტრიქონზე შეიტანება ქონების (ძირითადი საშუალებების) იჯარით გაცემიდან დარიცხული შემოსავალი.
9. 26-ე სტრიქონზე შეიტანება არაძირითადი საქმიანობიდან, მაგალითად, დამხმარე სასოფლო-სამეურნეო, სასწავლო სახელოსნოების ნაკეთობების ან სხვა პროდუქციის რეალიზაციიდან დარიცხული შემოსავლებისა (დღგ-სა და

აქციზის გარეშე) და მათი საკუთარი საჭიროებისათვის გამოყენებული და მარაგების ცვლილების მიმდინარე ფასებში გადაანგარიშებული ჯამი.

10. 27-ე სტრიქონი განკუთვნილია იმ საოპერაციო შემოსავლების აღსარიცხად, რომელთა იდენტიფიკაცია არ ხერხდება წინა პუნქტებში, კერძოდ აქ უნდა აღირიცხოს სხვადასხვა გრანტების, პროგრამების, პროექტების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების მოცულობა.

11. ფორმის II განყოფილების „ბ“ ნაწილში 30-38-ე სტრიქონებზე ნაჩვენები იქნება მიმდინარე საწარმო ანუ საოპერაციო დარიცხული ხარჯები (ადმინისტრაციული ხარჯების ჩათვლით), მათ შორის:

33-ე სტრიქონში შეიტანება საიჯარო ქირა, რომელიც მოდის წლიური გადასახადიდან პირველი სამი კვარტალის წილად, იმისდა მიუხედავად გადახდილი იქნა იგი თუ არა;

34-ე სტრიქონზე - შრომის ანაზღაურების ხარჯები სოციალური ანარიცხების გარეშე;

35-ე სტრიქონზე ნაჩვენები იქნება ეს სოციალური ანარიცხები. აქაც იგულისხმება ამ პერიოდში დარიცხული ხელფასი და ანარიცხები.

12. 36-ე სტრიქონში შევა 2000 წლის იანვარ-სექტემბერში დარიცხული სტიპენდიების მთლიანი თანხა.

13. თუ ამორტიზაციის (ძირითადი საშუალებების ცვეთის) გაანგარიშება ხდება მხოლოდ წლიურ მონაცემებზე, მაშინ 37-ე სტრიქონში ჩაიწერება წინა წელს დარიცხული წლიური ამორტიზაციის 3/4.

14. 38-ე სტრიქონში შევა ისეთი საოპერაციო ხარჯები, რომელთა კლასიფიცირება ვერ მოხერხდა 30-37 სტრიქონებში, გარდა წარმოების ხარჯებში შესული გადასახადებისა, რომლებიც შეიტანება 62-ე სტრიქონში.

15. ფორმის II განყოფილების „გ“ ნაწილში 40-41-ე სტრიქონებზე ნაჩვენები იქნება აოასაოპერაციო შემოსავლები: 40-ე სტრიქონზე უნდა შეიტანოთ ძირითადი კაპიტალის ობიექტის გაყიდვიდან დარიცხული მთლიანი შემოსავალი, 41-ე სტრიქონზე კი უნდა შეიტანოთ ისეთი საოპერაციო შემოსავლები, როგორცაა საპროცენტო შემოსავლები, გადაგადაცილებული ან უიმედო დავალიანების დასაფარად შემოსული თანხები და სხვა.

16. 50-51 სტრიქონებში შევა არასაოპერაციო ხარჯები. 50-ე სტრიქონზე უნდა შეიტანოთ ძირითადი და საბრუნავი კაპიტალის გასვლის (ჩამოწერის, რეალიზაციის) შედეგად მიღებული ზარალი, რაც ტოლია მისი ნარჩენი ღირებულებისა. ამასთან, რეალიზაციის ან ჩამოწერილი საშუალების უტილიზაციის ხარჯები უნდა შევიდეს მომდევნო - 51-ე სტრიქონზე. 51-ე

სტრიქონზევე უნდა შეიტანოთ ისეთი არასაოპერაციო ხარჯები, როგორცაა საპროცენტო, ვალდებულებების დასაფარად გაწეული ხარჯები და სხვა.

17. ფორმის II განყოფილების „ე“ ნაწილში ჩაიწერება დარიცხული გადასახადები: 60-ე სტრიქონზე - დღე, 61-ზე - მოცემულ პერიოდში ლიცენზიების აღების მთლიანი ღირებულება ხოლო 62-ში - სხვა გადასახადები, გარდა იმ გადასახადებისა, რომლებიც ჩართულია 35-ე სტრიქონში, ხოლო 63-ში - მოგების გადასახადი.

18. 70-72 სტრიქონები განკუთვნილია ა.წ. იანვარ-სექტემბერში გაწეული კაპიტალური ხარჯების აღსარიცხავად. რემონტის ხარჯები უნდა შევიდეს კაპიტალურ ხარჯებში, თუ ამ ოპერაციის შედეგად მოხდა რემონტის ობიექტის ნარჩენი (აღდგენითი) ღირებულების გარკვეული გაზრდა (აღდგენა).

19. ფორმის IV განყოფილებაში ა.წ. 1 იანვრისა და 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ნაჩვენები იქნება ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები. ამ ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოსწავლე კონტინგენტის დავალიანებას და წინასწარ გადახდილი სწავლის საფასურის სწორ ჩვენებას.

**გმაღლობთ სტატისტიკურ გამოკვლევაში მონაწილეობისა და
ინფორმაციის მოწოდებისათვის!**

დანართი IV

ზოგიერთი რამ ბიჰევიორიზმის შესახებ*

ბიჰევიორიზმი (ინგ. behaviour – ქცევა)* – ფსიქოლოგიის გავრცელებული მიმდინარეობა. წარმოიშვა აშშ-ში XX ს. დასაწყისში. ფუძემდებელია ჯ. უოტსონი (მან, პირველმა 1913 წელს დაწერა საპროგრამო სტატია „ფსიქოლოგია, როგორც მას ხედავს ბიჰევიორისტი“). იგი დაუპირისპირდა ტრადიციულ ფსიქოლოგიურ აზროვნებასა და მთლიანად ადამიანის შესახებ მეცნიერებათა სისტემას:

- მენტალური პროცესების ნაცვლად ფსიქოლოგიის საგნად გამოაცხადა ადამიანის ქცევა;

- საკუთრივ ადამიანის (პიროვნების) პრობლემა მისი ქცევის პრობლემაზე დაიყვანა;

- ბიჰევიორიზმი არსებითად ზოოფსიქოლოგიის მონაცემებზე აღმოცენდა და როგორც ადამიანის, ისე ცხოველის ქცევა ერთსა და იმავე კატეგორიებში დაახასიათა. ამ მხრივ, დიდი როლი შეასრულა ამერიკელი ზოოფსიქოლოგის ე. თორნდაიკის ექსპერიმენტებმა, კერძოდ, მისმა ცდისა და შეცდომის ცნობილმა მეთოდმა, რისთვისაც ე. თორნდაიკს ზოგჯერ ბიჰევიორიზმის მამამთავრადაც კი თვლიან.

- ბიჰევიორიზმის, როგორც არატრადიციული ფსიქოლოგიის კონცეფციის, შედარებით ამომწურავ დახასიათებას იძლევა მისი ე.წ. „სტიმულისა (S) და რეაქციის (R) ფორმულა (S-R), გარემოსთან ორგანიზმის დამოკიდებულების ფორმულა, სადაც ყოველი სტიმული (S) უშუალოდ (ერთმნიშვნელოვნად) ყოველგვარი შუამდებარე ცვლადის გარეშე იწვევს რეაქციას (R) და როგორც ერთის, ისე მეორის ზუსტი აღრიცხვა შესაძლებელია.

- ბიჰევიორისტული მეთოდების გამოყენებამ გარკვეული გავლენა მოახდინა საერთოდ, ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის გაგებაზე.

- ადამიანის (ისე როგორც ცხოველისა და მანქანის) ქცევის კვლევა ცნობიერების (როგორც საკუთრივ ფსიქოლოგიური მახასიათებლის) გარეშე – ასეთი იყო კლასიკური ბიჰევიორიზმის ძირითადი ამოცანა.

მაგრამ მალე თვითონ ბიჰევიორისტებმაც (უ. ჰანტერი, კ. ლეშლი, ფ. ოლპორტი) იგრძნეს, რომ ადამიანის ქცევის კვლევის დროს აუცილებელი იყო გაეთვალისწინებინათ საკუთრივ ფსიქოლოგიური მახასიათებლები (იხ. ნეობიჰევიორიზმი).

- ბიჰევიორიზმის კრიტიკა განვითარდა, ერთი მხრივ, ცენტრალური ნერვული სისტემის (ტვინის) ფიზიოლოგიური (პავლოვი და მისი მიმდევრები) და ნეიროფიზიოლოგიური მიმართულების მეცნიერების წარმომადგენელთა გამოკვლევების, ხოლო მეორე მხრივ, პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური გამოკვლევების საფუძველზე. განსაკუთრებით დიდი როლი შეასრულა განწყობის ფსიქოლოგიის, კერძოდ, დ. უზნაძის განწყობის ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მონაცემებმა. ამ მონაცემების საფუძველზე, შესაძლებელი გახდა ორგანიზმის, როგორც ფსიქო-ფიზიოლოგიური სისტემის, კვლევა მასსა და გარემოს შორის სრულიად ახლებურად გაგებულ „შუამდებარე ცვლადის – განწყობის მიხედვით, რასაც შეესაბამება ფორმულა: S-G-R (სტიმული – განწყობა – რეაქცია).

შინაარსი

თაზო I. შემთხვევით მოვლენათა მათემატიკური მოდელირების შესავალი	6
§1. მათემატიკური მოდელირების ეტაპები	6
§2. შემთხვევითობა ჩვენს ცხოვრებაში. ცვალებადობა და კანონზომიერება. ცვლადის ცნება.....	7
§3. გაზომვა. ცვლადის გაზომვის სკალები. რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლადები.....	14
3.1. სახელდების სკალა.....	15
3.2. რიგის სკალა.....	17
3.3. ინტერვალების სკალა.....	19
3.4. შეფარდების სკალა.....	23
3.5. თვისობრივი, რაოდენობრივი მონაცემები და ცვლადები ბიჰვეიორის-ტულ მეცნიერებებში. ცვლადების კლასიფიკაცია.....	25
3.6. გაზომვის რეალური საზღვრების დადგენა. დამრგვალება.....	27
3.7. გაზომვის რეალური საზღვრები.....	28
§4. დაკვირვება (ცდა, ექსპერიმენტი). ხდომილობა. რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემები.....	32
§5. დინამიკური და სტატისტიკური კანონზომიერებები. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საგანი	37
§6. გამოყენების სფეროები და მოკლე ისტორიული ექსკურსი	43
თაზო II. აღწერითი სტატისტიკა	46
§1. სტატისტიკური მონაცემები, პოპულაცია და შერჩევა	46
§2. მონაცემთა მოპოვების მეთოდები, ცვლადი.....	51
§3. სტატისტიკური მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები და ანალიზი	60
§4. მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები. შერჩევის რიცხვითი მახასიათებლები	74
ა) ცენტრალური ტენდენციის საზომები	75
ბ) მონაცემთა გაფანტულობის საზომები	77
§5. მონაცემთა რანგი. მონაცემთა დაგროვილი სიხშირეები. კუმულატა	78
§6. რაოდენობრივ მონაცემთა დაჯგუფება. ინტერვალებად	85
§7. დაჯგუფებული მონაცემების სიხშირეთა (ფარდობით სიხშირეთა) გრაფიკული წარმოდგენა, ჰისტოგრამა, ოგივა., პოლიგონი მოდალური ინტერვალი	89
§8. რიცხვითი მახასიათებლები დაჯგუფებული მონაცემებისათვის. სიხშირეთა განაწილების ტიპობრივი ფორმები	93
სავარჯიშოები	105
კითხვები განმეორებისათვის	117

თაზო III. ალბათობის თეორიის ელემენტები. თეორიული მასალა	121
§1. ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. მოქმედებები ხდომილობებზე	121
§2. კომბინატორიკა.	123
2.1. კომბინატორიკის ზოგადი წესები	125
2.2. კომბინატორიკის მარტივი სქემები	128
§3. ალბათობის სტატისტიკური, კლასიკური და გეომეტრიული განსაზღვრა	132
§4. ხდომილობათა ჯამის ალბათობა. საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა.....	133
§5.პირობითი ალბათობის ფორმულა. ხდომილობათა ნამრავლის ალბათობა	134
§6. სრული ალბათობისა და ბაიესის ფორმულები	137
§7. დამოუკიდებელ ცდათა სქემა	137
§8. შემთხვევითი სიდიდე. შემთხვევითი სიდიდის ალბათობების განაწილების კანონი, განაწილების ფუნქცია და სიმკვრივე. მაგალითები	139
§9. ორი შემთხვევითი სიდიდის ერთობლივი განაწილება	143
§10. შემთხვევითი სიდიდის ფუნქცია	145
§11. შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინი და დისპერსია	147
§12. კოვარიაცია და კორელაციის კოეფიციენტი.	149
§13. დიდ რიცხვთა კანონი. ჩებიშევის უტოლობა, ჩებიშევის თეორემა, ბერნულის თეორემა	151
§14. ცენტრალური ზღვართი თეორემა ერთნაირად განაწილებულ შესაკრებთა ჯამის შესახებ.....	152
თაზო IV. მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. თეორიული მასალა.....	153
§1. შერჩევითი მეთოდი. პოლიგონი. ჰისტოგრამა	153
§2.უცნობი პარამეტრისთვის შერჩევაზე დაფუძნებული წერტილოვანი შეფასებები. კლასიფიკაცია და შეფასებათა მიღების მეთოდები	155
§3. ნდობის ინტერვალი. ნდობის ინტერვალის აგების მაგალითები	158
§4. ჰიპოთეზათა შემოწმება	160
თაზო V. სავარჯიშოები ალბათობის თეორიაში მეთოდური მითითებებით.....	164
§1. ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე. მოქმედებანი ხდომილობებზე	164
§2. ალბათობის კლასიკური, სტატისტიკური, გეომეტრიული განსაზღვრა.....	165
ამოცანები, რომლებიც ამოიხსნებიან კომბინატორიკის გამოყენებით	168
§3. ხდომილობათა ჯამის ალბათობა. საწინააღმდეგო ხდომილობის ალბათობა. სრული ალბათობისა და ბაიესის ფორმულები	170
§4. მეთოდური მითითებები.	175
4.1. ტესტური ამოცანები	182
პასუხები	185

§5. დამოუკიდებელ ცდათა მიმდევრობა. ბერნულის ფორმულა, მუავრ-ლაპლასის ლოკალური და ინტეგრალური თეორემები, პუასონის ფორმულა, უალბათესი რიცხვი.....	186
5.1. ტესტური ამოცანები	188
§6 მეთოდური მითითებები. პასუხები	192
§7. დისკრეტული ტიპის შემთხვევითი სიდიდე. განაწილების კანონი, რიცხვითი მახასიათებლები	196
§8. უწყვეტი ტიპის შემთხვევითი სიდიდე, განაწილების ფუნქცია. განაწილების სიმკვრივე, რიცხვითი მახასიათებლები	198
§9. თანაბარი მანვენებლიანი და ნორმალური განაწილების კანონი	204
9.1. დისკრეტული განაწილების თეორიული მაგალითები	208
§10. მეთოდური მითითებები. პასუხები	209

თავი VI. სავარჯიშოები მათემატიკურ სტატისტიკაში. დასკვნითი

სტატისტიკა.....	217
§1. მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები	217
§2. მეთოდური მითითებები. პასუხები	224
დანართი I	232
ცხრილი I.....	232
ცხრილი II	233
ცხრილი III.....	234
ცხრილი IV	235
ცხრილი V	236
ცხრილი VI	236
ცხრილი VII	237
დანართი II განათლების მიღებისათვის მოსახლეობის მიერ გაწეული ხარჯების კითხვარი	239
დანართი III	259
დანართი IV ზოგიერთი რამ ბიჰევიორიზმის შესახებ	266
ლიტერატურა	271

ლიტერატურა

1. გ. მანია ალბათობის თეორიის კურსი. თსუ, თბილისი, 1982
2. გ. მანია. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, თსუ, თბილისი, 1976.
3. ბესარიონ დოჭვირი, ჰამლეტ მელაძე. ფინანსური მათემატიკა. ალბათობა და სტატისტიკა (ელემენტები) თსუ, თბილისი, 2003.
4. ტ. ბუაძე, ა. კვალაიშვილი, გ. მირზაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები, დამხმარე სახელმძღვანელო, სტუ, თბილისი, 1987.
5. ნ. ლაზრიევა, გ. მანია, გ. მარი, ა. მოსიძე, ა. ტორონჯაძე, თ. შერვაშიძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა ეკონომისტებისათვის. ფონდი „ვერაზია“, თბილისი, 2009.
6. ტ. ბუაძე, გ. ჯავახიშვილი, რ. დიხამინჯია, გ. ფიფია, თ. ბიბილაშვილი, რ. კაკუბავა. მეთოდური მითითებები ინდივიდუალური მოცემულობების შესასრულებლად ალბათობის თეორიისა და მათემატიკურ სტატისტიკაში, სტუ, თბილისი, 1991.
7. გ. ჯავახიშვილი, ტ. ბუაძე, ზ. კანდელაკი და სხვ. ალბათური მოდელები ეკონომიკაში, თბილისი საავიაციო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009.
8. ი. სხირტლაძე, თ. ტულუში, ა. ოსიძე, ა. ცივაძე, მ. ნადარეიშვილი. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, „განათლება“, თბილისი, 1990.
9. ლ. ბოჭორიშვილი, თ. მოდებაძე, გ. სოხაძე. სპეციალობის შესავალი. (მათ. მეთოდები ეკონომიკაში, ქუთაისი, 2000)
10. თ. ბეიტრიშვილი. გ. ბერიკვლაშვილი, ტ. ბუაძე, დ. კაპანაძე. მათემატიკა, XI კლასი, მოსწავლის წიგნი, მეორე შესწორებული გამოცემა, თბილისი, 2009. 287. ISBN 978-9941-0-1581-6.
11. ი. ზედგენიძე, მ. ბალიაშვილი. ხარისხის მართვა. სახელმძღვანელო. სტუ, თბილისი. 2008
12. Г. Крамер. Математические методы статистики. изд. «иностр. лит.», Москва, 1948
13. И. И. Гихман, А. В. Скороход, М. И. Ядренко. Теория вероятностей и математическая статистика. изд. «Ваша школа», Киев, 1979.
14. В. К. Захаров, Б. А. Севастьянов, В. П. Чистяков Теория вероятностей. Москва, 1988.
15. В. Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Москва. 1988.
16. Т. Г. Буадзе, Н. А. Куцава, Е. С. Топурия, Д.М. Макасарашвили. Принцип иерархического моделирования сложных систем и некоторые аспекты его применения. Межд. Нау. Тех. Конф. Российская школа молодых ученых и специалистов «Системные проблемы качества, математического моделирования и информационных технологий». Част 7, Москва, Сочи, 2000.

17. Т. Ш. Бибилашвили, И. И. Бадагадзе, Т. Г. Буадзе, О расчете стандартного опциона европейского типа. Межд. Нау. Тех. Конф. Российская школа молодых ученых и специалистов «Системные проблемы качества, математического моделирования и информационных технологий». Част 7, Москва, Сочи, 2000.
18. ჰაროლდ კისი, სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში, მესამე გამოცემა, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2008.
19. Б.В. Гнеденко, Курс Теории вероятностей. Изд. «Наука», Москва, 1969.
20. А.А.Боровков. Теория вероятностей. Изд. «наука», Москва. 1976.